

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркових санітарних рубок
в насадженнях ДП «Сколівський військовий лісгосп»

24 жовтня 2025 року

м. Сколе

Нами, завідуючою лабораторією ДСЛП «Львівлісозахист» Вірою Венгер, провідним інженером-лісопатологом ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист” Олегом МАСНИМ, інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП „Львівлісозахист” Петром Домініком, в присутності головного лісничого ДП «Сколівський військовий лісгосп» Володимира Дробишинця та за участю лісової охорони лісгоспу в період з 15 по 17 жовтня 2025 року та з 22 по 24 жовтня 2025 року проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркових санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркових санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог „Санітарних правил в лісах України” (далі – СПЛУ).

Лісопатологічний журнал додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2022 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок проведено на загальній площі 260,7 га.

Коростівське лісництво

Квартал 43, виділ 2, площа 25,0 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх опеньком осіннім та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження сильна. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 43, виділ 2.1, площа 14,5 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх **опеньком осіннім** та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дерево-руйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження сильна. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 43, виділ 3, площа 2,5 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх **опеньком осіннім** та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження сильна. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 44, виділ 3, площа 10,4 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх **опеньком осіннім** та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня.

Доцільно провести вибірккову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 45, виділ 8, площа 3,0 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх опеньком осіннім та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 45, виділ 12, площа 3,3 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх опеньком осіннім та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 45, виділ 13, площа 13,0 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх опеньком осіннім та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 45, виділ 14, площа 8,5 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх **опеньком осіннім** та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 46, виділ 20, площа 13,0 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх **опеньком осіннім** та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження сильна. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 59, виділ 12, площа 7,7 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх **кореневою губкою** та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження сильна. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 59, виділ 17, площа 10,0 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх опеньком осіннім та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 62, виділ 12, площа 7,7 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх опеньком осіннім та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 62, виділ 14, площа 2,3 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх опеньком осіннім та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 71, виділ 8, площа 10,5 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх опеньком осіннім та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження сильна. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 71, виділ 15, площа 3,6 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх опеньком осіннім та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження сильна. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 71, виділ 16, площа 8,9 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх опеньком осіннім та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 73, виділ 74, площа 6,1 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх **опеньком осіннім** та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 73, виділ 75, площа 4,2 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх **опеньком осіннім** та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Корчинське лісництво

Квартал 1, виділ 15, площа 4,5 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх **опеньком осіннім** та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 4, виділ 2, площа 6,7 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх **опеньком осіннім** та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 4, виділ 5, площа 5,6 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх **опеньком осіннім** та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 4, виділ 8, площа 1,7 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх **кореневою губкою**, **опеньком** та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження сильна. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 13, виділ 14.1, площа 12,3 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх опеньком осіннім та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 14, виділ 1, площа 1,0 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх опеньком осіннім та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 14, виділ 6, площа 3,7 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх опеньком осіннім та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфів та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 17, виділ 39, площа 3,0 га.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками**,

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, буро́ва мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило-та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірко́ву санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 17, виділ 42, площа 12,7 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх **кореневою губкою** та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження сильна. Доцільно провести вибірко́ву санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 17, виділ 43, площа 5,7 га.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками**,

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, буро́ва мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило-та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірко́ву санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 17, виділ 63, площа 3,3 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх **кореневою губкою** та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини. Ступінь пошкодження насадження сильна. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 19, виділ 3, площа 5,0 га.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками**,

При обстежені ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило-та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 19, виділ 4, площа 7,2 га.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками**,

При обстежені ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило-та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 19, виділ 13, площа 7,0 га.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками**,

При обстежені ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило-та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 29, виділ 5, площа 5,3 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх **опеньком осіннім** та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини. Ступінь пошкодження насадження сильна. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 30, виділ 6, площа 6,0 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх **опеньком осіннім** та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження сильна. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 35, виділ 21, площа 5,7 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх **опеньком осіннім** та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження сильна. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 36, виділ 17, площа 10,1 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причиною всихання дерев є ураження їх **опеньком осіннім**, кореневою губкою та заселення стовбуровими шкідниками.

На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні та личинкові ходи, шлюбні камери стовбурових шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (трутовиків різного виду).

На ділянці також виявлено значну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження сильна. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі 260,7 га, при цьому виявлено:

Опеньок осінній – 96,2 га (сильна ступінь пошкодження).
Опеньок осінній – 102,1 га (середня ступінь пошкодження).
Опеньок осінній – 9,1 га (слабка ступінь пошкодження).
Коренева губка -- 25,4 га (сильна ступінь пошкодження).
Стовбурові шкідники – 27,9 га (середня ступінь пошкодження).

2. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибірку санітарні рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану на площі 260,7 га.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень,

Завідуюча лабораторією
ДСЛП „Львівлісозахист”

Віра ВЕНГЕР

Провідний інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист”

Олег МАСНИЙ

Провідний інженер-лісопатолог
ДСЛП „Львівлісозахист”

Петро ДОМІНІК

Головний лісничий ДП «Сколівський
військовий лісгосп»

Володимир ДРОБИШИНЕЦЬ