

А К Т

обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок, в насадженнях Бережанського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

16 липня 2025 р.

Бережанське надлісництво

Нами, заступником директора ДСЛП „Львівлісозахист” Василем СЕНИКОМ, інженером-лісопатологом Тернопільського ОЛПП ДСЛП „Львівлісозахист” Марією Макарою, помічником начальника Бережанського надлісництва Філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» за участю інженера лісового господарства I категорії відділу лісового господарства філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Оксани БРИЛІНСЬКОЇ, інженера охорони та захисту лісу I категорії філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Володимира КУСТОВА та лісової охорони надлісництва з **30 червня по 16 липня 2025 року** проведено обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з веденням лісопатологічного журналу, з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».(далі – СПЛУ).

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2014 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок проведено на загальній площі **460,8 га.**

Урманське лісництво

Квартал 59, виділ 11, площа 17,5 га.

Дерева бука лісового, граба звичайного, берези повислої, дуба звичайного уражені **гнилями** в нижній та середній частині стовбура, на деяких деревах наявні плоді тіла дереворуйнівних грибів.

Дерева ясена звичайного уражені халаровим некрозом.

Також наявні дерева з механічним пошкодженням стовбура. Деякі дерева сухостійні, сильно ослаблені.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ **Квартал 59, виділ 9, площа 2,9 га.**

Дуб червоний, граб звичайний, дерева дуба звичайного та інших порід з наявними стовбуровими **гнилями** (на окремих деревах ушкодження довжиною більше одного метра), поодинокі дерева сухостійні.

Також спостерігаються дерева з механічним пошкодженням та нахилом стовбура більше ніж 30 градусів до вертикальної осі.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ **Квартал 59, виділ 7, площа 2,5 га.**

Дерева дуба червоного та деякі дерева інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями** поодинокі дерева сухостійні або всихають. На одиноких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ **Квартал 58, виділ 8, площа 2,5 га.**

Дуб червоний, бук лісовий та граб звичайний з наявними **гнилями** в нижній та середній частині стовбура, характер всихання поодинокі дерева на виділі.

Присутні в складі насадження дерева ясена звичайного уражені халаровим некрозом. Частина дерев з підірваною кореневою системою та нахилом стовбура більше 30 градусів від осі стовбура.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ **Квартал 34, виділ 10, площа 9,9 га.**

Дуб червоний, граб звичайний, деякі дерева дуба звичайного та інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями**, поодинокі дерева сухостійні або всихаючі.

Присутній в складі насадження ясен звичайний уражений халаровим некрозом (крона дуже ажурна, більша половина крони сухостійна).

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ **Квартал 34, виділ 16, площа 2,2 га.**

Деякі дерева дуба червоного та граб звичайного з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями**, поодинокі дерева сухостійні або всихає більше ніж 2/3 крони.

Виявлені дерева з механічним пошкодженням стовбура.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ **Квартал 34, виділ 11, площа 3,0 га.**

Дуб червоний та окремі дерева інших порід уражені стовбуровими **гнилями**, поодинокі дерева сухостійні або всихаючі. На стовбурах ослаблених дерев наявні численні ракові утворення та плодові тіла дереворуйнівних грибів.

В нижній частині стовбурів деяких дерев наявні механічні пошкодження.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ **Квартал 35, виділ 11, площа 4,6 га.**

Дерева дуба червоного та граба звичайного ослаблені, уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, деякі дерева сухостійні.

Поодинокі дерева модрина європейської з наявними гнилями (в місцях гнилей спостерігаються отвори стовбурових шкідників).

Присутні дерева із зломаними стовбурами.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ **Квартал 54, виділ 12, площа 22,0 га, в рубку 6,0 га.**

Дерева граба звичайного, берези повислої, клена, поодинокі дуби та інші породи з наявними **гнилями** в нижній та середній частині стовбура також наявні дерева сухостійні або всихає більше ніж 2/3 крони.

Береза сильно ослаблена, всихає внаслідок підсочки минулих років.

Присутні дерева з механічним пошкодженням стовбура та підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ **Квартал 23, виділ 1, площа 4,7 га.**

Насадження є осередком **опенька осіннього**.

Ялина європейська всихає, на стовбурах ослаблених дерев наявні отвори стовбурових шкідників та ризоморфи опенька осіннього. Деякі дерева вітровальні.

Береза повисла, граб звичайний, дуб звичайний, осика уражені гнилями в різних частинах стовбура. Дуб з численними водяними пагонами.

На ділянці наявна неліквідна деревина.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

✓ **Криницьке лісництво**

✓ **Квартал 72, виділ 1, площа 33,8 га.**

Граб звичайний, бук лісовий, дуб звичайний та окремі дерева інших порід уражені **гнилями** в нижній та середній частині стовбура.

На стовбурах дерев бука наявні ракові утворення. Деякі дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів, сухостійні або всихають.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ **Квартал 54, виділ 1, площа 2,7 га.**

Дерева граба звичайного, клена, деякі дуба звичайного та інших порід з наявними **гнилями** в різних частинах стовбура. Окремі дерева дуба уражені поперечним раком рана якого охоплює 100 відсотків периметра стовбура.

Наявні дерева ясена звичайного уражені халаровим некрозом.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ **Квартал 54, виділ 4, площа 1,1 га.**

Частина дерев граба звичайного, окремі дуба звичайного уражені **гнилями** в нижній та середній частині стовбура, деякі дерева сухостійні.

Наявні поодинокі сухостійні дерева сосни звичайної, а також екземпляри із ажурною кроною та жовто-зеленою хвоєю.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ **Квартал 54, виділ 5, площа 2,2 га.**

Граб звичайний, деякі дерева дуба звичайного та інших порід ослаблені, уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, поодинокі дерева сухостійні. Присутні дерева з дугоподібно вигнутими стовбурами.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ **Квартал 54, виділ 9, площа 1,0 га.**

Наявні поодинокі дерева граба звичайного, дуба звичайного та деяких інших порід уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, окремі дерева сухостійні. Наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ **Квартал 38, виділ 11, площа 1,3 га.**

Граб звичайний, деякі дерева дуба звичайного та інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями**, поодинокі дерева сухостійні або всихаючі.

Присутній в складі насадження ясен звичайний уражений халаровим некрозом (крона дуже ажурна, рідка 2/3 крони сухостійна).

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ **Квартал 41, виділ 1, площа 21,0 га.**

Дерева граба звичайного, поодинокі дуба звичайного, черешні та деяких інших порід з наявними **гнилями** в різних частини стовбура, окремі дерева сухостійні або всихають. Також наявні дерева із зломаними стовбурами та нахилом більше ніж 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ **Монастирське лісництво**

✓ **Квартал 91, виділ 22, площа 1,4 га.**

Спостерігається поодинокі всихання дерев сосни звичайної. На стовбурах ослаблених і сухостійних дерев наявні отвори та ходи стовбурових шкідників, а також ризоморфи **опенька осіннього**.

Дерева берези повислої та граба звичайного уражені стовбуровими **гнилями**, деякі сухостійні.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

✓ **Квартал 91, виділ 11, площа 2,2 га.**

Дерева сосни звичайної ослаблені, хвоя жовто-зелена, а крона дуже ажурна, спостерігається поодиноке всихання. На стовбурах вітровальних дерев наявні ризоморфи **опенька осіннього** та сліди діяльності стовбурових шкідників.

Береза повисла, граб звичайний та окремі дерева інших порід уражені гнилями в нижній та середній частині стовбура.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

✓ **Квартал 88, виділ 1, площа 5,8 га.**

Спостерігається поодинокі та групові всихання дерев сосни звичайної. На стовбурах ослаблених і сухостійних дерев наявні отвори та ходи стовбурових шкідників, а також ризоморфи **опенька осіннього**.

Ялина європейська сухостійна або всихає, хвоя світло зелена, крона ажурна.

Наявні вітровальні та буреломні дерева.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

✓ **Квартал 42, виділ 19, площа 5,5 га.**

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**.

На сухостійних деревах граба звичайного та бука лісового присутні ризоморфи **опенька осіннього**. Наявні дерева із зломаними стовбурами.

Деякі дерева бука, граба та інших порід уражені гнилями в різних частинах стовбура. На стовбурах бука наявні численні ракові утворення.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

✓ **Квартал 55, виділ 2, площа 12,0 га.**

Дерева граба звичайного, бука лісового, дуба звичайного та інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями**.

Деякі дерева дуба уражені поперечним раком. рана якого охоплює 100 відсотків периметра стовбура.

Наявні дерева з розколеними стовбурами та сухостійні.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ **Дорогичівське лісництво**

— **Квартал 31, виділ 6, площа 4,5 га.**

На даній ділянці не виявлено патологічні процеси, які спричинили би погіршення санітарного стану насадження. Не доцільно проводити заходи з поліпшення санітарного стану на даному виділі.

Квартал 38, виділ 21, площа 3,0 га.

Поодинокі дерева граба звичайного, дуба звичайного та деяких інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями** поодинокі дерева сухостійні або всихають.

Ясен звичайний уражений халаровим некрозом, деякі дерева вітровальні.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Коропецьке лісництво

Квартал 44, виділ 10, площа 5,8 га.

Акація біла, окремі дерева дуба звичайного та інших порід уражені **гнилями** в нижній та середній частині стовбура. Поодинокі дерева сухостійні, пригнічені та відсталі в рості.

Наявні дерева з механічним пошкодженням, нахилом стовбура більше ніж 30 градусів від вертикальної осі та зламані.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Золотопотіцьке лісництво

Квартал 74, виділ 3, площа 5,3 га.

Граб звичайний, бук лісовий, деякі дерева дуба звичайного та інших порід ослаблені, уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, поодинокі дерева сухостійні. Присутні дерева з дугоподібно вигнутими стовбурами та нахилом більше ніж 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 72, виділ 23, площа 8,7 га.

Дерева граба звичайного, деякі дерева дуба звичайного та інших порід уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, окремі дерева сухостійні.

На стовбурах сухостійних дерев спостерігаються сліди діяльності стовбурових шкідників.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 72, виділ 17, площа 0,7 га.

Дуб звичайний ослаблений з раковими утвореннями, гнилями та численними водяними пагонами на стовбурах, деякі дерева сухостійні.

Всихання сосни звичайної, поодинокі. Крона ажурна, а хвоя світло зелена. В середній частині стовбура наявні гнилі (рани довжиною 1-2 метри). Також наявні поодинокі сухостійні дерева модрина європейської.

На стовбурах сухостійних дерев сосни та дуба, наявні ризоморфи **опенька осіннього**.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 2, виділ 9, площа 3,2 га.

Деякі дерева дуба звичайного та граба звичайного уражені стовбуровими **гнилями**, поодинокі дерева сухостійні та з розколеними стовбурами. Окремі дерева дуба уражені поперечним раком. рана якого охоплює 100 відсотків периметра стовбура.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 62, виділ 2, площа 6,3 га. ✓

Насадження є осередком опенька осіннього. Наявні дерева ясена звичайного уражені некрозом кореневої системи. На стовбурах сухостійних дерев наявні ризоморфи опенька осіннього.

Деякі дерева дуба звичайного та інших порід уражені гнилями, окремі сухостійні або всихає 2/3 крони.

Присутні дерева з підірваною кореневою системою та механічним пошкодженням стовбура.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 46, виділ 12, площа 5,7 га. ✓

Дуб звичайний та деякі дерева інших порід уражені гнилями в різних частинах стовбура. Поодинокі дерева сухостійні та всихаючі. На стовбурах ослаблених дерев наявні численні водяні пагони. Також виявлені плодові тіла дереворуйнівних грибів у кроні дерев.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Буцацьке лісництво

✓ **Квартал 34, виділ 7, площа 2,1 га.** ✓

Граб звичайний, деякі дерева дуба звичайного та інших порід уражені стовбуровими та прикореневими гнилями, поодинокі дерева сухостійні. Наявні поодинокі буреломні дерева та з розколеними стовбурами.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ **Квартал 12, виділ 7, площа 10,0 га.** ✓

Дерева граба звичайного, осики та деяких інших порід з наявними гнилями в різних частинах стовбура поодинокі сухостійні.

Дуб звичайний ослаблений, уражений поперечним раком рана якого охоплює 100 відсотків периметра стовбура.

Наявні дерева ясена звичайного уражені халаровим некрозом.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

30 т ✓ **Квартал 39, виділ 3, площа 10,0 га.** ✓

Деякі дерева граба звичайного, берези повислої, дуба звичайного та інших порід з наявними стовбуровими гнилями (на окремих деревах рана довжиною до одного метра), поодинокі дерева сухостійні.

Також спостерігаються дерева із зломаними стовбурами та нахилом більше ніж 30 градусів до вертикальної осі.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 71, виділ 6, площа 3,4 га. ✓

Дуб звичайний та червоний ослаблений, уражений гнилями в нижній та середній частині стовбура. На стовбурах сухостійних та ослаблених дерев наявні отвори та ходи стовбурових шкідників.

Дерева ясена звичайного уражені халаровим некрозом.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ Язловецьке лісництво

✓ Квартал 34, виділ 2, площа 4,8 га. ✓

Дуб звичайний ослаблений, на стовбурах дерев наявні **гнилі** та плодові тіла дереворуйнівних грибів. Поодинокі дерева сухостійні або всихає 2/3 крони. На стовбурах сухостійних дерев наявні отвори стовбурових шкідників.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ Квартал 1, виділ 7, площа 3,7 га. ✓

Деякі дерева граба звичайного, дуба звичайного та деяких інших порід з наявними **гнилями** в нижній та середній частині стовбура, окремі дерева сухостійні.

Дерева граба та дуба розколені та з нахилом стовбура більше ніж 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ Квартал 1, виділ 4, площа 13,5 га. ✓

Граба звичайний та деякі дерева інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями**, окремі дерева сухостійні або всихає більше ніж 2/3 крони. Деякі дерева дуба звичайного уражені поперечним раком, рана якого охоплює 100 відсотків периметра стовбура.

Присутні дерева з механічним пошкодженням стовбура.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ Козівське лісництво

✓ Квартал 3, виділ 3, площа 14,7 га. ✓

Деякі дерева граба звичайного, осики та деяких інших порід з наявними **гнилями** в нижній та середній частині стовбура, окремі дерева сухостійні.

Присутні дерева дугоподібновигнуті та з нахилом стовбура більше ніж 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

— Квартал 3, виділ 5, площа 4,2 га.

На даній ділянці не виявлено патологічні процеси, які спричинили би погіршення санітарного стану насадження. Не доцільно проводити заходи з поліпшення санітарного стану на даному виділі.

✓ Квартал 15, виділ 13, площа 5,5 га. ✓

Осика уражена **опеньком осінній**, та несправжнім трутовиком під корою мертвих дерев наявні ризоморфи.

Граб звичайний перестійний, уражений стовбуровими гнилями та опеньком осіннім, а також виявлені дуплистість, водяні пагони та мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони.

Ільм(берест) уражений графіозом (голландською хворобою) на стовбурах виявлено соковиділення, а також пожовтіле листя, суховершинність основних скелетних гілок крони та сліди заселення шкідників, а також мертві дерева.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 16 виділ 9 площа 7,6 га.

Граб звичайний перестійний, уражений стовбуровими гнилями та опеньком осіннім, а також виявлені дуплистість, водяні пагони та мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони.

Черешня лісова уражена стовбуровим гнилями. На не поодиноких стовбурах дерев черешні наявні ракові утворення.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

✓ **Квартал 32 виділ 1 площа 18,7 га.**

Граб звичайний, клен явір та черешня уражені стовбуровими гнилями та механічними пошкодженнями, поодинокі дерева із зломаними вершинами.

В місцях гнилей вищезгаданих дерев наявні ризоморфи **опенька осіннього**.

Ступінь пошкодження насадження- слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

✓ Литвинівське лісництво

✓ **Квартал 5, виділ 5, площа 5,5 га, в рубку 2,5 га.** ✓

Ясен звичайний уражений халаровим некрозом, всихає більше половини крони, деякі дерева вітровальні.

Граб звичайний, клен та дерева інших порід ослаблені, уражені стовбуровими та прикореневими гнилями, поодинокі дерева сухостійні. Присутні дерева з дугоподібно вигнутими стовбурами та нахилом більше ніж 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження — слабка.

✓ Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ **Квартал 5, виділ 2, площа 22,4 га, в рубку 10,0 га.** ✓

Ясен звичайний уражений халаровим некрозом, а також наявні дерева з підірваною кореневою системою та вітровальні.

Дерева клена, граба звичайного, та деяких інших порід уражені стовбуровими та прикореневими гнилями.

На стовбурах сухостійних дерев спостерігаються сліди діяльності стовбурових шкідників.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ **Квартал 7, виділ 1, площа 4,8 га.** ✓

Граб звичайний та деякі дерева інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими гнилями, окремі дерева сухостійні або всихає більше ніж 2/3 крони. Присутні вітровальні дерева та з механічним пошкодженням стовбура.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

✓ Бережанське лісництво:

✓ Квартал 28, виділ 2, площа 6,4 га.

Граб звичайний, модрина європейська та дуб червоний уражені стовбуровими гнилями переважно в нижній прикореневій частині стовбура. На даних стовбурових гнилях в більшій їх частині спостерігаємо наявні ризоморфи **опенька осіннього**, а також життєдіяльність вторинних стовбурових шкідників.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

✓ Квартал 22, виділ 9, площа 2,1 га.

Граб звичайний, модрина європейська та уражені стовбуровими гнилями переважно в нижній прикореневій частині стовбура. На даних стовбурових гнилях в більшій їх частині спостерігаємо наявні **ризоморфи опенька осіннього**, а також життєдіяльність вторинних стовбурових шкідників.

Ясень звичайний уражений халаровим некрозом(крона дуже ажурна, приріст відсутній, листя дуже дрібне, жовтіє, всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони), а також в нижній прикореневій частині стовбура наявні стовбурові гнилі.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

• Квартал 72 виділ 8 площа 4,2 га. ✓

Неша шаштале Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними стовбуровими гнилями в різних частинах дерева.

Береза повисла присутня в складі насадження перестійна, уражена стовбуровими гнилями по всій висоті стовбура.

На стовбурових гнилях берези та бука наявні ризоморфи **опенька осіннього**.

Граб звичайний знаходиться в II ярусі насадження сильно пригнічений про, що свідчить значна частина водяних пагонів на деревах

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Завалівське лісництво:

✓ Квартал 14, виділ 15, площа 23,5 га.

Граб звичайний уражений стовбуровими гнилями переважно в нижній прикореневій частині стовбура. На даних стовбурових гнилях в більшій їх частині спостерігаємо наявні ризоморфи **опенька осіннього**, а також життєдіяльність вторинних стовбурових шкідників.

частині спостерігаємо наявні **ризоморфи опенька осіннього**, а також життєдіяльність вторинних стовбурових шкідників.

Ясень звичайний уражений халаровим некрозом (крона дуже ажурна, приріст відсутній, листя дуже дрібне, жовтіє, всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони), а також в нижній прикореневій частині стовбура наявні стовбурові гнилі.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними стовбуровими гнилями в різних частинах дерева.

Ступінь пошкодження насадження - середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III - VI категорій стану.

✓ **Квартал 36, виділ 2, площа 7,4 га.**

Граб звичайний та бук лісовий уражений стовбуровими гнилями переважно в нижній прикореневій частині стовбура. На даних стовбурових гнилях в більшій їх частині спостерігаємо наявні **ризоморфи опенька осіннього**, а також життєдіяльність вторинних стовбурових шкідників.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними мертвими скелетними гілками в нижній і середній частині крони.

Дерева берези та осики присутні в складі насадження фактично всі уражені стовбуровими гнилями.

Ступінь пошкодження насадження - середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III - VI категорій стану.

✓ **Квартал 41, виділ 15, площа 10,0 га.**

Граб звичайний переважно порослевого походження. В нижній прикореневій частині дерев граба утворилися дупла з наявними стовбуровими гнилями на яких виявлені ризоморфи **опенька осіннього**.

На ослаблених деревах граба та дуба звичайного наявні водяні пагони по всій висоті стовбурів.

Осика та липа в даному насадженні уражені гнилями та стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження насадження - середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III - VI категорій стану.

✓ **Квартал 48, виділ 5, площа 3,8 га.**

Граб звичайний переважно порослевого походження. В нижній прикореневій частині дерев граба утворилися дупла з наявними стовбуровими гнилями на яких виявлені ризоморфи **опенька осіннього**.

Не значна частина дерев дуба звичайного уражена поперечний раком.

Дерева осики пошкоджені вітром.

Ступінь пошкодження насадження - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III - VI категорій стану.

✓ **Квартал 49, виділ 23, площа 3,0 га.**

Граб звичайний уражений стовбуровими гнилями переважно в нижній прикореневій частині стовбура. На даних стовбурових гнилях в більшій їх частині спостерігаємо наявні **ризоморфи опенька осіннього**, а також життєдіяльність вторинних стовбурових шкідників.

Ясень звичайний уражений халаровим некрозом (крона дуже ажурна, приріст відсутній, листя дуже дрібне, жовтіє, всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони), а також в нижній прикореневій частині стовбура наявні стовбурові гнилі.

Не значна частина дерев дуба звичайного уражена поперечний раком.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

✓ **Конюхівське лісництво:**

✓ **Квартал 1, виділ 12, площа 18,0 га.**

Ясень звичайний уражений халаровим некрозом(крона дуже ажурна, приріст відсутній, листя дуже дрібне, жовтіє, всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони), а також в нижній прикореневій частині стовбура наявні стовбурові гнилі на яких виявлені ризоморфи **опенька осіннього** та отвори життєдіяльності вторинних шкідників.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними мертвими скелетними гілками в нижній і середній частині крони.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

✓ **Квартал 32, виділ 2, площа 5,7 га.**

Граб звичайний перестійний, уражений стовбуровими гнилями та **опеньком осіннім**, а також виявлені дуплистість, водяні пагони та мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони.

Бук лісовий та дуб звичайний уражений стовбуровими гнилями, а також з наявними мертвими скелетними гілками в нижній і середній частині крони.

Ступінь пошкодження насадження - середня.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

✓ **Квартал 43, виділ 1, площа 6,6 га.**

Граб звичайний перестійний. уражений стовбуровими гнилями та **опеньком осіннім**, а також виявлені дуплистість, водяні пагони та мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони.

Ясень звичайний уражений халаровим некрозом(крона дуже ажурна, приріст відсутній, листя дуже дрібне, жовтіє, всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони), а також в нижній прикореневій частині стовбура наявні стовбурові гнилі на яких виявлені ризоморфи **опенька** та отвори від життєдіяльності вторинних шкідників.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

✓ **Квартал 19, виділ 1, площа 11,5 га.**

Насадження граба звичайного порослевого походження, уражене стовбуровими гнилями та **опеньком осіннім**, а також виявлені дуплистість переважно в нижній прикореневій частині стовбурів. Деякі дерева сухостійні, сильно ослаблені.

Ступінь пошкодження насадження - середня.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

✓ **Нараївське лісництво:**

✓ **Квартал 17, виділ 5, площа 12,2 га.**

Насадження граба звичайного порослевого походження, уражене стовбуровими гнилями та **опеньком осіннім**, а також виявлені дуплистість переважно в нижній прикореневій частині стовбурів, водяні пагони та мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони.

Ступінь пошкодження насадження - середня.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 17, виділ 6, площа 13,1 га.

Насадження граба звичайного порослевого походження, уражене стовбуровими гнилями та **опеньком осіннім**, а також виявлені дуплистість переважно в нижній прикореневій частині стовбурів, водяні пагони та мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони. Зустрічаються поодинокі сухостійні дерева по всій площі виділу.

Ступінь пошкодження насадження - середня.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

✓ **Підгасцьке лісництво:**

✓ **Квартал 56, виділ 10, площа 13,0 га.**

Бук лісовий уражений стовбуровими **гнилями** в нижній та середній частині стовбурів. Злам вершин бука виявлено в поодиноких деревах. Також наявні мертві скелетні гілки в нижній частині крон дерев.

Ступінь пошкодження насадження - слабка.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев IV -VI категорій стану.

✓ **Квартал 59, виділ 14, площа 5,8 га.**

Граб звичайний порослевого походження. В нижній прикореневій частині дерев граба виявлені гнилі з ознаками загнивання, як стовбура так і кореневої системи. Частина дерев граба знаходиться в II ярусі насадження і є пригнічена, що свідчить значна кількість водяних пагонів на стовбурах. На мертвих деревах граба під корою виявлені ризоморфи **опенька осіннього**.

Ступінь пошкодження насадження - середня.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

✓ **Квартал 63, виділ 8, площа 10,0 га.**

Граб звичайний перестійний. В нижній прикореневій частині дерев граба виявлені гнилі з ознаками загнивання, як стовбура так і кореневої системи. Частина дерев граба знаходиться в II ярусі насадження і є пригнічена, що свідчить значна кількість водяних пагонів на стовбурах. Під корою мертвих деревах граба виявлені ризоморфи **опенька осіннього**.

Бук лісовий уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. Злам вершин бука виявлено в поодиноких деревах. Також наявні мертві скелетні гілки в нижній частині крон дерев.

Ступінь пошкодження насадження - середня.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі **460,8 га** при цьому виявлено:

Опеньок осінній – 201,7 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 14,4 га
- середня ступінь пошкодження – 187,3 га

Стовбурові та кореневі гнилі – 237,9 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 202,4 га
- середня ступінь пошкодження – 35,5 га

Некроз – 12,5 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 12,5 га

Не доцільно проводити заходи з поліпшення санітарного стану на площі 8,7 га

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог СПЛУ провести вибіркові санітарні рубки на площі **452,1 га**.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.


Заступник директора
ДСЛП «Львівлісозахист»

 Василь СЕНИК

Інженер-лісопатолог
Тернопільського ОЛПП
ДСЛП «Львівлісозахист»

 Марія МАКАРА


Помічник начальника
Бережанського надлісництва
філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

 Микола КОВАЛЬЧУК

Інженер лісового господарства I категорії
відділу лісового господарства
філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

 Оксана БРИЛІНСЬКА

Інженер охорони та захисту лісу I категорії
філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

 Володимир КУСТОВ