

А К Т

обстеження насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок в насадженнях філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Рахівського надлісництва

06. 05. 2025 року

м. Рахів

Нами, головним спеціалістом відділу лісового та мисливського господарства у Закарпатській області Юрієм ЦАЛАНОМ, заступником сільського голови Богданської сільської ради Ярославом ДАНИЛЮКОМ, провідним інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП «Львівлісозахист» Олегом МАСНИМ, інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП «Львівлісозахист» Ярославом ОСТАШУКОМ, за участю помічника лісничого Білотисянського лісництва Петра ДЕМ'ЯНА проведено комісійне обстеження лісового насадження на предмет доцільності проведення в ньому суцільної санітарної рубки.

Матеріали відведення і таксації лісосік наведені згідно даних наданих працівниками філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.

Білотисянське лісництво

Квартал 1, виділ 7.8, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 1, виділ 7, площа 70,0 га, склад 9Яле1Бкл+Яв+Яз, вік 91 рік, повнота 0,70, бонітет 1б, середня висота 33 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 720 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 61%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 1, виділ 10.1, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 1, виділ 10, площа 6,7 га, склад 10Яле+Бкл+Яв+Яз, вік 91 рік, повнота 0,70, бонітет 16, середня висота 34 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 780 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 78%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 27, виділ 2.1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 27, виділ 2, площа 27,5 га, склад 10Яле, вік 74 роки, повнота 0,80, бонітет 16, середня висота 30 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 750 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 63%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 27, виділ 2.2, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 27, виділ 2, площа 27,5 га, склад 10Яле, вік 74 роки, повнота 0,80, бонітет 16, середня висота 30 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 750 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 62%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 29, виділ 1.2, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 29, виділ 1, площа 18,2 га, склад 10Яле, вік 59 років, повнота 0,80, бонітет 1в, середня висота 30 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 750 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 58%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини, керуючись «СПЛУ» вважаємо за доцільне провести суцільні санітарні рубки на загальній площі 3,5 га; загальною кубомасою 1880 м³ в т. ч. ліквідної – 1567 м³, ділової – 1011 м³;

Білотисянське лісництво

Кв. 1, вид. 7д8, площа 0,9 га; загальною кубомасою 617 м³, в т. ч. ліквідної – 493 м³, ділової – 207 м³;

Кв. 1, вид. 10д1, площа 0,3га; загальною кубомасою 227 м³, в т. ч. ліквідної – 173 м³, ділової – 94 м³;

Кв. 27, вид. 2д1, площа 1,0 га; загальною кубомасою 479 м³, в т. ч. ліквідної – 418 м³, ділової – 351 м³;

Кв. 27, вид. 2д2, площа 0,5 га; загальною кубомасою 204 м³, в т. ч. ліквідної – 162 м³, ділової – 127 м³;

Кв. 29, вид. 1д2, площа 0,8 га; загальною кубомасою 353 м³, в т. ч. ліквідної – 321 м³, ділової – 232 м³;

1. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.
2. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.
3. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:


1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.
3. План відведених в рубку ділянок.

Головний спеціаліст відділу лісового
та мисливського господарства у
Закарпатській області




Юрій ЦАЛАН

Заступник сільського голови
Богданської сільської ради




Ярослав ДАНИЛЮК

Провідний інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП «Львівлісозахист»




Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП «Львівлісозахист»



Ярослав ОСТАШУК

Помічник лісничого
Білотисянського лісництва



Петро ДЕМ'ЯН