

## А К Т

### обстеження насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок в насадженнях філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Рахівського надлісництва

06.05. 2025 року

м. Рахів

Нами, головним спеціалістом відділу лісового та мисливського господарства у Закарпатській області Юрієм ЦАЛАНОМ, заступником сільського голови Богданської сільської ради Ярославом ДАНИЛЮКОМ, провідним інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП «Львівлісозахист» Олегом МАСНИМ, інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП «Львівлісозахист» Ярославом ОСТАШУКОМ, за участю лісничого Говерлянського лісництва Михайла БОГУНЯКА проведено комісійне обстеження лісового насадження на предмет доцільності проведення в ньому суцільної санітарної рубки.

Матеріали відведення і таксації лісосік наведені згідно даних наданих працівниками філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.

#### Говерлянське лісництво

##### **Квартал 1, виділ 18.10, площа відведена в рубку 0,9 га.**

*Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування:* квартал 1, виділ 18, площа 53,0 га, склад 10Яле+Бкл+Яв+Яцб, вік 64 роки, повнота 0,80, бонітет Ів, середня висота 31 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 800 м<sup>3</sup>. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 51%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

##### **Квартал 1, виділ 51.2, площа відведена в рубку 0,7 га.**

*Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування:* квартал 1, виділ 51, площа 3,9 га, склад 10Яле+Бкл вік 84 роки, повнота 0,70, бонітет Іб, середня висота 25 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 850 м<sup>3</sup>. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція

починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 38%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

**Квартал 17, виділ 12.2, площа відведена в рубку 0,8 га.**

*Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування:* квартал 17, виділ 12, площа 21,6 га, склад 10Яле+Яв+Яцб, вік 71 рік, повнота 0,80, бонітет 1в, середня висота 34 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 830 м<sup>3</sup>. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 66%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

**Квартал 17, виділ 16.2, площа відведена в рубку 1,0 га.**

*Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування:* квартал 17, виділ 16, площа 30,0 га, склад 10Яле+Яв+Яцб+Бкл, вік 71 рік, повнота 0,85, бонітет 1в, середня висота 33 м, середній діаметр 34 см, запас на 1 га 920 м<sup>3</sup>. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 53%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

**Квартал 20, виділ 7.1, площа відведена в рубку 1,0 га.**

*Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування:* квартал 20, виділ 7, площа 1,6 га, склад 10Яле, вік 96 років, повнота 0,85, бонітет 1б, середня висота 33 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 860 м<sup>3</sup>. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають

ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 58%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

**Квартал 21, виділ 29.2, площа відведена в рубку 0,8 га.**

*Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування:* квартал 21, виділ 29, площа 3,3 га, склад 8Яле1Яцб1Бкл+Яв, вік 41 рік, повнота 0,85, бонітет 1в, середня висота 23 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 530 м<sup>3</sup>. Категорія захисності: захисні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 67%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

**Квартал 23, виділ 27.1, площа відведена в рубку 0,8 га.**

*Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування:* квартал 23, виділ 27, площа 3,2 га, склад 9Яле1Яцб+Бкл, вік 52 роки, повнота 0,85, бонітет 1в, середня висота 27 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 750 м<sup>3</sup>. Категорія захисності: захисні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 62%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

**Висновки та пропозиції:**

З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини, керуючись «СПЛУ» вважаємо за доцільне провести суцільні санітарні рубки на загальній площі 6,0 га; загальною кубомасою 3975 м<sup>3</sup> в т. ч. ліквідної – 3476 м<sup>3</sup>, ділової – 2407 м<sup>3</sup>;

### Говерлянське лісництво

Кв. 1, вид. 18д10, площа 0,9 га; загальною кубомасою 711 м<sup>3</sup>, в т. ч. ліквідної – 593 м<sup>3</sup>, ділової – 451 м<sup>3</sup>;

Кв. 1, вид. 51д2, площа 0,7 га; загальною кубомасою 255 м<sup>3</sup>, в т. ч. ліквідної – 232 м<sup>3</sup>, ділової – 126 м<sup>3</sup>;

Кв. 17, вид. 12д2, площа 0,8 га; загальною кубомасою 463 м<sup>3</sup>, в т. ч. ліквідної – 389 м<sup>3</sup>, ділової – 246 м<sup>3</sup>;

Кв. 17, вид. 16д2, площа 1,0 га; загальною кубомасою 554 м<sup>3</sup>, в т. ч. ліквідної – 477 м<sup>3</sup>, ділової – 342 м<sup>3</sup>;

Кв. 20, вид. 7д1, площа 1,0 га; загальною кубомасою 866 м<sup>3</sup>, в т. ч. ліквідної – 779 м<sup>3</sup>, ділової – 597 м<sup>3</sup>;

Кв. 21, вид. 29д2, площа 0,8 га; загальною кубомасою 690 м<sup>3</sup>, в т. ч. ліквідної – 618 м<sup>3</sup>, ділової – 359 м<sup>3</sup>;

Кв. 23, вид. 27д1, площа 0,8 га; загальною кубомасою 436 м<sup>3</sup>, в т. ч. ліквідної – 388 м<sup>3</sup>, ділової – 286 м<sup>3</sup>;

1. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.
2. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.
3. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.
3. План відведених в рубку ділянок.

Головний спеціаліст відділу лісового  
та мисливського господарства у  
Закарпатській області




Юрій ЦАЛАН

Заступник сільського голови  
Богданської сільської ради




Ярослав ДАНИЛЮК

Провідний інженер-лісопатолог  
ВНДПВЛГ ДСЛП «Львівлісозахист»



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог  
ВНДПВЛГ ДСЛП «Львівлісозахист»



Ярослав ОСТАШУК

Лісничий Говерлянського лісництва



Михайло БОГУНЯК