

Акт

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок, в насадженнях ДП "Ліси України", філії "Карпатський лісовий офіс", Брустурянського надлісництва, за період з 01 вересня по 05 вересня 2025 року.

05 вересня 2025 р.

Брустурянське надлісництво

Нами, начальником Закарпатського ОЛПП ДСЛП "Львівлісозахист" Олександром ГАЙЧЕНЯ, інженером-лісопатологом Закарпатського ОЛПП ДСЛП "Львівлісозахист" Олегом СТЕБЕЛЕЦЬКИМ, інженером-лісопатологом відділу нагляду та прогнозу ДСЛП "Львівлісозахист" Миколою ВИСОЧАНСЬКИМ, в присутності заступника надлісничого Брустурянського надлісництва Юрія КОСТЯКА, за участю лісничого Кедринського лісництва Василя ЗОЛОТАРЯ, лісничого Плайського лісництва Вадима МЕКЛЕША, лісничого Русько-Мокрянського лісництва Віталія САЛКО, лісничого Тернівського лісництва Василя ЗОЛОТАРЯ, лісничого Турбатського лісництва Дмитра ЧУСИ, проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проведено рекогносцирувальним методом з веденням лісопатологічного журналу, уточненням границь ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковій вирубці згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 та 01.01.2017 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок проведено на загальній площі **243,9 га.**

Кедринське лісництво

Квартал 7, виділ 16, площа 0,6 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними

пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 10 , виділ 97 , площа 1,9 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Русько-Мокрянське лісництво

Квартал 2 , виділ 56 , площа 1,6 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На

пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 2 , виділ 51 , площа 7,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 2 , виділ 43 , площа 5,6 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 2 , виділ 53 , площа 2,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження

гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 21 , виділ 16 , площа 2,3 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 32 , виділ 25 , площа 1,9 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура

понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 14 , виділ 15 , площа 2,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 16 , виділ 39 , площа 2,7 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 7 , виділ 14 , площа 2,3 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має

суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Тернівське лісництво

Квартал 13 , виділ 12 , площа 2,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком, що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 15 , виділ 9 , площа 3,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 30 , виділ 6 , площа 8,4 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 30 , виділ 21 , площа 14,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком, що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 18 , виділ 14 , площа 7,3 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком, що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 66 , виділ 2 , площа 1,3 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Турбатське лісництво

Квартал 5 , виділ 25 , площа 6,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На

пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5 , виділ 43 , площа 6,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Плайське лісництво

Квартал 6 , виділ 31 , площа 4,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), опеньком осіннім, що призвело до всихання та відмирання дерев. . Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 6 , виділ 32 , площа 1,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), опеньком осіннім, що призвело до всихання та відмирання дерев. . Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 8 , виділ 9 , площа 4,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), опеньком осіннім, що призвело до всихання та відмирання дерев. . Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 9 , виділ 27 , площа 5,6 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), опеньком осіннім, кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 10 , виділ 13 , площа 6,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), опеньком осіннім, кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або

шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 15 , виділ 38 , площа 5,9 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), опеньком осіннім, кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 19 , виділ 34 , площа 2,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), опеньком осіннім, що призвело до всихання та відмирання дерев. . Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 19 , виділ 38 , площа 2,6 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), опеньком осіннім, що призвело до всихання та відмирання дерев. . Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 22 , виділ 12.4 , площа 4,8 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), опеньком осіннім, що призвело до всихання та відмирання дерев. . Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 24 , виділ 28 , площа 4,4 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), опеньком осіннім, кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 32 , виділ 25.2 , площа 3,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. . На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 33 , виділ 25 , площа 3,7 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), опеньком осіннім, кореневою губкою, що призвело до всихання та

відмирання дерев. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 33 , виділ 26 , площа 2,7 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), опеньком осіннім, що призвело до всихання та відмирання дерев. . Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 33 , виділ 27 , площа 4,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. . На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 35 , виділ 8 , площа 12,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), опеньком осіннім, кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38 , виділ 1.1 , площа 9,8 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. . На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 41 , виділ 8 , площа 8,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. . На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 41 , виділ 15 , площа 5,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. . На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 47 , виділ 6 , площа 17,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. .

На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 12 , виділ 24.1 , площа 7,9 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. . На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 51 , виділ 1 , площа 13,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. . На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 51 , виділ 4 , площа 1,6 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. . На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30

градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 51 , виділ 5 , площа 3,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. . На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 51 , виділ 7 , площа 10,6 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. . На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 51 , виділ 9 , площа 5,4 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. . На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 51 , виділ 10 , площа 2,6 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. . На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 51 , виділ 20 , площа 1,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. . На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 51 , виділ 21 , площа 5,7 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), опеньком осіннім, кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 51 , виділ 24 , площа 0,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), опеньком осіннім, кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на

корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 51 , виділ 25.1 , площа 4,3 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. . На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 51 , виділ 25 , площа 2,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. . На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі **243,9 га** при цьому виявлено:

2.

Стовбурові гнилі – 202,5 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 33,0 га;
- середня ступінь пошкодження – 169,5 га;

Стовбурові шкідники – 41,4 га, а саме:


- слабка ступінь пошкодження – 39,5 га;
- середня ступінь пошкодження – 1,9 га;

2. Відведення дерев у вибірку санітарну рубку провести за рахунок пошкоджених стовбуровим шкідниками, стовбуровими гнилями, кореневою губкою, опеньком осіннім, трутовиками, повалених, зламаних та сухостійних дерев.


3. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибірку санітарну рубку на площі **243,9 га**.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

Начальник Закарпатського ОЛПІ
ДСЛП "Львівлісозахист"

 Олександр ГАЙЧЕНЯ


Інженер-лісопатолог Закарпатського ОЛПІ
ДСЛП "Львівлісозахист"

 Олег СТЕБЕЛЕЦЬКИЙ

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу
ДСЛП "Львівлісозахист"

 Микола ВИСОЧАНСЬКИЙ

Заступник надлісного
Брустурянського надлісництва

 Юрій КОСТЯК

Лісничий Кедринського лісництва

 Василь ЗОЛОТАР

Лісничий Плайського лісництва

 Вадим МЕКЛЕШ

Лісничий Тернівського лісництва

 Василь ЗОЛОТАР

Лісничий Русько-Мокрянського лісництва

 Віталій САЛКО

Лісничий Турбатського лісництва

 Дмитро ЧУСА