

**Акт**  
**лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення**  
**в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового**  
**санітарних рубок, в насадженнях ДП "Ліси України", філії "Карпатський**  
**лісовий офіс", Великобичківського надлісництва,**  
**за період з 21 по 25 липня та з 28 по 30 липня 2025 року.**

30 липня 2025 р.

Великобичківське надлісництво

Нами, начальником Закарпатського ОЛПП ДСЛП "Львівлісозахист" Олександром ГАЙЧЕНЯ, начальником відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Юрієм КРАМАРЦЕМ, інженером-лісопатологом Закарпатського ОЛПП ДСЛП "Львівлісозахист" Олегом СТЕБЕЛЕЦЬКИМ, інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Іваном ЧИЧЕРСЬКИМ, в присутності інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії сектору охорони і захисту лісів в Закарпатській області відділу охорони і захисту лісів філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Дениса РОМАНА, за участю лісного Костилівського лісництва Миколи ВУРСТИ, лісного Лужанського лісництва Валерія БОНДЮКА, лісного Косівсько-Полянського лісництва Віталія ПУКМАНА, лісного Кобилецько-Полянського лісництва Олександра ГОРБУНОВА, лісного Щербилівського лісництва Юрія ТИМЧАКА, лісного Верхньо-Водяньського лісництва Івана МАЗАРА, в.о. лісного Середньоріцького лісництва Марії ШТЕФАНЮК, в.о. лісного лісництва Ім. Тимощука Марія ШТЕФАНЮК, проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проведено рекогносцирувальним методом з веденням лісопатологічного журналу, уточненням границь ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковій вирубці згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок проведено на загальній площі **131,2 га.**

**Верхньо-Водяньське лісництво**

**Квартал 10 , виділ 20.1 , площа 3,1 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев

бука деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 13 , виділ 9.1 , площа 3,2 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев бука деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 15 , виділ 27.1 , площа 0,9 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев бука деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 29 , виділ 2.1 , площа 1,0 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев бука деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 33 , виділ 32.1 , площа 3,3 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев бука деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 39 , виділ 7.1 , площа 2,6 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев

бука деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 39 , виділ 2.1 , площа 3,1 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев бука деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 41 , виділ 5.1 , площа 2,9 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев бука деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 41 , виділ 5.2 , площа 2,3 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев бука деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 52 , виділ 2.1 , площа 2,6 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев бука деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 23 , виділ 2.1 , площа 4,4 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев

бука деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 27 , виділ 8.1 , площа 3,0 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев бука деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 35 , виділ 11.2 , площа 2,3 га.**

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, стовбуровими шкідниками, опеньком осіннім. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Щербилівське лісництво**

**Квартал 10 , виділ 28.1 , площа 4,0 га.**

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 15 , виділ 12.2 , площа 1,6 га.**

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 15 , виділ 56.1 , площа 1,2 га.**

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 20 , виділ 42.1 , площа 1,1 га.**

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних

шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 20 , виділ 43.3 , площа 3,6 га.**

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 20 , виділ 68.3 , площа 1,4 га.**

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

### **Косівсько-Полянське лісництво**

**Квартал 19 , виділ 37.1 , площа 0,7 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 23 , виділ 30.1 , площа 2,3 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 24 , виділ 4.1 , площа 1,3 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 24 , виділ 5.1 , площа 1,0 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 25 , виділ 8.1 , площа 3,0 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 26 , виділ 34.1 , площа 2,8 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 26 , виділ 40.1 , площа 2,1 га.**

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них

знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 31 , виділ 29.1 , площа 3,0 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 43 , виділ 4.1 , площа 4,8 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Середньоріцьке лісництво**

**Квартал 3 , виділ 34.1 , площа 3,8 га.**

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 3 , виділ 35.1 , площа 2,0 га.**

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

**Квартал 7 , виділ 3.1 , площа 3,9 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

**Квартал 7 , виділ 3.2 , площа 2,0 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

**Квартал 7 , виділ 12.1 , площа 4,0 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

**Квартал 10 , виділ 44.1 , площа 1,4 га.**

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення

стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

**Квартал 10 , виділ 47.2 , площа 3,0 га.**

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

**Квартал 14 , виділ 26.1 , площа 1,2 га.**

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

**Квартал 18 , виділ 2.2 , площа 3,0 га.**

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Лісництво Ім. Томашука**

**Квартал 18 , виділ 30.1 , площа 3,0 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 18 , виділ 40.1 , площа 1,3 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 22 , виділ 1.1 , площа 0,3 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 22 , виділ 3.1 , площа 0,2 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Кобилецько-Полянське лісництво**

**Квартал 14 , виділ 9.1 , площа 4,1 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, кореневою губкою, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 14 , виділ 10.1 , площа 6,8 га.**

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 16 , виділ 16.1 , площа 3,2 га.**

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі

стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

#### **Лужанське лісництво**

##### **Квартал 48 , виділ 10.1 , площа 5,2 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

##### **Квартал 51 , виділ 3.1 , площа 6,1 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

##### **Квартал 51 , виділ 10.2 , площа 1,8 га.**

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

#### **Костилівське лісництво**

##### **Квартал 13 , виділ 37.2 , площа 1,9 га.**

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, раком ялиці, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах

наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 14 , виділ 10.1 , площа 3,4 га.**

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, стовбуровими шкідниками, опеньком осіннім. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 10 , виділ 32.2 , площа 1,0 га.**

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Висновки та пропозиції:**

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі **131,2 га** при цьому виявлено

**Стовбурові гнилі – 85,3 га, а саме:**

- слабка ступінь пошкодження – 32,0 га;
- середня ступінь пошкодження – 53,3 га;

**Опеньок осінній – 37,3 га, а саме:**

- слабка ступінь пошкодження – 2,0 га;
- середня ступінь пошкодження – 35,3 га;

**Коренева губка – 8,6 га, а саме:**


- середня ступінь пошкодження – 8,6 га;

2. Відведення дерев у вибіркову санітарну рубку провести за рахунок пошкоджених стовбуровим шкідниками, стовбуровими гнилями, кореневою губкою, опеньком осіннім, повалених, зламаних та сухостійних дерев.

3. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибіркову санітарну рубку на площі **131,2 га**.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

Начальник Закарпатського ОЛПІ  
ДСЛП "Львівлісозахист"



Олександр ГАЙЧЕНЯ

Начальник відділу діагностики  
ДСЛП "Львівлісозахист"




Юрій КРАМАРЕЦЬ

Інженер-лісопатолог Закарпатського ОЛПІ  
ДСЛП "Львівлісозахист"



Олег СТЕБЕЛЕЦЬКИЙ

Інженер-лісопатолог відділу діагностики  
ДСЛП "Львівлісозахист"



Іван ЧИЧЕРСЬКИЙ

Інженер з охорони та захисту лісу  
1 категорії сектору охорони і захисту лісів  
в Закарпатській області  
відділу охорони і захисту лісів  
філії «Карпатський лісовий офіс»  
ДП «Ліси України»



Денис РОМАН

Лісничий Костилівського лісництва

Микола ВУРСТА

Лісничий Лужанського лісництва



Валерій БОНДЮК

Лісничий Косівсько-Полянського лісництва



Віталій ПУКМАН

Лісничий Кобилецько-Полянського лісництва



Олександр ГОРБУНОВ

Лісничий Щербилівського лісництва




Юрій ТИМЧАК

Лісничий Верхньо-Водянського лісництва



Іван МАЗАР

В.о. лісника Середньоріцького лісництва



Марія ШТЕФАНЮК

В.о. лісника лісництва Ім. Тимощука



Марія ШТЕФАНЮК