

АКТ
лісопатологічного обстеження насаджень
з метою визначення та оцінки санітарного стану

30 вересня 2025 року

м. Зміїв

Нами, начальником відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Романом ОСАДЧИМ, головним спеціалістом відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Євгенієм ДРІВНОХОДОМ, інженером з охорони та захисту лісу I категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Олександром МИРГОРОДСЬКИМ, разом з лісовою охороною Краснополянського, Задонецького, Наталинського, Зачепилівського, Таранівського та Первомайського лісництв, проведено лісопатологічне обстеження насаджень ДП «Ліси України» філії «Слобожанський лісовий офіс» Зміївське надлісництво з метою оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження: **218,8 гектарів.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Краснополянське лісництво (ДП «Зміївське ЛГ») (33,8 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, підвиділу, га	Коротка таксаційна характеристика насаджень						
			склад	вік по матеріалам лісовпорядкування, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
46	1	33,8	9ДЗІКЛГ+ЛПД	105	0.6	2	27	32	266
Разом:		33,8							

В результаті обстеження вищевказаної ділянки встановлено, що дерева та їх групи в насадженні ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних захворювань, ступінь ураження насаджень – середній. Характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких захворювань: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, вертицильозне в'янення, графіоз, печіночниця звичайна, щетиноволосий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, лускатий трутовик та трутовик звичайний, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодів тіла, напливи, некрози, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. У насадженні присутні дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Задонецьке лісництво (ДП «Зміївське ЛГ») (67,5 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, підвиділу, га	Коротка таксаційна характеристика насаджень						
			склад	вік по матеріалам лісовпорядкування, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
1	6	11,8	10СЗ	60	0,65	1	20	22	261
29	6	12,6	10СЗ	80	0,7	1	25	30	380
30	1	6,7	10СЗ	81	0,7	1	25	28	380
30	1.2	2	10СЗ	81	0,7	1	25	28	380
48	2	5,9	10СЗ	80	0,65	1	25	30	353
48	3	1,7	10СЗ	60	0,7	1А	24	26	360

137	2	0,6	10СЗ	80	0,6	2	23	28	292
137	5	2,5	10СЗ	62	0,7	1А	24	26	360
137	7	1,8	6СЗ(82)4СЗ(65)	82	0,6	1	27	38	338
144	3	10,5	10СЗ	80	0,8	1	24	28	412
151	7	11,4	7СЗ(75)3СЗ(65)	75	0,7	1	26	32	387
Разом:		67,5							

В ході проведення лісопатологічного обстеження насаджень відмічено, що на частині виділів виявлено локальну деградацію, дерева та їх групи ослаблені й відмирають внаслідок ураження інфекційним захворюванням - кореневою губкою та пошкоджені стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження слабкий, середній та сильний, характер всихання дифузний і груповий. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев (III – IV категорії стану) мають вкорочену хвою і приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, соснової губки та ознаками ураження раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі. Поміж тим на окремих деревах та їх угруповуваннях відмічено нагар стовбура з підпалом до 1 м, внаслідок лісових пожеж минулих років.

Наталинське лісництво (ДП «Красноградське ЛГ») (27,8 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, підвиділу, га	Коротка таксаційна характеристика насаджень						
			склад	вік по матеріалам лісовпорядкування, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
124	1	2,5	9СЗ1БП+ДЗ+ОС	51	0,8	1А	21	24	322
124	14	2	10СЗ	81	0,7	1	27	28	420
147	2	23,3	10СЗ	54	0,7	1В	29	24	460
Разом:		27,8							

В ході проведення лісопатологічного обстеження насаджень відмічено, що на частині виділів виявлено локальну деградацію, дерева та їх групи ослаблені й відмирають внаслідок ураження інфекційним захворюванням - кореневою губкою та пошкоджені стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев (III – IV категорії стану) мають вкорочену хвою і приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, соснової губки та ознаками ураження раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі. Поміж тим на окремих деревах та їх угруповуваннях відмічено нагар стовбура з підпалом до 1 м, внаслідок лісових пожеж минулих років.

Зачепилівське лісництво (ДП «Красноградське ЛГ») (29,7 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, підвиділу, га	Коротка таксаційна характеристика насаджень						
			склад	вік по матеріалам лісовпорядкування, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
15	12	7,2	7ДЗ2КЛГ1БРС	85	0,6	2	23	32	202
15	22	3,9	7ДЗ2БРС1КЛП	85	0,7	2	23	30	233

21	14	0,8	10СЗ	56	0,7	1	20	24	281
26	3	7,1	9ДЗ1КЛП+КЛГ+БРС+ЛП Д	85	0,6	3	21	30	180
28	12	5,1	10СЗ+БП+ДЗ	71	0,7	2	21	28	301
29	4	0,7	10СЗ	59	0,7	1	22	26	320
36	5	4,9	10СЗ	36	0,7	1	15	18	187
Разом:		29,7							

В ході проведення лісопатологічного обстеження насаджень відмічено, що на частині виділів виявлено локальну деградацію, дерева та їх групи ослаблені й відмирають внаслідок ураження інфекційним захворюванням - кореневою губкою та пошкоджені стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев (III – IV категорії стану) мають вкорочену хвою і приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, соснової губки та ознаками ураження раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі. Поміж тим на окремих деревах та їх угруповуваннях відмічено нагар стовбура з підпалом до 1 м, внаслідок лісових пожеж минулих років.

Поміж тим у листяних насадженнях відмічено, що дерева та їх групи в насадженні ослаблені та відмирають внаслідок ураження комплексом інфекційних захворювань, ступінь ураження насаджень – середній. Характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких захворювань: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, вертицильозне в'янення, графіоз, печіночниця звичайна, щетиноволосяй трутовик, сірчано – жовтий трутовик, лускатий трутовик та трутовик звичайний, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодів тіла, напливи, некрози, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. У насадженні присутні дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Таранівське лісництво (ДП «Зміївське ЛГ») (19,9 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, підвиділу, га	Коротка таксаційна характеристика насаджень						
			склад	вік по матеріалам лісовпорядкування, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
24	1	11,8	10ДЗ	85	0,6	2	23	32	211
24	1.3	8,1	10ДЗ	85	0,6	2	23	32	211
Разом:		19,9							

В результаті обстеження вищевказаних ділянок встановлено, що дерева та їх групи в насадженні ослаблені та відмирають внаслідок ураження комплексом інфекційних захворювань, ступінь ураження насаджень – середній. Характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких захворювань: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, вертицильозне в'янення, графіоз, печіночниця звичайна, щетиноволосяй трутовик, сірчано – жовтий трутовик, лускатий трутовик та трутовик звичайний, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодів тіла, напливи, некрози, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками.

У насадженні присутні дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Первомайське лісництво (ДП «Близнюківське ЛГ») (40,1 га):


Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, підвиділу, га	Коротка таксаційна характеристика насадження						
			склад	вік по матеріалам лісовпорядкування, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
42	1	40,1	10ДЗ	91	0,7	4	16	26	139
Разом:		40,1							

В результаті обстеження вищевказаної ділянки встановлено, що дерева та їх групи в насадженні ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних захворювань, ступінь ураження насадження – середній. Характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких захворювань: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, вертицильозне в'янення, графіоз, печіночниця звичайна, щетиноволосий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, лускатий трутовик та трутовик звичайний, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла, напливи, некрози, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. У насадженні присутні дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.


ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, що негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний та збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних захворювань та шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вище перелічених насадженнях інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, рекомендовано, керуючись Санітарними правилами в лісах України, у 2025 році, провести у вищевказаних насадженнях заходи з поліпшення санітарного стану лісів. Враховуючи ступінь розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників - вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **218,8 га**), з вилученням з деревостанів аварійних, сухостійних дерев, дерев, уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних захворювань. Адже ліквідація наслідків стихійних явищ (засухи та посухи, град, зливи, пожежі та інші), попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних захворювань, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.


Підписи:



Роман ОСАДЧИЙ



Святослав ДРІБНОХОД



Олександр МИРГОРОДСЬКИЙ