

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

25.07.2025 року

м. Конотоп

Нами: інженером-лісопатологом I категорії відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Коровкою Т.І., інженером з охорони та захисту лісу філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Книшом А.О., лісничим Конотопського лісництва Степанцем А.М., лісничим Путивльського лісництва Бунякіним Є.О., помічником лісничого Новомутинського лісництва Вашенком С.О., помічником лісничого Бочечківського лісництва Титовою І.О., помічником лісничого Кролевецького лісництва Дрозд О.М., лісничим Дубовицького лісництва Петрикесом Ю.А., лісничим Грузчанського лісництва Степанцем С.І., разом з лісовою охороною Конотопського, Путивльського, Новомутинського, Бочечківського, Кролевецького, Дубовицького та Грузчанського лісництв проведено лісопатологічне обстеження насаджень Конотопського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Сумської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **346,6 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Конотопське лісництво – 22,2 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
59	7	0,3	10СЗ	66	0,50	1	23	28	255
59	13	2,5	9СЗ(66)1СЗ(90)	66	0,85	1	22	24	390
59	16	2,3	10СЗ	91	0,50	1	26	36	290
62	25	4,9	10СЗ	100	0,50	1	27	32	305
65	18	3,2	10СЗ+СБ+АКБ	66	0,70	1	23	28	340
65	19	1,7	10СЗ	81	0,55	1	26	32	320
66	1	1,3	10СЗ	81	0,60	2	23	30	290
66	2	1,7	10СЗ	81	0,65	1	24	30	330
68	16	4,3	10СЗ	61	0,65	1А	24	28	330

За результатами обстеження даних ділянок було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами коренева і соснова губка та також пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження - слабкий та середній, характер всихання - груповий та куртиний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з пошкодженнями стовбуровими та комлевими гнилями. Були виявлені дерева з плодовими тілами сірчано-жовтого трутовика, справжнього трутовика, з ознаками ураження раком-сірянкою. В насадженні присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Путивльське лісництво - 53,7 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
13	1	5,5	6ДЗ2КЛГ2ЛПД+ОС+БП	90	0,70	2	26	40	300
13	20	2,7	6ДЗ2ЛПД1ОС1КЛГ	75	0,65	1	23	30	220
19	14	5,1	7ДЗ2ЛПД1БП+ВЛЧ+ОС	85	0,65	1	25	32	260
19	17	5,4	3ОС2БП2ДЗ2ЛПД+КЛГ	80	0,70	1	27	32	280
21	13	4,0	5ДЗ3КЛГ+БП+ЛПД	105	0,70	2	26	36	270
28	10	7,6	6ДЗ2ЛПД2КЛГ-ОС-БП	100	0,65	2	26	36	260
35	9	4,2	8ДЗ1ЛПД1КЛГ+БП+ОС	110	0,60	2	28	40	290
36	1	14,0	10ДЗ+ЛПД+КЛГ	110	0,50	2	27	40	230
36	2	5,2	10ДЗ+ЛПД+КЛГ	110	0,50	2	27	40	230

В ході проведення лісопатологічного обстеження було виявлено, що на даних ділянках дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження - слабкий та середній, характер розповсюдження - дифузний та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: несправжній дубовий трутовик, сірчано-жовтий трутовик, справжній трутовик, опеньок осінній, трахеомікоз та вертицильозне в'янення, про що свідчать наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (III-IV категорії стану) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками. Окрім цього в насадженні присутні дерева з виваленою кореневою системою, зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Путивльське (Бунякинське) лісництво - 9,5 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
56	5	4,5	10ДЗ+КЛГ	110	0,6	2	25	44	250
57	13	5	5ДЗ2БП2КЛГ1ЯЗ+ЛПД	110	0,6	2	25	36	250

За результатами лісопатологічного обстеження було виявлено, що на даних ділянках дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження - слабкий та середній, характер розповсюдження - дифузний та груповий. Серед хвороб відмічено несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, бактеріальний рак, справжній трутовик, халаровий некроз та вертицильозне в'янення, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (III-IV категорії стану) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками (вхідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери). Окрім цього, в насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з ознаками пошкодження низькими температурами (морозобоїнами), через які проникають збудники інфекційних хвороб, які згодом призводять до ураження стовбурів гнилизною.

Новомутинське лісництво - 42,7 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
44	6	0,4	10ДЗ-СЗ	86	0,6	2	24	32	260
44	7	0,8	8ДЗ1С31БП	111	0,5	2	26	32	220
45	16	1,5	6ДЗ2БП2СЗ	82	0,5	1	24	36	220
56	2	1,0	6ДЗ2С 32БП	111	0,5	2	26	36	220
56	22	1,6	9ДЗ1СЗ-БП	101	0,6	2	24	30	260
57	5	0,8	10ДЗ+БП-ОС	91	0,65	1	27	32	300
57	6	0,4	4ДЗ3БП1С32ОС	70	0,6	1	26	32	270
57	25	1,3	9ДЗ1БП	116	0,65	2	26	32	275
63	18	0,5	9ДЗ1СЗ	121	0,4	2	26	36	185
75	6	1,1	5ДЗ5СЗ+ОС	71	0,65	1	24	28	350
77	8	2,0	10ДЗ+БП+ОС+СЗ	101	0,7	2	26	36	300
77	12	2,0	10БП+ДЗ+ЛПД	51	0,8	1А	22	22	230
79	27	1,6	7ДЗ3БП	101	0,6	3	22	28	205
80	10	2,5	9ДЗ1СЗ-БП	106	0,65	3	23	32	250

При обстеженні насаджень вищеперелічених ділянок було встановлено, що дерева та групи дерев відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження - слабкий та середній, характер розповсюдження - дифузний та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: несправжній дубовий трутовик, сірчано-жовтий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, березовий трутовик, осиковий трутовик, трахеомікоз та вертицильозне в'янення, коренева губка, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (III-IV категорії стану) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками (вхідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери). Окрім цього, в насадженнях присутні дерева з морозобоїнами, з виваленою кореневою системою зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
45	4	1,1	10СЗ+ДЗ+БП	91	0,7	1Б	33	44	550
44	11	0,7	9СЗ1БП	70	0,65	1А	28	32	380
46	13	1,7	10СЗ+БП+ДЗ	67	0,7	1Б	29	36	460
47	3	0,1	10СЗ	91	0,5	1	29	40	340
47	12	3,0	10СЗ+БП	101	0,7	1	27	36	420
49	6	0,3	10СЗ	86	0,6	1	28	36	385
57	27	1,7	10СЗ+КЛЯ	81	0,65	1Б	32	40	485
59	11	0,5	10СЗ+ДЗ	76	0,6	2	22	32	280
60	10	2,5	6СЗ3ДЗ1БП	71	0,75	1В	32	40	425

60	4	2.0	10СЗ	91	0.65	1Б	33	40	500
62	19	1.2	8СЗ2ДЗ	76	0.7	1Б	32	36	460
73	18	0.7	8СЗ(76)2СЗ(106)	76	0.6	1	24	30	310
73	19	0.8	8СЗ(55)2СЗ(76)+БП	55	0.6	1	21	24	260
75	16	1.4	6СЗ2ДЗ2ВЛЧ	66	0.65	1В	32	36	380
80	14	0.8	10СЗ+ДЗ	86	0.65	1Б	34	40	520
86	5	1.0	6СЗ4БП	96	0.5	1	28	36	230
86	8	2.0	10СЗ+БП	71	0.7	2	21	24	310
86	34	0.9	10СЗ+БП+ДЗ	76	0.7	1	24	26	370
86	24	2.5	10СЗ	76	0.8	3	19	20	280
89	1	0.3	10СЗ	76	0.65	1	25	30	350

За результатами обстеження даної ділянки було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами коренева губка і соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження - середній, характер всихання — груповий та куртиний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, березового трутовика, несправжнього вільхового трутовика, з ознаками ураження раком-сірянкою. В насадженні присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Бочечківське лісництво - 16,7 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
12	10	0.8	10СЗ+ДЗ	71	0.7	1	24	28	360
29	19	0.7	8СЗ2ДЗ	81	0.6	1А	28	36	360
46	6	1.0	10СЗ+ДЗ	76	0.75	1А	28	32	480
53	23	1.6	10СЗ+ЯЛЕ+ДЗ	71	0.75	1А	28	32	480
53	29	1.3	10СЗ+ДЗ	73	0.7	1А	29	36	470
54	36	0.2	10СЗ+БП+ДЗ	76	0.7	1А	27	32	420
54	37	0.3	10СЗ+ДЗ	76	0.7	1А	27	30	430
54	39	0.2	9СЗ1ДЗ+БП	71	0.5	1А	26	32	290
55	17	0.6	10СЗ+БП	111	0.6	2	28	52	380
56	27	1.5	10СЗ	85	0.7	1	28	32	440
62	20	0.5	10СЗ+БП	71	0.7	1А	28	32	440
62	21	0.5	10СЗ+БП	81	0.7	1А	29	36	530
64	14	0.8	10СЗ+БП	81	0.7	1А	28	32	455
64	38	0.5	10СЗ+ДЗ	86	0.6	1	28	36	380
66	2	2.0	8СЗ2БП+СВЕ+ДЗ	45	0.6	2	16	24	180
67	4	1.2	9СЗ1БП+ДЗ	66	0.6	1А	27	30	350
67	8	0.4	7СЗ2ОС1БП+ДЗ	66	0.6	1А	26	30	370

70	9	0,4	10СЗ	64	0,75	1А	25	30	420
77	27	1,9	10СЗ+ВЛЧ+БП	80	0,65	1	24	32	330
80	61	0,3	10СЗ	44	0,7	1	17	20	220

В ході обстеження вищеперелічених ділянок було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами коренева і соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження - слабкий та середній, характер всихання - груповий та куртинний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, з ознаками ураження раком-сірянкою, справжнього трутовика, осикового трутовика та березового трутовика, несправжнього вільхового трутовика. В насадженні присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з ознаками пошкодження низькими температурами (морозобоїнами), через які проникають збудники інфекційних хвороб, які згодом призводять до ураження стовбурів гнилизною.

Кролевецьке лісництво - 48,5 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
16	4	4,4	8СЗК2ДЗ+ТК+БП+АКБ	81	0,6	1А	28	32	360
16	10	4,8	9СЗК1ДЗ+БП+КЛГ+ОС	81	0,6	1А	29	34	360
31	4	3,3	6СЗ2АКБ1БП1БРС+КЛГ+ЯЗ	82	0,6	1	27	32	280
53	7	18,0	10СЗК+ДЗ+КЛГ+БП	80	0,65	1А	28	34	410
61	3	18,0	8СЗ1ДЗ1АКБ+БРС+КЛГ	80	0,65	1А	28	32	340

За результатами обстеження даних ділянок було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами коренева і соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження - середній, характер всихання - дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з пошкодженнями стовбуровими та комлевими гнилями, дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, березовим трутовиком, з ознаками ураження раком-сірянкою, халаровим некрозом. В насадженні присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з ознаками пошкодження низькими температурами (морозобоїнами), через які проникають збудники інфекційних хвороб, які згодом призводять до ураження стовбурів гнилизною.

Кролевецьке (Ярославеське) лісництво - 45,4 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
34	14	18,0	4Я32ДЗБПІЛПДІКЛГ	70	0.7	І	27	36	290
37	1	9,4	ЗДЗЯЗ2КЛГ2БПІОС	76	0.7	І	25	30	290
46	1	18,0	ЗДЗЯЗ2КЛГІЛПДІБП	66	0.7	І	23	28	270

При обстеженні насаджень вищеперелічених ділянок було встановлено, що дерева та групи дерев відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження - слабкий та середній, характер розповсюдження - поодинокий та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: несправжній дубовий трутовик, халаровий некроз, бактеріальний рак ясеня, променястий трутовик, опеньок осінній, березовий трутовик, трахеомікоз та вертицильозне в'янення, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (III-IV категорії стану) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками (вхідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери). Окрім цього, в насадженнях присутні дерева з виваленою кореневою системою, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з ознаками пошкодження низькими температурами (морозобоїнами), через які проникають збудники інфекційних хвороб, які згодом призводять до ураження стовбурів гнилизною.

Грузчанське лісництво - 40,4 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
1	17	26,5	ІОСЗ	78	0.7	ІА	30	36	490
51	3	4,8	ІОСЗ+ДЗ+КЛГ	76	0.55	ІБ	30	32	400
51	5	3,2	ІОСЗ+ДЗ+БП	81	0.7	ІА	30	36	510
51	7	5,9	ІОСЗ+ДЗ+БП	74	0.75	ІБ	31	36	510

В ході обстеження даних ділянок було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами коренева і соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження - середній, характер всихання - дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами несправжнього дубового трутовика, березового трутовика, з ознаками ураження раком-сірянкою, вертицильозного в'янення. В насадженні присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з ознаками пошкодження низькими температурами (морозобоїнами), через які проникають збудники інфекційних хвороб, які згодом призводять до ураження стовбурів гнилизною.

Дубовицьке лісництво - 67,5 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
2	8	15,4	7С3ІДЗІБПІЯЛЕ+ОС+ДЧР	64	0.7	ІА	26	30	320
15	28	1,3	ІОСЗК	68	0.6	ІА	28	32	380
15	29	2,7	ІОСЗК+БП	86	0.6	ІА	29	36	360
21	2	3,0	ІОСЗК+БП	84	0.6	ІА	30	36	410
21	3	4,9	ІОСЗК+БП	84	0.6	ІА	31	40	420
21	12	3,8	ІОСЗК+БП+ОС	84	0.6	ІА	30	36	390
37	3	16,8	ІОСЗК+ДЗ	73	0.6	ІБ	31	32	420
51	21	4,5	ІОСЗ+БП+ДЗ	71	0.65	ІБ	29	36	400
69	3	4,7	ІОСЗ+ДЗ+БП	81	0.6	ІА	29	36	410
69	9	8,6	9СЗІБРС+ДЗ	71	0.7	ІБ	30	36	440

За результатами обстеження даних ділянок було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами коренева і соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження - середній, характер всихання - дифузний, груповий та куртиний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Деревя у міжсередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, з ознаками ураження раком-сірянкою, березового трутовика, осикового трутовика. В насадженні присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
2	22	1,8	8ДЗ2СЗ+БП	101	0.65	2	27	32	290

При обстеженні насаджень даного виділу було встановлено, що дерева та групи дерев відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження - слабкий та середній, характер розповсюдження - поодинокий та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, березовий трутовик, коренева губка про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (III-IV категорії стану) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками (вхідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери). Окрім цього, в насадженнях присутні дерева з виваленою кореневою системою зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з ознаками пошкодження низькими температурами

морозобоїнами), через які проникають збудники інфекційних хвороб, які згодом призводять до ураження стовбурів гнилизною.



ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани, що в свою чергу негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб і шкідників. Враховуючи біологічні особливості виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано, керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2025 році, з урахуванням ступеню поширення виявлених хвороб — вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **346,6 га.**), з вилученням з деревостанів небезпечних сухостійних, відмираючих дерев, з ознаками ураження стовбуровими та комлевими гнилями, дерев з ознаками заселення стовбуровими шкідниками та дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних хвороб. Адже зменшити наслідки розвитку стовбурових шкідників та інфекційних хвороб, попередити розповсюдження по площі та масове розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист».
- 2 – Конотопське надлісництво філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»
- 3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи

	Коровка Т.І
	Книш А.О.
	Степанець А.М.
	Бунякін Є.О.
	Вашченко С.О.
	Титова І.О.
	Дрозд О.М.
	Петрикей Ю.А.
	Степанець С.І