

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

17.12.2024 року

м. Конотоп

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм С. В., головний мікробіолог – начальник відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., головним лісничим Філії «Конотопське лісове господарство» ДП «Ліси України» Бондарем М. О., начальником відділу лісового та мисливського господарства Філії «Конотопське лісове господарство» ДП «Ліси України» Романенком Ю. О., інженером I категорії охорони та захисту лісу Філії «Конотопське лісове господарство» ДП «Ліси України» Книш А. О. разом з лісовою охороною Бочечківського, Грузчанського, Дубовицького, Конотопського, Кролевецького, Новомутинського, Путивльського та Хрещатинського лісництв проведено обстеження насаджень Філії «Конотопське лісове господарство» ДП «Ліси України» Сумської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – 289,7 га.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Бочечківське лісництво (33,6 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	боїтет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
15	14		0,8	10СЗ	86	0,60	1	27	30	400
25	8		0,5	10СЗ+ДЗ	91	0,50	2	24	32	260
28	3		0,5	10СЗ+ДЗ	81	0,65	1	27	30	400
28	23		1,2	9СЗ1ДЗ	86	0,70	1	28	32	430
29	6		0,8	10СЗ+БП	86	0,60	1	28	30	400
29	9		0,9	10СЗ	81	0,70	1	25	28	390
31	14		1,1	10СЗ+ДЗ+БП	76	0,70	1А	29	32	470
33	39		1,2	10СЗ+БП+ЯЛЕ+ДЗ	86	0,65	1А	29	40	430
39	5		0,9	10СЗ	86	0,65	1	28	40	410
41	42		1,0	10СЗ+ДЗ	91	0,70	1	27	40	430
48	1	2	2,3	9СЗ1ДЗ	85	0,45	1	28	40	260
49	5		3,1	7СЗ3БП	36	0,60	2	12	14	130
49	6		1,3	8СЗ2БП+ДЗ	43	0,70	2	15	18	200
50	22		1,4	10СЗ+БП	72	0,70	1А	27	30	430
66	9		1,2	10СЗ+БП	86	0,70	1А	29	32	470
69	12		2,3	10СЗ+ДЗ+БП	80	0,70	1А	28	36	450
70	4		1,8	9СЗ1БП	85	0,60	1	27	32	360
70	14		1,0	10СЗ	85	0,70	1А	29	36	460
70	17		1,4	10СЗ+ДЗ	81	0,65	1А	28	40	430
70	18		2,1	10СЗ+БП	85	0,70	1	28	36	450
71	32		1,1	10СЗ+БП	111	0,60	2	28	44	390
80	15		1,0	10СЗ	81	0,65	1А	28	32	425
80	5		1,1	10СЗ	81	0,70	1	24	30	360
80	14		2,4	6СЗ2ДЗ2БП	77	0,70	1	26	32	300
89	4		1,2	10СЗ+ДЗ	76	0,70	1А	28	36	450

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними

породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжсередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (вершинний та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, березової губки, березового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Гручанське лісництво (16,9 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
11	4	3	5,1	10Сз+Дз+Бп	86	0,70	1А	30	36	500
11	13	3	8,5	10Сз+Дз+Бп+Ос	86	0,70	1А	30	36	480
11	18	2	3,3	10Сзк+Дз+Ос	86	0,70	1А	30	36	450

В ході проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжсередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (вершинний та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, несправжнього осикового трутовика, березової губки, березового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Дубовицьке лісництво (61,1 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
25	4	6,0	7Сзк2Ос1Бп+Яле+Дз	76	0,60	1А	29	36	360
26	2	21,1	10Сзк+Бп+Брс	71	0,70	1Б	30	32	490
53	1	2,9	10Сз	76	0,60	1А	28	36	370
53	2	7,2	10Сз+Бп	69	0,65	1А	27	36	380
64	30	0,6	10Сз+Бп	96	0,60	1А	31	40	420
65	26	1,5	9Сз1Дз	111	0,70	1	30	44	430
65	27	1,5	10Сз	76	0,70	1Б	31	32	490
65	28	1,2	9Сз1Дз	111	0,65	1	31	44	450
65	45	0,8	10Сз+Дз	111	0,70	1	29	48	440
76	2	1,6	10Сз+Яле	66	0,70	1Б	29	28	470

76	4	2,0	10СЗ+ДЗ+Акб	78	0,60	1А	30	36	420
76	14	10,3	9СЗ1ДЗ+Бп	76	0,65	1А	29	36	410
76	22	1,3	10СЗ+ДЗ+Бп	66	0,60	1Б	29	32	390
76	23	3,1	7СЗ2ДЗ1Бп	71	0,65	1Б	29	36	360

Під час проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (вершинний та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами несправжнього дубового трутовика, облямованого трутовика, березової губки, березового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Конотопське лісництво (31,7 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
47	5		2,0	10СЗ	86	0,85	2	23	30	410
47	22		1,9	10СЗ	101	0,60	1	28	36	380
52	32	1	1,4	10СЗ	81	0,55	1	26	32	400
56	15		7,3	10СЗ	100	0,60	1	30	40	410
56	19	1	0,7	10СЗ	81	0,50	1	24	30	260
56	21		7,2	10СЗ+БП+ДЗ	100	0,50	1	29	42	337
62	8		5,8	10СЗ	100	0,50	1	27	40	305
69	15		5,4	10СЗ	65	0,70	1	21	22	305

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (вершинний та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика та ознаками ураження раком сірянкою. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Кролевецьке лісництво (51,2 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
3	28	16,2	7СзкЗАкб+Бп+Брс+Клг	84	0,65	1	27	32	280
23	1	11,5	10Сзк+Дз+Бп+Акб	80	0,65	1А	28	32	390
69	16	11,8	10Сз+Клг+Лпд+Акб	86	0,65	1	28	34	400
70	3	3,8	9Сз1Дз+Акб+Лпд	81	0,60	1	27	32	330
70	6	3,0	10Сз	86	0,60	1	26	36	330
70	8	4,9	10Сз	81	0,75	3	19	28	250

В ході проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (вершинний та шестизубий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, трутовика звичайного, звичайного трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, вертицильозним в'яненням. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Новомутинське лісництво (43,0 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
44	1		25,6	10СЗ+БП+ДЗ+БРС	66	0,69	1Б	29	32	455
46	14		3,7	9СЗ1ДЗ	121	0,63	1А	33	50	470
58	7		1,1	9СЗ1БП+ДЗ	67	0,70	1А	27	32	400
58	8		3,6	9СЗ1ДЗ+БП	111	0,65	1А	32	50	470
58	10		5,0	7СЗ3ДЗ+БП	121	0,65	1А	33	52	420
71	2		0,3	10СЗ	76	0,65	1	25	28	360
71	3		1,6	10СЗ	111	0,70	2	28	32	440
71	14		0,6	10СЗ	91	0,50	1	26	36	300
80	15	2	1,5	8СЗ2ДЗ	86	0,65	1Б	34	40	480

Під час проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою,

вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (вершинний та шестизубий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами несправжнього дубового трутовика, облямованого трутовика, березової губки, березового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Путівльське лісництво (3,3 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
25	22	2,6	9С31ДЗ+БП	99	0,55	1	29	40	345
25	23	0,7	9С31ДЗ+БП	89	0,50	1	27	36	290

Під час проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжсередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (вершинний та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами несправжнього дубового трутовика, облямованого трутовика, березової губки, березового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Хрещатинське лісництво (48,9 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
23	21		2,5	10СЗ+ДЗ+БП	71	0,75	1Б	29	40	510
71	12	2	11,4	10СЗК+БП	80	0,7	1А	29	36	460
76	1		15,0	9СЗК1БП+АКБ	72	0,7	1А	27	32	400
78	30		1,2	9СЗ1БП+ДЗ+ВЛЧ	86	0,65	1А	30	40	430
80	23		1,3	7СЗ1БП+ДЗ1ЛПД+ВЛЧ+КЛГ	71	0,7	1Б	29	36	400
84	30		0,2	10СЗ	81	0,7	1А	29	36	480
88	4		2,0	8СЗ1БП1КЛГ+ДЗ	71	0,75	1Б	29	40	440
98	14		1,0	10СЗК+АКБ	81	0,6	1А	29	36	400
98	19		12,0	9СЗК1БП+АКБ	80	0,7	1А	30	40	460
100	1		2,3	10СЗ+ДЗ+БП	66	0,65	1Б	28	32	410

В ході проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними

породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (вершинний та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, березової губки, трутовика звичайного, березового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.


ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хворобами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуватись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2025 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів. Враховуючи ступінь ураження інфекційними хворобами, розповсюдження стовбурових шкідників - вибіркові санітарні рубки (на загальній площі 289,7 га), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комплексними гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних хвороб. Адаже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- ДСЛП «Харківлісзахист»;
- філія «Конотопське ЛГ»;
- Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

Підписи:

 С. В. Воробей
 А. Д. Воробей
 М. О. Бондар
 Ю. О. Романенко
 А. О. Книш