

**обстеження насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок
в насадженнях філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»,
Рахівського надлісництва**

10 жовтня 2025 року

с. Луги

Нами, заступником начальника відділу лісового та мисливського господарства у Закарпатській області ЗМРУЛМГ Романом СОБОЛІВСЬКИМ, головним спеціалістом відділу лісового та мисливського господарства у Закарпатській області Юрієм ЦАЛАНОМ, заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Богданської сільської ради Миколою ГАВ'ЮКОМ, начальником Закарпатського опорного лісопатологічного пункту ДСЛП „Львівлісозахист” Олександром ГАЙЧЕНЯМ, за участю в.о. помічника лісничого Білотисянського лісництва Василя КУШНІРА проведено комісійне обстеження лісового насадження на предмет доцільності проведення в ньому суцільної санітарної рубки.

Матеріали відведення і таксації лісосік наведені згідно даних наданих працівниками філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.

Білотисянське лісництво

Квартал 1, виділ 7.10, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: квартал 1, виділ 7, площа 70,0 га, склад 10Яле+Яцб+Бкл+Яв, вік 91 рік, повнота 0,70, бонітет 16, середня висота 33 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 730 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній, поодинокі наявні дерева уражені раком ялиці, трутовиком. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить в верх спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 53 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 1, виділ 7.11, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: квартал 1, виділ 7, площа 70,0 га, склад 9Яле1Бкл+Яв+Яз, вік 91 рік, повнота 0,70, бонітет 16, середня висота 33 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 730 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 54 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 1, виділ 7.12, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: квартал 1, виділ 7, площа 70,0 га, склад 9Ялє1Бкл+Яв+Яз, вік 91 рік, повнота 0,70, бонітет 1б, середня висота 33 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 730 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній, поодинокі наявні дерева уражені раком ялиці, трутовиком, стовбуровими та кореневими гнилями. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 55 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 5.5, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 5, виділ 5, площа 29,5 га, склад 9Ялє1Бкл, вік 59 років, повнота 0,75, бонітет 1б, середня висота 29 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 650 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній, стовбуровими та кореневими гнилями. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 63 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 5.7, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: квартал 5, виділ 5, площа 29,5 га, склад 9Ялє1Бкл, вік 59 років, повнота 0,75, бонітет 1б, середня висота 29 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 650 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній, поодинокі наявні дерева уражені трутовиком, раком ялиці, стовбуровими та кореневими гнилями. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап)

базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 63 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 57.3, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: квартал 22, виділ 57, площа 7,0 га, склад 10Яле+Яцб+Бкл, вік 60 років, повнота 0,80, бонітет 1б, середня висота 27 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 620 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 52 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 45.1, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: квартал 22, виділ 45, площа 7,8 га, склад 10Яле+Яцб, вік 61 рік, повнота 0,75, бонітет 1а, середня висота 25 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 520 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 61 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 45.2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 22, виділ 45, площа 7,8 га, склад 10Яле+Яцб, вік 61 рік, повнота 0,75, бонітет 1а, середня висота 25 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 520 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 64 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини, керуючись «СПЛУ» вважаємо за доцільне провести суцільні санітарні рубки на загальній площі 6,8 га; загальною кубомасою 4709м³ в т. ч. ліквідної – 3715м³, ділової – 2303 м³;

Білотисянське лісництво

Кв. 1, виділ 7.10, площа 0,7 га 508 м³, в т. ч. ліквідної – 425м³, ділової – 280 м³;
Кв. 1, виділ 7.11, площа 0,9 га 689 м³, в т. ч. ліквідної – 562м³, ділової – 379 м³;
Кв. 1, виділ 7.12, площа 0,8 га 553 м³, в т. ч. ліквідної – 471м³, ділової – 233 м³;
Кв. 5, виділ 5.5, площа 1,0 га 559 м³, в т. ч. ліквідної – 428м³, ділової – 138 м³;
Кв. 5, виділ 5.7, площа 0,7 га 470 м³, в т. ч. ліквідної – 376м³, ділової – 139 м³;
Кв. 22, виділ 45.1, площа 0,8 га 652 м³, в т. ч. ліквідної – 491м³, ділової – 386 м³;
Кв. 22, виділ 45.2, площа 1,0 га 721 м³, в т. ч. ліквідної – 522м³, ділової – 402 м³;
Кв. 22, виділ 57.3, площа 0,9 га 557 м³, в т. ч. ліквідної – 440м³, ділової – 346 м³;

1. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.
2. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.
3. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.
3. План відведених в рубку ділянок.


Головний спеціаліст ЗМРУЛМГ,
відділу лісового та мисливського
господарства у Закарпатській області

 Юрій ЦАЛАН

Заступник начальника відділу лісового
та мисливського господарства у Закарпатській
області ЗМРУЛМГ

 Роман СОБОЛІВСЬКИЙ

Заступник сільського голови з питань
діяльності виконавчих органів
Богданської сільської ради

 Микола ГАВ'ЮК

Начальник відділу Закарпатського
ОЛП ДСЛП „Львівлісозахист”

 Олександр ГАЙЧЕНЯ

В.о. пом. лісничий Білотисянського лісництва

 Василь КУШНІР