

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

23 травня 2025 року

м. Суми

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., головним лісничим ДП «Миколаївський агролісгосп» Маслюком В. Г., разом з лісовою охороною проведено лісопатологічне обстеження насаджень ДП «Миколаївський агролісгосп» ОКАП «Сумиоблагроліс» Сумської області з метою визначення та оцінки санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **202.0 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1
33	14	1.6	10ДЗ	60	0.60	1А	24	32	260
41	7	9.6	5ДЗ2КЛГ2ЛПД1БРС+ЯЗЛ+ЯЗ+ОС	80	0.70	2	23	28	250
41	17	2.4	5ДЗ2КЛГ2ЛПД1БРС+ЯЗЛ+ЯЗ+ОС	80	0.70	2	23	28	280
41	18	2.7	6ДЗ2КЛГ1ЛПД1БРС+ЯЗЛ+ЯЗ+ОС	80	0.70	2	23	28	280
44	31	4.8	8ДЗ1КЛГ1ЛПД+ТБ+КЛЯ	70	0.70	2	20	26	200
44	32	1.6	10ДЗ+КЛГ+ЛПД	45	0.70	2	16	20	160
48	33	4.8	5ДЗ3ЯЗ2КЛГ+АКБ	42	0.60	1	16	20	130
62	1	2.7	10ДЗ+ЛПД	75	0.60	1	24	30	260
62	3	1.7	1 Яр.10ДЗ 2 Яр. 10ЛПД	85/25	0.50/0.30	2	24/8	30/8	240
69	27	11.1	6ДЗ2ЯЗ1ЛПД1КЛГ+БРС	91	0.70	2	25	30	310
86	10	13.2	4ДЗ5ЛПД1КЛГ+ОС	70	0.60	1	25	32	265
86	11	23.0	4ЯЗ3КЛГ2ЛПД1ДЗ+БП	65	0.70	1	24	28	290
87	12	16.7	5ДЗ3КЛГ1ЛПД1БРС	70	0.70	2	24	32	250
98	13	2.5	10ДЗ+ЛПД+БП	85	0.60	2	23	30	240
98	21	14.1	4ДЗ4ЛПД2КЛГ	91	0.70	3	23	32	265
99	4	1.8	10ДЗ+ЯЗЛ	66	0.60	1	22	28	230
99	5	2.5	7ЯЗЛ2БРС1АКБ+КЛГ+ДЗ	61	0.60	1А	23	30	210
99	6	1.2	4ДЗ4БРС2ЯЗЛ+КЛЯ	61	0.60	1	22	28	215
99	8	4.5	10ДЗ+ЛПД	85	0.60	2	22	28	230
99	9	1.5	10ДЗ+КЛГ	86	0.70	1	25	30	330
99	10	1.2	6ДЗ4ЯЗ+ЯЗЛ+БП	81	0.60	2	23	30	270
99	13	3.7	10ДЗ+БП+ЛПД	96	0.60	2	25	32	280
101	26	1.6	8ДЗ2БП	61	0.70	1	22	28	260
101	28	0.4	5ДЗ5БП	70	0.60	1	24	30	230
101	25	3.5	10ДЗ	61	0.70	1А	24	28	310
153	3	6.1	8ДЗ2ЛПД+КЛГ	72	0.70	1	24	30	300

В результаті лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий, характер розповсюдження – дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, сірчано – жовтий трутовик,

печіночниця звичайна, бактеріальний рак ясена, трутовик звичайний, лускатий трутовик, березова губка, графіоз, бактеріальний рак водянка та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
48	35	8.4	4СЗЗЯЗЗКЛГ	42	0.60	1А	19	22	170
67	43	1.1	10СЗ	50	0.60	1А	22	28	280
70	27	1.3	10СЗ+ДЧР+ДЗ	46	0.60	1	18	22	220

Лісопатологічним обстеженням даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження середній, характер всихання груповий та куртинний. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, трутовика звичайного та ознаками ураження кореневою губкою та раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
62	2	1.8	6ЛПД2КЛГ1БП1ДЗ+БРС	50	0.60	1	22	22	210
88	8	7.2	10ЛПД+БП+ЯЗ	52	0.60	2	18	20	160
153	2	6.2	6ЛПД2ДЗ2КЛГ+ОС	70	0.60	2	24	30	240
153	5	20.9	7ЛПД2ДЗ1КЛГ+ОС	72	0.60	2	21	24	200

Під час лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження – дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: вертицильозне в'янення, несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, сірчано – жовтий трутовик та трутовик звичайний. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
22	17	14.6	10ВЛЧ	70	0.60	2	23	30	230

В ході проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами, ступінь ураження слабкий, характер розповсюдження – дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній вільховий трутовик, сірчано – жовтий трутовик та лускатий трутовик. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.



ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження хвороб та шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуватись п. 12 – 26 «Санітарними правилами в лісах України» провести у 2025 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **202.0 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибів. Адже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можливе тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист».
- 2 – ДП «Миколаївський агролісгосп».
- 3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи:

 С. В. Воробей
 А. Д. Воробей
 В. Г. Маслюк

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

23 травня 2025 року

м. Суми

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., головним лісничим ДП «Миколаївський агролісгосп» Маслоком В. Г., разом з лісовою охороною проведено лісопатологічне обстеження насаджень ДП «Миколаївський агролісгосп» ОКАП «Сумиоблагроліс» Сумської області з метою визначення та оцінки санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **202.0 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1
33	14	1.6	10ДЗ	60	0.60	1А	24	32	260
41	7	9.6	5Д32КЛГ2ЛПД1БРС+ЯЗЛ+ЯЗ+ОС	80	0.70	2	23	28	250
41	17	2.4	5Д32КЛГ2ЛПД1БРС+ЯЗЛ+ЯЗ+ОС	80	0.70	2	23	28	280
41	18	2.7	6Д32КЛГ1ЛПД1БРС+ЯЗЛ+ЯЗ+ОС	80	0.70	2	23	28	280
44	31	4.8	8Д31КЛГ1ЛПД+ТБ+КЛЯ	70	0.70	2	20	26	200
44	32	1.6	10ДЗ+КЛГ+ЛПД	45	0.70	2	16	20	160
48	33	4.8	5Д33Я32КЛГ+АКБ	42	0.60	1	16	20	130
62	1	2.7	10ДЗ+ЛПД	75	0.60	1	24	30	260
62	3	1.7	1 Яр.10ДЗ 2 Яр. 10ЛПД	85/25	0.50/0.30	2	24/8	30/8	240
69	27	11.1	6Д32Я31ЛПД1КЛГ+БРС	91	0.70	2	25	30	310
86	10	13.2	4Д35ЛПД1КЛГ+ОС	70	0.60	1	25	32	265
86	11	23.0	4Я33КЛГ2ЛПД1ДЗ+БП	65	0.70	1	24	28	290
87	12	16.7	5Д33КЛГ1ЛПД1БРС	70	0.70	2	24	32	250
98	13	2.5	10ДЗ+ЛПД+БП	85	0.60	2	23	30	240
98	21	14.1	4Д34ЛПД2КЛГ	91	0.70	3	23	32	265
99	4	1.8	10ДЗ+ЯЗЛ	66	0.60	1	22	28	230
99	5	2.5	7ЯЗЛ2БРС1АКБ+КЛГ+ДЗ	61	0.60	1А	23	30	210
99	6	1.2	4Д34БРС2ЯЗЛ+КЛЯ	61	0.60	1	22	28	215
99	8	4.5	10ДЗ+ЛПД	85	0.60	2	22	28	230
99	9	1.5	10ДЗ+КЛГ	86	0.70	1	25	30	330
99	10	1.2	6Д34ЯЗ+ЯЗЛ+БП	81	0.60	2	23	30	270
99	13	3.7	10ДЗ+БП+ЛПД	96	0.60	2	25	32	280
101	26	1.6	8Д32БП	61	0.70	1	22	28	260
101	28	0.4	5Д35БП	70	0.60	1	24	30	230
101	25	3.5	10ДЗ	61	0.70	1А	24	28	310
153	3	6.1	8Д32ЛПД+КЛГ	72	0.70	1	24	30	300

В результаті лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий, характер розповсюдження – дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, сірчано – жовтий трутовик,

печіночниця звичайна, бактеріальний рак ясена, трутовик звичайний, лускатий трутовик, березова губка, графіоз, бактеріальний рак водянка та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
48	35	8.4	4СЗЗЯЗЗКЛГ	42	0.60	1А	19	22	170
67	43	1.1	10СЗ	50	0.60	1А	22	28	280
70	27	1.3	10СЗ+ДЧР+ДЗ	46	0.60	1	18	22	220

Лісопатологічним обстеженням даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження середній, характер всихання груповий та куртинний. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, трутовика звичайного та ознаками ураження кореневою губкою та раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
62	2	1.8	6ЛПД2КЛГ1БП1ДЗ+БРС	50	0.60	1	22	22	210
88	8	7.2	10ЛПД+БП+ЯЗ	52	0.60	2	18	20	160
153	2	6.2	6ЛПД2ДЗ2КЛГ+ОС	70	0.60	2	24	30	240
153	5	20.9	7ЛПД2ДЗ1КЛГ+ОС	72	0.60	2	21	24	200

Під час лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження – дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: вертицильозне в'янення, несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, сірчано – жовтий трутовик та трутовик звичайний. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
22	17	14.6	10ВЛЧ	70	0.60	2	23	30	230

В ході проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами, ступінь ураження слабкий, характер розповсюдження – дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній вільховий трутовик, сірчано – жовтий трутовик та лускатий трутовик. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодів тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження хвороб та шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуватись п. 12 – 26 «Санітарними правилами в лісах України» провести у 2025 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **202.0 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибів. Адже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можливе тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист».
- 2 – ДП «Миколаївський агролісгосп».
- 3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи:

 Є. В. Воробей
 А. Д. Воробей
 В. Г. Маслюк