

Акт
лісопатологічного обстеження насаджень
на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану,
а саме вибіркового санітарного рубок
в насадженнях Славського дочірнього лісогосподарського підприємства
„Галсільліс” (далі – Славського ДЛГП „Галсільліс”)

05 грудня 2025 року

селище Славсько

Нами, провідним інженером-лісопатологом відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства „Львівлісозахист” (далі – ДСЛП „Львівлісозахист”) Петром ДОМІНКОМ, інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства (далі – ВНДПВЛГ) ДСЛП „Львівлісозахист” Ярославом ОСТАШУКОМ, в присутності інженера лісового господарства Славського ДЛГП „Галсільліс” Світлани САГАН, інженера охорони та захисту лісу Славського ДЛГП „Галсільліс” Миколи ГОЙВАНОВИЧА з **25 по 28 листопада та з 01 по 05 грудня 2025 року** проведено обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркового санітарного рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарного рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог „Санітарних правил в лісах України” (далі – СПЛУ).

Лісопатологічний журнал додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2017 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок проведено на загальній площі **19,8 гектарів (далі – га).**

Волосянківське лісництво

Квартал 32, виділ 12, площа 3,0 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та облямований трутовики).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірково санітарну рубку за рахунок вирубування дерев III – VI категорій стану.

Росохацьке лісництво

Квартал 12, виділ 20, площа 1,4 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-

типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та облямований трутовики).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубування дерев III – VI категорій стану.

Квартал 5, виділ 7, площа 3,3 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та облямований трутовики).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубування дерев III – VI категорій стану.

Квартал 4, виділ 61, площа 1,8 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та облямований трутовики).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубування дерев III – VI категорій стану.

Бескидське лісництво

Квартал 23, виділ 4, площа 5,2 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубування дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 23, виділ 2, площа 2,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубування дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 41, виділ 4, площа 1,6 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та облямований трутовики).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку

санітарну рубку за рахунок вирубування дерев III – VI категорій стану.

Квартал 24, виділ 36, площа 1,5 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубування дерев IV – VI категорій стану.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі 19,8 га, при цьому виявлено:

Опеньок осінній – 11,5 га (середня ступінь пошкодження).

Стовбурові та кореневі гнилі – 8,3 га (середня ступінь пошкодження).

2. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини провести санітарне рубання вибіркове на площі **19,8 га**.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.


4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень


Провідний інженер-лісопатолог відділу
діагностики ДСЛП „Львівлісозахист”

 Петро ДОМІНІК


Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП „Львівлісозахист”

 Ярослав ОСТАШУК

Інженер лісового господарства
Славського ДЛГП „Галсільліс”

 Світлана САГАН

Інженер охорони та захисту лісу
Славського ДЛГП „Галсільліс”

 Микола ГОЙВАНОВИЧ