

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

24.10.2024 року

сmt. Талалаївка

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., лісничим ДП «Талалаївкарайагролісництво» Федоруком Ю. Л., разом з лісовою охороною проведено обстеження насаджень ДП «Талалаївкарайагролісництво» Чернігівської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **65,2 га**.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
14	32	2.7	8Д32ЯЗЛ	57	0.7	2	18	24	190
22	5	4.6	9Д31ЯЗЛ	47	0.7	1	17	22	200
44	18	1.9	10ДЗ+БП	77	0.7	2	21	28	250
55	13	2.8	9Д31АКБ	85	0.6	2	24	30	240
30	21	3.5	4Д33КЛГ1АКБ	92	0.6	3	21	30	190
30	13	1.4	10ДЗ	82	0.6	2	23	32	240
47	4	7.5	10ДЗ+БП+ОС	62	0.7	1	21	24	250
36	2	3,9	10ДЗ	87	0.6	2	23	30	265
42	15	2.4	7Д32КЛГ1АКБ	90	0.6	3	21	30	170
42	17	1.8	10ДЗ+БП	77	0.7	2	22	28	270
16	4	8.5	7Д33КЛГ	85	0.7	2	25	32	315

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, халаровий некроз, сірчано – жовтий трутовик, печіночниця звичайна, трутовик звичайний та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плоді тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
12	3	3.7	6ЛПД2Д31БП1КЛГ	80	0.7	1	26	32	310
12	4	2.9	5ЛПД3С32ДЗ	80	0.6	2	23	28	240
11	18	12.5	6ЛПД2КЛГ1Д31БП	95	0.7	3	23	32	280

Лісопатологічним обстеженням даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб:

вертицильозне в'янення, несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, березовий трутовик, сірчано – жовтий трутовик та трутовик звичайний. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
21	17	5.1	8ЯЗЛІБПІТЧ	67	0.7	2	20	24	215

Під час проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – середній, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: халаровий некроз, бактеріальний рак ясена, опеньок осінній, щетинистоволосий трутовик, трутовик звичайний та березовий трутовик. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений малий ясеневий лубоїд та великий ясеневий лубоїд. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.



ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хворобами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуючись п. 12 – 26 «Санітарними правилами в лісах України» провести у 2025 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **65,2 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних хвороб. Адже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист».
- 2 – ДП «Талалаївкарайагролісництво».
- 3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи:

 С. В. Воробей
 Ю. Л. Федорук