

АКТ

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів по дочірньому підприємству "Козятинський райагроліс" Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства "Віноблагроліс" (далі ДП "Козятинський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс")

"09" травня 2025 року

м. Козятин Хмельницького району
Вінницької області

Нами, завідувачем сектору нагляду, обліку і прогнозу філії "Вінницялісозахист" державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Київлісозахист" (далі - філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист") Віталієм СТЕГНЯКОМ (відповідно до листа ВОКСЛП "Віноблагроліс" від "06" травня 2025 року № 173), начальником відділу лісового господарства ВОКСЛП «Віноблагроліс» Богданом ВАСЮТОЮ, директором ДП "Козятинський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс" Андрієм СЕМЕНЮКОМ в період з 08.05.2025 року по 09.05.2025 року проведено лісопатологічне обстеження (у відповідності п. 8, 9 Порядку організації та захисту лісів затвердженого постановою КМУ від 20 травня 2022 р. № 612) в лісових насадженнях, що знаходяться в постійному користуванні ДП "Козятинський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс" на доцільність призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів. Обстеженням встановлено наступне:

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер ділянки	Площа, що потребує проведення заходів, га	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування							категорія лісів	Причини призначення заходів	Орієнтовна інтенсивність проведення заходів, %
						склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, м3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Козятинська ділянка	17	8	0.8		0.8	4БП2ЧШ2ВЗШ 1ОС1ДЗ	70	0.55	1	28	36	270	3	стовбурові гнилі, трутовики	20
	20	4	0.9		0.9	8С32ЯЛЕ	45	0.50	1	18	18	180	3	короїд типограф, соснові лубоїди, златки	20
	20	5	2.5		1.6	10ЯЛЕ	45	0.48	1А	20	20	302	3	короїд типограф, златки	25
	22	1	2.8		2.8	10ЯЗ+ЛПД	60	0.65	1В	31	32	390	3	халаровий некроз ясена, опеньок (армілярні гнилі)	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Козятинська ділянка	22	2	4.1		4.1	10ЯЗ+ЛПД	60	0.74	1В	31	32	462	3	халаровий некроз ясена, опеньок (армілярні гнилі)	10
	26	12	1.4		1.4	4ЯЗ2ЛПД2ВЗШ 2ДЗ+КЛГ+БП	75	0.60	1	24	26	250	3	халаровий некроз ясена, опеньок (армілярні гнилі)	10
	28	2	21.3		21.3	10СЗ+ОС+КЛГ	47	0.75	1В	23	24	365	3	соснові лубоїди, златки	10
	28	12	1.5		1.5	10СЗ	78	0.46	1А	28	32	337	3	соснові лубоїди, златки	10
	28	13	4.2		4.2	10СЗ	78	0.46	1А	28	32	342	3	соснові лубоїди, златки	10
	28	14	13.2		13.2	7ДЗ1ВП1ОС1ЧШ	73	0.65	2	21	28	245	3	стовбурові гнилі, трутовики, судинний мікоз дуба	10
	28	21	0.8		0.8	9СЗ1ЯЗ+БРС+ ЧШ	78	0.55	1А	28	44	345	3	соснові лубоїди, златки	10
	30	1	11.0		11.0	10СЗ+ЧШ	55	0.75	1А	23	22	375	3	соснові лубоїди, златки	10
	30	3	7.1		7.1	10СЗ+ДЗ+ОС	51	0.75	1В	24	22	390	3	соснові лубоїди, златки	10
	30	9	5.5		5.5	10СЗ	55	0.75	1А	24	22	385	3	соснові лубоїди, златки	10
	30	10	2.7		2.7	9СЗ1КЛГ+ГЗ	55	0.70	1В	25	26	330	3	соснові лубоїди, златки	10
	30	14	7.4		7.4	10СЗ+КЛГ	55	0.75	1В	25	22	410	3	соснові лубоїди, златки	10
	32	22	7.9		7.9	8ТЧ2ТБ	58	0.55	3	28	40	330	3	стовбурові гнилі, трутовики, омела біла	15
						4КЛГ2ВЗШ2ЧШ 2ГЗ	15	0.40		8	6	25			
	36	17	2.9		2.9	10ЯЗ+КЛГ	68	0.60	1А	27	28	315	3	халаровий некроз ясена, опеньок (армілярні гнилі)	10
	36	28	2.7		2.7	9ЯЗ1ДЗ+СЗ+ КЛГ+ВЗШ	78	0.50	1А	28	36	270	3	халаровий некроз ясена, опеньок (армілярні гнилі)	10
	38	2	12.3		12.3	8ЯЗ2КЛГ+ДЗ	132	0.55	1	31	48	300	2	халаровий некроз ясена, опеньок (армілярні гнилі)	10
Разом ВСР					112.1										
ВСЬОГО ВСР					112.1										

Загальна обстежена площа ДП "Козятинський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс" складає 112.1 га. По причинах призначення заходів (за переважаючим шкідником/хворобою) в загальному по надлісництву:

- соснові лубоїди	61.5 га
- халаровий некроз ясена	26.2 га
- стовбурові гнилі	21.9 га
- короїд типограф	2.5 га

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень:

Переважаючою причиною розладнання обстежених хвойних деревостанів з головною породою сосна звичайна (СЗ) є діяльність комплексу стовбурових шкідників у видовому складі яких на СЗ провідне місце посідають лубоїди соснові (лубоїд сосновий малий (*Tomicus minor*) та лубоїд сосновий великий (*Tomicus piniperda*), в меншій мірі - короїд вершинний (*Ips acuminatus*) та шести зубий короїд (*Ips sexdentatus*). Насадження пошкоджені сосновими лубоїдами в середньому ступені (до 10%) і характеризуються всиханням групового та поодинокого характеру. Крони дерев ажурні (III та особливо IV категорій стану), приріст знижений, відпад глищі більше норми. Деревя IV категорії стану характеризуються окрім ажурності сильного ступеня, зміною забарвлення глищі до світлих або бурих тонів, суховершинністю (всиханням до 2/3 крони). Сухостійні дерева також відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (переважно малим та великим сосновими лубоїдами). В наявності дерева V-ї та VI-ї категорій стану групового розміщення (групи невеликі до 3 - 4 дерев).

Також є дерева IV категорії стану зі слідами заселення стовбуровими шкідниками (вхідні та вихідні льотні отвори, бурова мука, під корою характерні для даних видів ходи на звалених деревах). Під деревами сліди життєдіяльності у вигляді "стрижених" пагонів від 3 штук до 5 шт. на м². В наявності також сухостійні дерева, в переважній більшості поодинокого та групового розміщення, які відпрацьовані комплексом златок.

Насадження в складі яких є ялина європейська (ЯЛЕ) пошкоджені короїдом типографом (*Ips typographus*) в сильному ступені (більше 10%). Характер всихання – груповий. Деревя V – VI категорій стану відпрацьовані групою стовбурових шкідників з родини златок, а дерева IV та частково III категорій стану характеризуються наявністю вхідних льотних отворів короїда типографа, про що свідчать смоляні потьoki на стовбурах дерев.

Листяні породи дерев вражені кореневими та стовбурними гнилями, які викликаються комплексом різних причин: дерева берези повислої від трутовика справжнього (*Fomes fomentarius*) та бактеріальної водянки, дерева осики від трутовика несправжнього (*Phellinus tremulae*), дерева ясена від халарового некрозу (*Chalara fraxinea*) та опенька осіннього (*Armillaria mellea*), дерева граба від некрозу, дерева дуба звичайного (ДЗ) від пошкоджень судинним мікозом дуба та поперечним раком, тощо.

4. З метою недопущення появи та розповсюдження стовбурових шкідників та збереження технічних якостей деревини рубки з поліпшення санітарного стану лісів необхідно провести в максимально стислі терміни.

5. Порубкові залишки і неліквідну деревину потрібно подрібнювати або переробляти одночасно із заготівлею, для недопущення розвитку осередків стовбурових шкідників.

Акт складений в чотирьох примірниках:

1-й - філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист";


2-й - Центрально-Західному міжрегіональному УЛМГ;

3-й - ВОКСЛП "Віноблагроліс" ";

4-й - ДП "Козятинський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс".


ПІДПИСИ:

Завідувач сектору нагляду, обліку і прогнозу філії
"Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"




Віталій СТЕГНЯК

Начальник відділу лісового господарства
ВОКСЛП «Віноблагроліс»



Богдан ВАСЮТА

Директор ДП "Козятинський райагроліс"
ВОКСЛП "Віноблагроліс"



Андрій СЕМЕНЮК