

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркового санітарного рубок
в насадженнях Сокальського ДЛГП „Галсільліс”

14 жовтня 2025 року

м. Сокаль

Нами, провідним інженером-лісопатологом ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист” Олегом МАСНИМ, провідним інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП „Львівлісозахист” Петром ДОМІНІКОМ в присутності головного лісничого Сокальського ДЛГП „Галсільліс” Андрія Микитюка, за участю лісової охорони підприємства: **13-14 жовтня 2025 року** проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркового санітарного рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарного рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог „Санітарних правил в лісах України” (далі – СПЛУ).

Лісопатологічний журнал в додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2012 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану проведено на загальній площі **90,9 га.**

Реклинецьке лісництво

Квартал 1, виділ 11.1, площа 2,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірково санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 1, виділ 11.2, площа 2,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 3, виділ 11.2, площа 2,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

При обстеженні виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, бурова мука).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 3, виділ 16.2, площа 2,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 12, виділ 7.5, площа 2,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 12, виділ 16.3, площа 2,1 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 15, виділ 28, площа 2,4 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 15, виділ 50, площа 1,5 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 16, виділ 44, площа 1,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 16, виділ 51.2, площа 3,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 28, виділ 8.2, площа 3,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На

ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 29, виділ 24.2, площа 1,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 29, виділ 24.3, площа 1,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 29, виділ 9, площа 1,7 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 30, виділ 10.5, площа 3,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 30, виділ 11.1, площа 3,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової

групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 30, виділ 25.2, площа 2,5 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 31, виділ 32.3, площа 2,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 31, виділ 44, площа 1,4 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 32, виділ 24.1, площа 2,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 32, виділ 28, площа 2,5 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а

також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 34, виділ 55.1, площа 1,5 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 35, виділ 20.1, площа 2,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 35, виділ 30.1, площа 2,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 35, виділ 36, площа 1,2 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 35, виділ 38.1, площа 2,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 35, виділ 39.1, площа 1,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 35, виділ 42.1, площа 3,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 35, виділ 34.1, площа 1,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 46, виділ 2.4, площа 1,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 46, виділ 7.1, площа 1,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Сокальське лісництво

Квартал 1, виділ 9.1, площа 4,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 1, виділ 10, площа 0,4 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 16, виділ 32, площа 0,9 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями** (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній трутовики). На ділянці є незначна кількість вітрломної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 16, виділ 34, площа 2,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями** (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній трутовики). На ділянці є незначна кількість вітрломної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 16, виділ 51, площа 0,9 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями** (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній трутовики). На ділянці є незначна кількість вітроломної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 16, виділ 54, площа 0,3 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями** (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній трутовики). На ділянці є незначна кількість вітроломної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 18, виділ 45, площа 1,7 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями** (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній трутовики). На ділянці є незначна кількість вітроломної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 18, виділ 47, площа 0,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями** (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній трутовики). На ділянці є незначна кількість вітроломної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 41, виділ 27, площа 2,1 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 41, виділ 29, площа 4,4 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 41, виділ 32.1, площа 5,7 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 4, виділ 10, площа 6,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями** (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній трутовики). На ділянці є незначна кількість вітроломної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 26, виділ 29, площа 3,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі 90,9 га, при цьому виявлено:

Стовбурові шкідники – 76,4 га (слабка ступінь пошкодження).

Стовбурові шкідники – 2,0 га (середня ступінь пошкодження).

Стовбурові, кореневі гнилі – 12,5 га (слабка ступінь пошкодження).

2. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибіркові санітарні рубки на площі **90,9 га**.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень

Провідний інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист”



Олег МАСНИЙ

Провідний інженер-лісопатолог відділу
діагностики ДСЛП „Львівлісозахист”



Петро ДОМІНІК

Головний лісничий Сокальського
ДЛГП „Галсільліс”



Андрій Микитюк

Лісопатологічний журнал

Постійний лісокористувач
Лісництво

Сокальський ЖДП, Гасінське
Сокальське

№ з/п	Квар-тал	Види	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування				Лісопатологічна характеристика	Пошкод-жена площа (га)	Необ-хідні заходи	Примітка
				Склад насаджень	Вік	Пов-нота	Запас (м³/га)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	9.1	9.5	10 С3	30	0.7	180	стоббурові шкідники	4.0	ВСР	екатіє
	1	10	0.4	10 С3	31	0.55	130	" "	0.4	ВСР	" "
	16	32	0.9	98 С3 + 10 С3 + 10 С3 + 10 С3	27	0.75	120	стоббурові та кореневишники	0.9	ВСР	" "
	16	34	2.0	98 С3 + 18 С3 + 10 С3 + 10 С3	29	0.70	115	" "	2.0	ВСР	" "
	16	51	0.9	88 С3 + 18 С3 + 10 С3 + 10 С3 + 10 С3	43	0.75	160	" "	0.9	ВСР	" "
	16	54	0.3	10 С3 + 10 С3 + 10 С3 + 10 С3	24	0.8	120	" "	0.3	ВСР	" "
	18	45	1.7	98 С3 + 18 С3 + 10 С3 + 10 С3	25	0.75	120	" "	1.7	ВСР	" "
	18	47	0.5	88 С3 + 18 С3 + 10 С3 + 10 С3	25	0.75	100	" "	0.5	ВСР	" "
	41	27	2.1	10 С3 + 10 С3 + 10 С3 + 10 С3	44	0.70	240	стоббурові шкідники	2.1	ВСР	" "
	41	29	4.4	10 С3 + 10 С3 + 10 С3 + 10 С3	43	0.70	250	" "	4.4	ВСР	" "
	41	32	15.9	10 С3 + 10 С3 + 10 С3 + 10 С3	46	0.75	250	" "	5.7	ВСР	" "
	4	10	6.2	58 С3 + 18 С3 + 10 С3 + 10 С3 + 10 С3	41	0.65	100	стоббурові та кореневишники	6.2	ВСР	" "
	26	29	3.0	88 С3 + 18 С3 + 10 С3 + 10 С3	69	0.60	270	стоббурові шкідники	3.0	ВСР	" "
								разом:	32.1		

Лісопатологічний журнал склав: пров. інж.-ліснотех. Жиро Домінік

Підпис:

Лісопатологічний журнал

Постійний лісокористувач Сокальське ДЛП, Галицьке
Лісництво Рекунецьке

№ ш/п	Квар- тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування				Лісопатологічна характеристика				Пошкод- жена площа (га)	Необ- хідні заходи	Примітка
				Склад насаджень	Вік	Пов- нота	Запас (м³/га)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	1	11.1	37.5	10Сх+ВЛх+Бп	54	0.55	220	Отворубовий шкідник	2.0	ВСР				
	1	11.2	37.5	10Сх+ВЛх+Бп	54	0.55	220		2.0					
	3	11.2	13.0	10Сх	55	0.50	220		2.0					
	3	16.2	17.5	10Сх	53	0.50	220		2.0					
	12	7.5	30.0	10Сх	49	0.60	250		2.0					
	12	16.3	12.0	10Сх	40	0.60	200		2.1					
	15	28	2.4	5Сх4ВЛх1Бп+ВЛх	55	0.55	200		2.4					
	15	50	1.5	10Сх	50	0.55	200		1.5					
	16	44	1.0	9Сх1Бп+ВЛх	44	0.65	240		1.0					
	16	51.2	16.0	8Сх2Бп+ВЛх+ВЛх	60	0.60	260		3.0					
	28	8.2	18.5	10Сх+ВЛх	65	0.65	260		3.0					
	29	24.2	16.5	10Сх	70	0.60	160		1.0					
	29	24.3	16.5	10Сх	70	0.60	160		1.0					
	29	9	1.7	10Сх	42	0.65	210		1.4					
	30	10.5	26.0	10Сх	40	0.70	230		3.0					
	30	11.1	4.8	10Сх+Бп	48	0.40	330		3.0					
	30	25.2	8.6	10Сх+Бп	54	0.65	310		2.5					
	31	32.3	19.2	10Сх+Бп+ВЛх	43	0.65	230		2.0					
	31	44	1.4	4Сх3Бп30с	40	0.40	200		1.4					
	32	24.1	3.0	10Сх+Бп	38	0.60	190		2.0					
	32	28	2.5	10Сх	43	0.65	270		2.5					
	34	55.1	3.1	9Сх16ч	65	0.55	230		1.5					

Лісопатологічний журнал склад:

Підпис:

Лісопатологічний журнал

Посліпний лісокористувач
Лісництво

№ п/п	Квар- тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика матеріалів лісовпорядкування			Лісопатологічна характеристика		Пошкод- жена площа (га)	Необ- хідні заходи	Примітка
				Склад насаджень	Вік	Пов- нота	року Запас (м³/га)	9			
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
	35	20.1	3.2	8С 2Бп	60	0.65	290	Шкідники стовбурові	2.0	—	—
✓	35	30.1	3.1	8С 2Бп	60	0.70	280	Ст. шкідники	2.0	—	—
	35	36	1.2	8С 2Бп+Вп	55	0.40	290	—	1.2	—	—
	35	38.1	3.0	10С 2Бп	40	0.70	230	—	2.0	—	—
	35	39.1	2.1	9С 1Бп	55	0.70	290	—	1.0	—	—
	35	42	5.2	10С 2Бп	55	0.65	290	—	3.0	—	—
	35	34.1	8.1	10С 2Бп+Вп	45	0.60	290	—	2.0	—	середня
	46	2	25.0	10С	48	0.55	220	—	1.0	—	середня
	46	7.1	3.9	10С	50	0.50	190	—	1.0	—	—
				Всього					58.8		

Лісопатологічний журнал склав: Др.б. Н.м. Лісопатолог

Підпис: