

А К Т

обстеження насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок в насадженнях філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Рахівського надлісництва

06. 05. 2025 року

м. Рахів

Нами, головним спеціалістом відділу лісового та мисливського господарства у Закарпатській області Юрієм ЦАЛАНОМ, заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Богданської сільської ради Миколою ГАВ'ЮКОМ, провідним інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП «Львівлісозахист» Олегом МАСНИМ, інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП «Львівлісозахист» Ярославом ОСТАШУКОМ, за участю в.о. лісничого Щаульського лісництва Василя СУХАНА проведено комісійне обстеження лісового насадження на предмет доцільності проведення в ньому суцільної санітарної рубки.

Матеріали відведення і таксації лісосік наведені згідно даних наданих працівниками філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.

Щаульське лісництво

Квартал 3, виділ 2.1, площа відведена в рубку 0,4 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 3, виділ 2, площа 1,6 га, склад 10Яле+Яв, вік 69 років, повнота 0,70, бонітет 16, середня висота 29 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 660 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 69%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 8.1, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 4, виділ 8, площа 3,6 га, склад 5Яле1Яцб1Яв3Бкл, вік 63 роки, повнота 0,85, бонітет 16, середня висота 28 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 580 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 77%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 8.1, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 5, виділ 8, площа 4,3 га, склад 8Яле2Яцб+Яз, вік 40 років, повнота 0,80, бонітет 1, середня висота 16 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 290 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 65%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 9.1, площа відведена в рубку 0,1 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 5, виділ 9, площа 1,3 га, склад 9Яле1Яцб+Яв, вік 54 роки, повнота 0,70, бонітет 1а, середня висота 22 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 430 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 87%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 31.7, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 6, виділ 31, площа 18,0 га, склад 9Яле1Яв+Яз+Бкл, вік 60 років, повнота 0,85, бонітет 1в, середня висота 30 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 670 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція

починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 69%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 12, виділ 29.9, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 12, виділ 29, площа 8,9 га, склад 10Яле+Яцб, вік 57 років, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 23 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 510 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 73%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 12, виділ 29.10, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 12, виділ 29, площа 8,9 га, склад 10Яле+Яцб, вік 57 років, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 23 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 510 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 60%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 69%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 24.12, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 14, виділ 24, площа 8,9 га, склад 9Яле1Бкл+Яв, вік 60 років, повнота 0,85, бонітет 1б, середня висота 29 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 730 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 66%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 24.13, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 14, виділ 24, площа 8,9 га, склад 9Яле1Бкл+Яв, вік 60 років, повнота 0,85, бонітет 1б, середня висота 29 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 730 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 62%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини, керуючись «СПЛУ» вважаємо за доцільне провести суцільні санітарні рубки на загальній площі 4,7 га; загальною кубомасою 3001 м³ в т. ч. ліквідної – 2527 м³, ділової – 1551 м³;

Щаульське лісництво

Кв. 3, вид. 2д1, площа 0,4 га; загальною кубомасою 229 м³, в т. ч. ліквідної – 186 м³, ділової – 119 м³;

Кв. 4, вид. 8д1, площа 0,7 га; загальною кубомасою 342 м³, в т. ч. ліквідної – 291 м³, ділової – 189 м³;

Кв. 5, вид. 8д1, площа 0,3 га; загальною кубомасою 203 м³, в т. ч. ліквідної – 165 м³, ділової – 77 м³;

Кв. 5, вид. 9д1, площа 0,1 га; загальною кубомасою 77 м³, в т. ч. ліквідної – 60 м³, ділової – 11 м³;

Кв. 6, вид. 31д7, площа 0,8 га; загальною кубомасою 480 м³, в т. ч. ліквідної – 406 м³, ділової – 232 м³;

Кв. 12, вид. 29д9, площа 0,3 га; загальною кубомасою 168 м³, в т. ч. ліквідної – 149 м³, ділової – 102 м³;

Кв. 12, вид. 29д10, площа 0,6 га; загальною кубомасою 324 м³, в т. ч. ліквідної – 282 м³, ділової – 190 м³;

Кв. 14, вид. 24д12, площа 0,9 га; загальною кубомасою 680 м³, в т. ч. ліквідної – 548 м³, ділової – 350 м³;

Кв. 14, вид. 24д13, площа 0,6 га; загальною кубомасою 498 м³, в т. ч. ліквідної – 440 м³, ділової – 281 м³;

1. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.
2. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.
3. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.
3. План відведених в рубку ділянок.

Головний спеціаліст відділу лісового
та мисливського господарства у
Закарпатській області

Юрій ЦАЛАН

Заступник сільського голови з питань
діяльності виконавчих органів
Богданської сільської ради

Микола ГАВ'ЮК

Провідний інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП «Львівлісозахист»

Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП «Львівлісозахист»

Ярослав ОСТАШУК

В.о. лісничий Щаульського лісництва

Василь СУХАН