

АКТ

лісопатологічного обстеження лісових насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів по дочірньому підприємству "Крижопільський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс"

26 червня 2025 року

с-ще Крижопіль Тульчинський р-н. Вінницької області

Нами, провідним інженером-лісопатологом сектору моніторингу стану лісових насаджень філії "Вінницялісозахист" державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Київлісозахист" (далі - філія "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист") Василем ОРЛОМ (на підставі листа ДП Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісгосподарського підприємства "Віноблагроліс" (далі ВОКСЛП "Віноблагроліс") від 9 червня 2025 року за № 222), головним лісничим дочірнього підприємства "Крижопільський райагроліс" ВОКСЛП Василем ШТАХОВСЬКИМ та майстром лісу дочірнього підприємства "Крижопільський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс" Денисом ОНУФРІЄНКОМ, в період 26.06.2025 року, проведено лісопатологічне обстеження (у відповідності п. 8, 9 Порядку організації та захисту лісів затвердженого постановою КМУ від 20 травня 2022 р. № 612) для планування та здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2025 рік, в лісових насадженнях, що знаходяться в постійному користуванні ДП "Крижопільський райагроліс" на доцільність призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів. Обстеженням встановлено наступне:

Обстеженням встановлено наступне:

Коротка таксаційна характеристика лісових насаджень відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2016 року ДП "Крижопільський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс", представленого для лісопатологічного обстеження та причини призначення заходів та їх ступеня пошкодження насаджень :

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер ділянки	Площа, що потребує проведення заходів, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування							категорія лісів	вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Ступінь пошкодження насадження
						склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, м3 на 1 га				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Крижопільська ділянка	3	25	2.1			4ЯЗД32ЛПД 2ГЗ	66	0.8	1	24	36	300	3	ВСП	халаровий некроз ясена, судинний мікоз дуба, некроз граба	середній
Крижопільська ділянка	33	32	1.2			7Д32Я31ЧШ+ КЛГ+КЛП	73	0.70	2	20	28	230	3	ВСП	судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена, стовбурова гниль черешні	середній
Крижопільська ділянка	33	33	2.6			4Д33Г33ЧШ+ ЯЗ	73	0.60	2	22	36	180	3	ВСП	судинний мікоз дуба, некроз граба, стовбурова гниль черешні	слабкий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Крижопільська дільниця	33	34	2.0			8Я32ДЗ+ЧШ+ ГЗ	66	0.70	1	24	32	280	3	ВСР	халаровий некроз ясена, судинний мікоз дуба, некроз граба	середній
Крижопільська дільниця	37	12	10.9			10ДЗ+ГЗ+ЧШ+ КЛЯ	73	0.60	2	21	28	230	3	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз граба, стовбурова гниль черешні	середній
Крижопільська дільниця	71	11	1.7			9КЛЯ1ДЗ+ ЯЗ+ЧШ	40	0.60	2	16	26	120	3	ВСР	судинний мікоз дуба, стовбурові гнилі	сильний
Крижопільська дільниця	71	20	7.0			9ДЗ1ЧШ(63)+ ГЗ+ЯЗЛ+ЧШ+ КЛЯ	83	0.60	2	23	36	235	3	ВСР	судинний мікоз дуба, стовбурові гнилі	середній
Крижопільська дільниця	76	7	2.3			10ДЗ+АКБ+ ГХЧ+КЛЯ+ КЛП	68	0.70	3	18	28	180	3	ВСР	судинний мікоз дуба, стовбурова бура ядрово-заболонна гниль акації	середній
Крижопільська дільниця	76	8	0.6			8ДЗ2АКБ+ЯЗ+ ГХЧ+КЛЯ	53	0.70	2	18	24	190	3	ВСР	судинний мікоз дуба, стовбурова бура ядрово-заболонна гниль акації	середній
Крижопільська дільниця	76	14	0.5			10ДЗ	73	0.70	2	21	28	250	3	ВСР	судинний мікоз дуба	середній
Разом ВСР по дільниці 30.9																
Піщанська дільниця	5	8	2.6			6ДЗЗЯЗ1АКБ	75	0.6	3	19	28	215	3	ВСР	судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена, бура ядрово- заболонна гниль акації	середній
Піщанська дільниця	15	7	5.4			6ГЗ(56)2ГЗ(81) 2КЛП	56	0.70	2	17	18	180	3	ВСР	некроз граба	середній
Піщанська дільниця	15	8	5.9			6ГЗ2ДЗ2ЯЗ	61	0.70	2	18	24	195	3	ВСР	некроз граба, судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена	середній
Піщанська дільниця	16	16	2.9			4ЯЗ2КЛГ2ДЗ 2АКБ	56	0.70	1	20	28	110	3	ВСР	халаровий некроз ясена, судинний мікоз дуба, бура ядрово- заболонна гниль акації	сильний
Піщанська дільниця	29	1	1.0			10ДЗ	75	0.60	3	19	24	210	3	ВСР	судинний мікоз дуба	середній

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Піпанська дільниця	29	17	2.1			5АКБ2Г31ЯЗ 2ДЗ	76	0.60	1	26	32	240	3	ВСП	судинний мікоз дуба, бура ядрово-заболонна гниль акації, халаровий некроз ясена	середній
Піпанська дільниця	31	12	1.3			8АКБ1ЯЗ1ДЗ	71	0.60	1	25	28	210	3	ВСП	бура ядрово-заболонна гниль акації, халаровий некроз ясена, судинний мікоз дуба	середній
Піпанська дільниця	32	12	1.9			8ДЗ1ЧШ1ЯЗ	56	0.70	2	17	26	180	3	ВСП	судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена	середній
Разом ВСП по дільниці					23.1											
Всього ВСП по ДП "Крижопільський райагроліс"					54.0											

Загальна обстежена площа по ДП "Крижопільський райагроліс" складає 54.0 га.

По причинах розладнання в загальному по підприємству:

Вид шкідників, хвороб та інших патологій	Ступінь пошкодження				Примітки
	слабкий	середній	сильний	Всього	
судинний мікоз дуба	2,6	30,1	1,7	34,4	
халаровий некроз ясена		7,1	2,9	10,0	
бактеріальна водянка берези		1,3		1,3	
некроз граба		11,3		11,3	
Разом	2,6	54,0	4,6	54,0	

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень:

Дерева листяних порід характеризуються змішаним характером всихання – переважно поодинокі та групові (групи невеликі – до 3,4 дерев). Основними патологіями, що призводять до всихання листяних порід є кореневі та стовбурові гнилі, які викликаються комплексом різних причин: дерева ДЗ від пошкоджень опеньком осіннім, що викликає білу заболонну гниль коренів а також стовбуровими шкідниками, судинним мікозом ДЗ (офіостомозом), поперечним раком та дубовим трутовиком, що викликають стовбурові гнилі; дерева ясена в результаті діяльності опенька осіннього, що викликає заболонну гниль коренів та халарового некрозу; дерева береста від голландської хвороби; дерева берези від бактеріальної водянки та заболонника березового, дерева вільхи від трутовика променевого, граба від некрозу. Ураження і руйнування коренів дуже сильно впливає на стан дерев, так як порушується надходження в його надземні частини води та поживних речовин. Тому кореневі гнилі призводять до швидкого ослаблення і всихання дерев, вітровалів та заселення дерев стовбуровими шкідниками. В цілому всихання крон окремих лісоутворюючих порід дерев коливається в межах від 1/2 до 2/3 крони. Поодинокі в насадженнях наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів – трутовиків, серед яких найчастіше зустрічаються - трутовик дубовий несправжній та трутовик дубовий та інші їх види, що теж призводять до появи та розповсюдженню у внутрішніх тканинах деревини стовбурових гнилів.

Основними патологіями, що призводять до всихання листяних порід є кореневі та стовбурові. Обстежені насадження акації білої (АКБ) всихають в наслідок ураження дерев бурюю ядрово-заболонною гниллю, що спричиняє суховершинність, сухобочини, а на кінцевому етапі - всихання всього дерева. Ступінь пошкодження - середній. Розподіл сухостійних та всихаючих дерев груповий (в групі від 3 до 5 дерев, зустрічаються поодинокі групи до 10 дерев).

Також причинами погіршення санітарного стану обстежених насаджень є ослаблення і всихання дерев внаслідок їх природного старіння, внутрішньовидової та міжвидової конкуренції, несприятливих чинників середовища, що супроводжується заселенням та пошкодженням деревини стовбуровими шкідниками, які є переносниками інших патогенних мікроорганізмів. Разом з тим поодинокі спостерігаються вітровальні та буреломні дерева, а також дерева з ухилом більше 30 градусів.

Для поліпшення санітарного стану лісів та відповідно до «Санітарних правил в лісах України» рекомендовано провести вибіркові санітарні рубки (ВСР) на загальній площі 54.0 га у 2025 році.

Під час проведення даного обстеження лісовій охороні ДП "Крижопільський райагроліс" надавалась методична допомога з питань лісозахисту.

Примітка: відбір дерев до рубки, геодезична зйомка частин таксаційних виділів, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проводитимуться силами лісової охорони ДП "Крижопільський райагроліс".

ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Відповідно п. 5 Санітарних правил в лісах України скласти перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів (додаток 1) та погодити з філією "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" і Центрально-Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства.
2. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України.
3. Порубкові залишки і неліквідну деревину потрібно подрібнювати та розкидати рівномірно по ділянці, для недопущення розвитку осередків стовбурних шкідників.
4. Осередки шкідників та хвороб лісу виявлені даним лісопатологічним обстеженням поставити на облік.

Акт складений в чотирьох примірниках:


- 1-й - філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист";
- 2-й - Центрально-Західному міжрегіональному УЛМГ;
- 3-й - ВОКСЛП "ВІНОБЛАГРОЛІС";
- 4-й - ДП "Крижопільський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс"

ПІДПИСИ :

Провідний інженер-лісопатолог сектору моніторингу стану лісових насаджень філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

Головний лісничий ДП "Крижопільський райагроліс"

Майстер лісу ДП "Крижопільський райагроліс"



Василь ОРЕЛ

Василь
ШТАХОВСЬКИЙ

Денис
ОНУФРІЄНКО