

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

16.05.2024 року

м. Ніжин

Нами, головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., провідним інженером лісового господарства філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Примаком Я. О., лісничим Батуринського лісництва Прощенком О. А., лісничим Бахмацького лісництва Олефіренко В. А., лісничим Берестовецького лісництва Постернаком М. Я., лісничим Борзнянського лісництва Перепечаєм Ю. В., лісничим Варвинського лісництва Пшеничним Р. А., лісничим Вертіївського лісництва Івановим І. С., лісничим Жадківського лісництва Содель І. Б., лісничим Іржавського лісництва Воблим О. М., лісничим Ічнянського лісництва Сурай В. А., лісничим Кам'янського лісництва Філіповим М. С., лісничим Коляжинського лісництва Максютією В. М., лісничим Мринського лісництва Примаком Ю. О., лісничим Прилуцького лісництва Червонякою О. Ф. разом з лісовою охороною було проведено обстеження насаджень Ніжинського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Чернігівської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **552,0 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Батуринське лісництво (26,5 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
19	24	-	4,2	10СЗ	73	0,70	1	23	32	340
26	7	-	3,4	10СЗ	75	0,70	1	25	32	380
41	24	-	3,1	10СЗ	75	0,65	1	25	32	380
25	4	3	1,6	10СЗ	75	0,70	1	24	30	360
22	5	2	1,5	10СЗ	75	0,70	1	26	32	400
34	5	-	1,1	10СЗ	75	0,55	1	26	32	300
38	3	2	3,5	10СЗ	60	0,70	1	22	24	350
40	12	-	3,9	10СЗ	105	0,65	1А	32	58	450
40	7	-	4,2	10СЗ+БП	65	0,80	1	23	32	370

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступень ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою та раком сірянкою. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Бахмацьке лісництво (24,4 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
3	10	2,3	10ДЗ+ЛПД	80	0,60	1	26	32	280
4	15	1,9	4Д32ЛПД2КЛГ2БП	120	0,60	2	26	40	240
5	8	5,8	7Д32ЛПД1КЛГ	95	0,60	2	25	36	250
36	14	5,1	4Д35ЛПД1КЛГ+БП	70	0,70	1	24	26	290
55	13	9,3	3Д33ДЧР2ЯЗЛ2КЛЯ+БП+ОС	45	0,75	1А	20	20	210

В ході проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження комплексом інфекційних хвороб та розповсюдження стовбурових шкідників, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, бактеріальний рак ясеня, бактеріальний рак водянка, березовий трутовик, печіночниця звичайна, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодове тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Берестовецьке лісництво (25,4 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
99	6	-	0,6	10СЗ	75	0,60	1	24	32	310
110	13	-	0,3	6С34БП	55	0,70	1	21	26	280
115	2	-	0,7	8С32БП	70	0,70	1	24	30	320
100	6	-	2,0	9С31БП+ДЗ	65	0,70	1	24	28	350
115	8	2	1,2	10СЗ+ДЗ	70	0,65	1	23	30	320
100	8	-	0,5	9С31БП+ДЗ	65	0,65	1	23	28	300
61	3	2	4,1	10СЗ+БП	85	0,65	1	26	32	400
79	5	-	5,1	10СЗ+БП+АКБ	85	0,65	1	28	36	400
79	3	-	4,3	10СЗ+ДЗ	75	0,70	1А	27	36	420

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорій стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя у міжсередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, соснової губки, несправжнього дубового трутовика, березової губки та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними

та дугоподібно зігнутими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
19	6	3	5,7	5ДЗЗЯЗІКЛГІЛПД	120	0,60	2	26	44	270

При проведенні лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження комплексом інфекційних хвороб та розповсюдження стовбурових шкідників, ступінь ураження та пошкодження – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, бактеріальний рак ясеня, халаровий некроз, печіночниця звичайна, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
79	4	0,9	8АКБ2СЗ	60	0,65	3	18	26	150

Фактично на ділянці насадження складом 8С32АКБ. В результаті проведення лісопатологічного обстеження даного насадження виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний. Стоячі та повалені дерева V – VI категорій стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, соснової губки, трутовика звичайного та ознаками ураження раком сірянкою. В насадженні присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Борзнянське лісництво (38,2 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
22	27	1,2	5ВЛЧ4ОС1ЯЗ	40	0,80	1А	19	24	220

При обстеженні даного насадження виявлено, що дерева пошкоджені дикими тваринами, а саме бобром європейським. Частина дерев звалена, або має пошкодження стовбура 50 і більше відсотків. Крона таких дерев починає всихати.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
23	8	2,7	8ДЗ(95)ІЯЗІБП+КЛГ+ДЗ	95	0,50	2	25	44	200

В ході проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, шетиноволосий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, халаровий некроз, трутовик звичайний та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухоостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
52	13	-	10,0	7СЗЗБП	65	0,70	1	24	28	305
61	2	-	6,1	9СЗІБП+ДЗ+ОС	66	0,65	1А	25	28	350
61	5	4	1,2	10СЗ+БП+ОС	80	0,55	1	26	30	300
63	1	-	9,2	10СЗ	75	0,65	1	25	28	340
87	10	1	3,3	9СЗІДЗ+БП+ОС	85	0,60	1А	29	30	340
88	13	-	1,7	8СЗ2ДЗ	75	0,65	1	26	28	370
88	14	-	1,3	10СЗ+БП	80	0,65	1	26	32	360
88	16	-	1,5	10СЗ+ЯЛЕ	90	0,65	2	25	32	350

Лісопатологічним обстеженням даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, соснової губки, несправжнього осикового трутовика, несправжнього дубового трутовика, березового трутовика, березової губки та ознаками ураження раком сірянкою та бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Варвинське лісництво (20,7 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
84	18	6,3	7ДЗЗЛПД+БП	75	0,70	1	23	28	290
84	21	2,6	5ДЗЗЛПД2КЛГ	70	0,70	1	23	28	265
98	3	11,8	7ДЗ2ЛПД1КЛГ	80	0,70	1	24	32	320

При проведенні лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами, ступінь ураження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, щетиноволосий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Вертіївське лісництво (46,7 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
389	8	-	2,9	10СЗ	73	0,70	1	26	32	380
389	11	-	2,2	10СЗ	75	0,60	1	26	32	340
389	18	4	3,4	10СЗ	78	0,70	1	26	32	380

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжсередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика та ознаками ураження раком сірянкою. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
2	3	10,4	5ДЗЗЯЗ1КЛГ1ЛПД+ОС	85	0,70	1	25	32	290
4	11	3,9	4ДЗ4ЯЗ1КЛГ1ЛПД	85	0,70	2	24	32	280

29	3	4,7	ЗДЗЗЯЗ2ЛПД1КЛГ1ВЛЧ+ОС	75	0,70	1	24	32	280
29	14	1,2	ЗЯЗ2ВЛЧ2ОС2ДЗ1ЛПД	55	0,70	2	20	26	240
316	9	18,0	5ДЗЗЯЗ1КЛГ1ЛПД	90	0,60	1	26	36	240

Під час лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, халаровий некроз, опеньок осінній, печіночниця звичайна, щетиноволосий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, несправжній осиковий трутовик, трутовик звичайний та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Жадківське лісництво (109,0 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
1	19	3,2	5ДЗ2БП2ЛПД1СЗ	85	0,65	2	23	28	250
1	27	0,6	8ДЗ2ДЧР+БП+ЛПД	55	0,70	1	21	24	240
1	28	3,1	7ДЗ1ОС1БП1ЛПД	75	0,70	2	22	26	255
1	36	2,7	5ДЗ2ЛПД2БП1СЗ	85	0,65	2	23	32	255
1	37	1,1	6ДЗ3ЛПД1БП+ОС	75	0,70	2	25	30	250
2	2	3,5	9ДЧР1БП+СЗ+ДЗ	49	0,85	1А	21	22	250
2	7	2,2	6ДЗ4БП	83	0,65	2	22	28	220
2	8	3,3	7ДЗ2ЛПД1ОС+БП	80	0,70	2	22	30	250
2	33	1,7	4ДЗ4ЯЛЕ1ЛПД1БП+ОС	38	0,75	2	13	12	150
2	34	0,3	8ДЧР1ДЗ1ЛПД	38	0,80	1Б	19	20	200
3	4	2,9	8ДЗ2ЛПД+КЛГ+БП	58	0,70	2	19	24	200
4	2	2,3	6ДЧР4БП	47	0,80	1Б	23	28	250
4	3	17,0	1ЯР.6ДЗ3ДЧР1БП 2ЯР.10ЯЛЕ	60/40	0,60/0,25	1	22/16	26/16	220/80
4	4	1,4	7ДЧР1БП1ЯЛЕ1ДЗ	47	0,80	1А	22	26	250
4	22	1,1	8ДЧР2БП	34	0,80	1	15	16	150
5	7	1,2	9ДЧР1ЛПД+БП	40	0,85	1Б	20	22	230
5	27	4,9	10ДЗ+БРС+БП+ОС+СЗ	80	0,65	2	22	26	250
6	4	5,0	4ДЗ3СЗ3ЛПД+ОС+БП	80	0,70	2	22	28	300
8	14	2,6	5ДЧР5БП	36	0,80	1	15	14	140
8	16	5,3	10ДЗ+ОС+БП	60	0,65	1	21	20	220
95	23	9,5	ЗДЗ3ДЧР2ЛПД1ОС1КЛГ	55	0,60	1А	22	26	230
97	3	8,8	7ДЗ2ЛПД1КЛГ	105	0,60	3	23	30	250
97	14	9,8	9ДЗ1СЗ+ЯЛЕ+ДЧР+БП+КЛГ+ЯЗЛ	64	0,60	1	21	28	220
98	19	8,6	10ДЗ+ЛПД+АКБ	75	0,60	2	21	26	220

В результаті лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, сірчано – жовтий трутовик, соснова губка, трутовик звичайний, несправжній осиковий трутовик, березовий трутовик, березова губка та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі

водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
8	3	2,5	9БП1СЗ+ДЗ	33	0,85	1	14	16	140
8	4	1,1	10БП+ДЧР+СЗ+ЯЛЕ	34	0,85	2	13	12	120
8	20	0,7	6БП2ДЧР1ДЗ1ГЗ	37	0,80	1А	18	18	140
9	8	0,4	10БП+ДЗ	50	0,75	1Б	24	28	250
9	9	2,2	8БП2ЯЛЕ	43	0,80	1Б	22	24	230

В ході лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: березовий трутовик, березова губка, бактеріальний рак водянка, несправжній дубовий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, соснова губка, трутовик звичайний та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Іржавське лісництво (45,9 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
90	8	5,2	9ДЗ1БП+СЗ	85	0,60	2	24	28	250
183	22	1,8	7ДЗ3СЗ+БП	70	0,70	2	20	24	250
213	9	2,0	10ДЗ+БП	75	0,80	1	26	32	390
149	6	0,7	5ДЗ(60)ЗБП2ДЗ(60)	60	0,70	1А	23	28	235
149	9	1,1	4ДЗ3ОС2БП1ЛПД	65	0,60	2	22	28	205
114	7	4,2	5ДЗ (100)ЗС32ДЗ(60)	100/60	0,70	2	24	36	300
154	9	1,5	9ДЗ1СЗ+ОС+БП	71	0,70	1А	26	32	355
34	7	2,5	8ДЗ2БП+ОС	90	0,60	1	27	44	260
18	9	6,0	7ДЗ1ДЧР1ОС1ЛПД+СЗ	60	0,70	1	22	24	250
54	11	1,6	8ДЗ2БП+СЗ	65	0,70	1А	26	32	300

Під час лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний, несправжній осиковий трутовик, березова губка, бактеріальний рак водянка, соснова губка та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
193	9	19,3	10СЗ+АКБ+ДЗ	62	0,70	1Б	27	32	420

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даного насадження виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний. Стоячі та повалені дерева V – VI категорій стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, соснової губки, трутовика звичайного та ознаками ураження раком сірянкою. В насадженні присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Ічнянське лісництво (81,9 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
10	19	-	2,3	10СЗ+ДЧР	65	0,70	1	24	28	350
21	5	2	0,9	10СЗ	54	0,85	1А	23	28	430
21	7	-	2,8	8СЗ2ДЧР+БП+ЛПД	75	0,70	1	25	34	360
23	9	2	12,0	10СЗ+БП	75	0,60	1	26	28	340
62	41	-	0,5	10СЗ	58	0,80	1А	24	28	430
72	1	3	10,0	10СЗ+ДЗ	80	0,60	1	26	30	350
72	3	-	12,0	10СЗ+ДЗ	80	0,65	1А	28	30	400
72	8	2	3,3	10СЗ	80	0,60	1	25	30	350
81	1	-	7,1	10СЗ+ВЛЧ+БП+ОС+ДЗ	90	0,60	2	24	28	310
84	20	2	1,5	10СЗ+ДЗ+ЛПД+ОС+БП	85	0,60	1	26	36	340
92	17	2	2,0	10СЗ+ДЗ+БП	75	0,70	1	25	28	380

Лісопатологічним обстеженням вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, соснової губки, та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою і вертицильозним в'яненням. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі

зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
10	17	4,5	10ДЗ	75	0,70	1	25	26	350
47	4	0,9	5ДЗ3С32ВЛЧ+БП+ОС	80	0,65	1	27	28	350
55	12	1,9	6Д32ВЛЧ2ЯЗ+БП+ОС	95	0,65	2	26	30	300
57	33	5,3	9ДЧР1ДЗ	57	0,75	1А	24	26	290
62	23	6,4	10ДЗ+ВЛЧ+СЗ+ЛПД	80	0,70	1	24	28	320
90	10	5,0	9ДЗ1СЗ+БП+ОС	90	0,70	2	24	30	290
92	11	3,5	10ДЗ+ОС+ЛПД+СЗ+БП	90	0,60	1	27	34	320

В результаті лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний, несправжній осиковий трутовик, соснова губка та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Кам'янське лісництво (10,9 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
115	15	3	2,6	10СЗ	86	0,70	1	26	30	420
91	6	-	2,3	8С32ДЗ	82	0,70	1А	29	40	390
115	3	-	5,1	9С31ДЗ	66	0,70	1А	25	30	370
72	8	-	0,9	10СЗ	85	0,60	1	28	32	367

В ході проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжсередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямowanego трутовика, соснової губки, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева,

дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Коляжинське лісництво (36,9 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
8	21	1	2,1	10СЗ+БП+ДЗ	76	0,70	1	25	28	390
229	1	-	9,2	8СЗ2ДЗ+АЛЧ+БП+АКБ	80	0,70	1	27	30	400

Під час проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний, груповий. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжсередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
57	8	5,3	7ДЗ2БПІОС+СЗ	80	0,70	1	26	36	300
71	6	17,4	9ДЗ1ЛП+БП+БРС	95	0,70	2	26	36	300
105	1	2,9	10ДЗ+БП	75	0,70	1	23	32	280

Лісопатологічним обстеженням даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження та пошкодження – слабкий, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, березова губка, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний, несправжній осиковий трутовик. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Мринське лісництво (32,9 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
49	20	-	1,0	4ЯЗ2ЛПД2ОС1ДЗ1БП	50	0,70	1	21	26	250

49	24	-	0,4	4Я34ЛПД2ОС+ДЗ	50	0,70	1	22	26	260
49	25	-	2,3	5Д32ЛПД2Я31ОС	60	0,70	1	22	24	250
235	7	-	1,4	5Д33Я31ОС1БП	75	0,50	1А	27	32	230
236	1	-	2,3	4ЛПД3Я31ОС1Д31КЛГ+БП	50	0,80	1	22	24	290
236	26	-	3,7	4ОС2Д32Я31ЛПД1БП	70	0,70	1	26	36	300
277	4	-	2,2	7Я32ЛПД1КЛГ+ДЗ+ВЛЧ	60	0,70	1	24	28	250
277	9	-	5,7	5Я34ОС1ЛПД+КЛГ	45	0,70	1А	23	24	260
280	11	-	4,4	5Я34ОС1КЛГ+ДЗ	50	0,90	1А	27	32	410
399	1	1	9,5	5Д33ОС1ЛПД1БП+КЛГ	90	0,60	1	26	32	270

Під час лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: халаровий некроз, бактеріальний рак ясена, несправжній дубовий трутовик, несправжній осиковий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, щетиноволосий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Прилучське лісництво (52,6 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
143	2	-	5,8	7Д32ЛПД1КЛГ+ГЗ	80	0,70	2	23	32	300
23	7	-	1,8	8Д32ЛПД+ГЗ	75	0,75	1	23	30	280
23	8	-	2,8	7Д32Г31ЛПД	85	0,70	2	24	32	250
94	8	1	1,7	7Д31АКБ1ЛПД1ОС+ГЗ	85	0,65	2	23	32	250
47	5	-	17,5	6Д33Г31ЛПД+КЛГ	90	0,80	2	23	32	260
165	33	-	10,5	4Д33ЛПД3ОС	81	0,60	3	20	26	230
24	6	-	9,5	8Д32ЛПД+ГЗ	120	0,60	2	28	44	305
185	18	1	3,0	10АКБ+ДЗ	56	0,60	1	20	30	160

В результаті лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний, несправжній осиковий трутовик та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хворобами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та

ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуватись п. 12 – 26 «Санітарними правилами в лісах України» провести у 2025 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів. Враховуючи ступінь ураження інфекційними хворобами, розповсюдження стовбурових шкідників, пошкодження пожежею - вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **552,0 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних хвороб. Адже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.






Акт складено в 3 – х примірниках:

1 – ДСЛП «Харківлісозахист».

2 – Філія «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України».

3 – Північне міжрегіональне управління
лісового та мисливського господарства

Підписи:

	А. Д. Воробей
	Я. О. Примаєк
	О. А. Прошенко
	В. А. Олефіренко
	М. Я. Постернак
	Ю. В. Перечай
	Р. А. Пшеничний
	І. С. Іванов
	І. Б. Содель
	О. М. Воблий
	В. А. Сурай
	М. С. Філіпов
	В. М. Максютя
	Ю. О. Примаєк
	О. Ф. Червоняк