

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркового санітарного рубок
в насадженнях Брустурянського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

04 квітня 2025 р.

Брустурянське надлісництво

Нами, начальником Закарпатського ОЛПП ДСЛП «Львівлісозахист» Олександром ГАЙЧЕНЯ, начальником відділу діагностики ДСЛП «Львівлісозахист» Юрієм КРАМАРЦЕМ, начальником відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Зоряною КРІЛИШИН, інженером-лісопатологом відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Миколою ВИСОЧАНСЬКИМ, інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП «Львівлісозахист» Іваном ЧИЧЕРСЬКИМ, в присутності помічника Брустурянського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Юрія КОСТЯКА, інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії сектору охорони і захисту лісів в Закарпатській області відділу охорони і захисту лісів філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Миколи СОЙМИ з 01.04. по 04.04.2025 року проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок.

Лісопатологічне обстеження проведено рекогносцирувальним методом з веденням лісопатологічного журналу, уточненням границь ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарного рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковій вирубці згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок проведено на загальній площі **113,4 га.**

Кедринське лісництво

Квартал 10, виділ 56, площа 10,0 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дереву руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 54, площа 0,4 га

На даній ділянці дерева поодинокі уражені кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість пошкодженої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 53, площа 0,8 га

На даній ділянці дерева поодинокі уражені кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість пошкодженої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 55, площа 0,9 га

На даній ділянці дерева поодинокі уражені кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість пошкодженої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 76, площа 0,3 га

На даній ділянці дерева поодинокі уражені кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість пошкодженої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 66, площа 1,3 га

На даній ділянці дерева поодинокі уражені кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На

хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поламаной деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 70, площа 5,3 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поламаной деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 5, площа 3,4 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поламаной деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 26, виділ 28, площа 2,6 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). Окремі дерева з механічними пошкодженнями. На ділянці є незначна кількість поламаной деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 26, виділ 40, площа 0,4 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). Окремі дерева з механічними пошкодженнями. На ділянці є незначна кількість поламаной деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 27, виділ 12, площа 0,7 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). Окремі дерева з механічними пошкодженнями. На ділянці є незначна кількість поламаной деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 27, виділ 14, площа 1,2 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). Окремі дерева з механічними пошкодженнями. На ділянці є незначна кількість поламаной деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 37, площа 2,5 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 36, площа 4,0 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поламаной деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 7, площа 4,4 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих

деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 26, площа 1,7 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (опеньком осіннім). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 28, виділ 26, площа 5,9 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (опеньком осіннім). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 28, виділ 30, площа 4,0 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (опеньком осіннім). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 24, виділ 13, площа 6,7 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (опеньком осіннім). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 24, виділ 22, площа 0,6 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Деревя руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поламаной деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркoву санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 66, площа 0,6 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Деревя руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поламаной деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркoву санітарну рубку.

Усть-Чорнянське лісництво

Квартал 9, виділ 1, площа 2,1 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Наявні дерева з кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають та втрачається технічна якість деревини. На ділянці є незначна кількість поламаной деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркoву санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 2, площа 0,5 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Наявні дерева з кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають та втрачається технічна якість деревини. На ділянці є незначна кількість поламаной деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркoву санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 19, площа 6,9 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Наявні дерева з кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають та втрачається технічна якість деревини. На ділянці є незначна кількість поламаной деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркoву санітарну рубку.

Квартал 35, виділ 12, площа 2,6 га

Насадження пошкоджене вітром (**вітровал, вітролом**) та уражене опеньком осіннім. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою. На уражених деревах крона ажурна, хвоя

дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками. Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають та втрачається технічна якість деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 24, виділ 1, площа 13,0 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 1, площа 1,1 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Тиховецьке лісництво

Квартал 14, виділ 11, площа 3,6 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 12, площа 2,6 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Плайське лісництво

Квартал 30, виділ 19, площа 17,5 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження

технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поламаной деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірккову санітарну рубку.

Русько-Мокрянське лісництво

Квартал 22, виділ 11, площа 2,2 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (опеньком осіннім). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поламаной деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Вважаємо за доцільне провести вибірккову санітарну рубку.

Турбатське лісництво

Квартал 27, виділ 11, площа 3,6 га

Насадження пошкоджене вітром (вітровал, вітролом) та уражене стовбуровими та кореневими гнилями (опеньком осіннім). Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження насадження середня. Вважаємо за доцільне провести вибірккову санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі 113,4 га при цьому виявлено:

Пошкодження вітром – 6,2 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 2,6 га;
- середня ступінь пошкодження – 3,6 га

Стовбурові та кореневі гнилі (опеньок осінній) – 97,7 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 95,5 га;
- середня ступінь пошкодження – 2,2 га.

Стовбурові шкідники – 9,5 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 9,5 га

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості

деревини та згідно вимог СПЛУ провести вибіркові санітарні рубки на площі 113,4 га.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.


4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

Начальник Закарпатського ОЛПП
ДСЛП «Львівлісозахист»



Олександр ГАЙЧЕНЯ

Начальник відділу діагностики
ДСЛП «Львівлісозахист»



Юрій КРАМАРЕЦЬ

Начальник відділу нагляду
та прогнозу
ДСЛП «Львівлісозахист»



Зоряна КРІЛИШИН

Інженер-лісопатолог відділу
нагляду та прогнозу
ДСЛП "Львівлісозахист"



Микола ВИСОЧАНСЬКИЙ

Інженер-лісопатолог
відділу діагностики
ДСЛП „Львівлісозахист”



Іван ЧИЧЕРСЬКИЙ

Помічник Брустурянського надлісництва
філії «Карпатський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Юрій КОСТЯК

Інженер з охорони та захисту лісу
1 категорії сектору охорони і захисту лісів
в Закарпатській області
відділу охорони і захисту лісів
філії «Карпатський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Микола СОЙМА