

Акт

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок, в насадженнях ДП "Ліси України", філії "Карпатський лісовий офіс", Брустурянського надлісництва, за період з 18 серпня по 22 серпня та 25 серпня по 29 серпня 2025 року.

29 серпня 2025 р.

Брустурянське надлісництво

Нами, начальником Закарпатського ОЛПП ДСЛП "Львівлісозахист" Олександром ГАЙЧЕНЯ, інженером-лісопатологом Закарпатського ОЛПП ДСЛП "Львівлісозахист" Олегом СТЕБЕЛЕЦЬКИМ, інженером-лісопатологом відділу нагляду та прогнозу ДСЛП "Львівлісозахист" Миколою ВИСОЧАНСЬКИМ, в присутності інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії сектору охорони і захисту лісів в Закарпатській області відділу охорони і захисту лісів філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Миколи СОЙМИ, за участю лісничого Кедринського лісництва Василя ЗОЛОТАРЯ, лісничого Плайського лісництва Вадима МЕКЛЕША, лісничого Усть-Чорнянського лісництва Юрія СОЙМИ, лісничого Нересницького лісництва Петра ФЕРЕНЧУКА, лісничого Тиховецького лісництва Петра НОСИ, лісничого Тарасівського №2 лісництва Андрія КАЛИНИЧА, лісничого Тернівського лісництва Василя ЗОЛОТАРЯ, лісничого Тереблянського лісництва Юрія БУЛИКА, лісничого Турбатського лісництва Дмитра ЧУСИ, лісничого Лопухівського лісництва Володимира БАНГИ, лісничого Брадульського лісництва Федіра ДЕКЕТА, лісничого Тарасівського лісництва Івана ДЕКЕТА, лісничого Краснянського лісництва Михайла ФЕРИМИ, лісничого Комсомольського лісництва Валерія САСИНА, проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проведено рекогносцирувальним методом з веденням лісопатологічного журналу, уточненням границь ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковій вирубці згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 та 01.01.2017 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок проведено на загальній площі **355,3 га**.

Квартал 7 , виділ 18 , площа 0,4 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 7 , виділ 3 , площа 1,8 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 29 , виділ 19 , площа 0,3 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично

відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 29 , виділ 34 , площа 3,3 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 29 , виділ 28 , площа 1,8 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 29 , виділ 31 , площа 2,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними

пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 2 , виділ 10 , площа 1,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 14 , виділ 4 , площа 1,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), поодинокі наявні трутовики, що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене стовбуровими шкідниками. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 26 , виділ 36 , площа 0,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами

всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 26 , виділ 40.1 , площа 0,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 24 , виділ 24 , площа 1,7 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 24 , виділ 25 , площа 0,4 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 1 , виділ 13 , площа 1,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 1 , виділ 14 , площа 0,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На

пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 12 , виділ 40 , площа 2,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 28 , виділ 43 , площа 6,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), поодинокі наявні трутовики, що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 28 , виділ 49 , площа 1,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене стовбуровими

шкідниками. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 18 , виділ 2 , площа 4,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 12 , виділ 53 , площа 2,4 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 12 , виділ 34 , площа 1,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що

призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене стовбуровими шкідниками. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 15 , виділ 12 , площа 10,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 15 , виділ 12.1 , площа 9,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 20 , виділ 36 , площа 1,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами

всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 20 , виділ 38 , площа 4,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 24 , виділ 17 , площа 1,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато

дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 15 , виділ 18 , площа 8,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Тарасівське лісництво

Квартал 26 , виділ 17 , площа 3,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 31 , виділ 5 , площа 4,4 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене стовбуровими шкідниками. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 27 , виділ 3 , площа 2,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Тарасівське №2 лісництво

Квартал 39 , виділ 11 , площа 7,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, трутовиками, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене поперечним раком дуба (пошкодження охоплює більше 100 відсотків периметра стовбура). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Тиховецьке лісництво

Квартал 11 , виділ 4 , площа 20,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене стовбуровими шкідниками. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Турбатське лісництво

Квартал 1 , виділ 30 , площа 5,8 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою,

стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 19 , виділ 13 , площа 6,0 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 22 , виділ 40 , площа 4,6 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 22 , виділ 41 , площа 3,2 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 33 , виділ 12 , площа 5,5 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38 , виділ 16 , площа 8,0 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 40 , виділ 12 , площа 6,7 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38 , виділ 8 , площа 2,1 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 33 , виділ 27 , площа 3,1 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними

стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 32 , виділ 50 , площа 2,6 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Комсомольське лісництво

Квартал 16 , виділ 80 , площа 6,9 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене стовбуровими шкідниками. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Краснянське лісництво

Квартал 20 , виділ 2 , площа 7,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура

понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 24 , виділ 6 , площа 9,4 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Тереблянське лісництво

Квартал 2 , виділ 4 , площа 4,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене поперечним раком дуба (пошкодження охоплює більше 100 відсотків периметра стовбура), морозобоєм. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 3 , виділ 3 , площа 5,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене поперечним раком дуба (пошкодження охоплює більше 100 відсотків периметра стовбура), морозобоєм. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Нересницьке лісництво

Квартал 27 , виділ 29 , площа 9,3 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що

призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 36 , виділ 17 , площа 7,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, механічними пошкодженнями стовбура та кореневих лап (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Усть-Чорнянське лісництво

Квартал 25 , виділ 8 , площа 3,4 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38 , виділ 37 , площа 12,8 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 10 , виділ 2 , площа 9,8 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 14 , виділ 10 , площа 7,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра

стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17 , виділ 2 , площа 4,6 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 31 , виділ 4 , площа 5,9 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 33 , виділ 8 , площа 8,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 16 , виділ 22 , площа 7,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 26 , виділ 19 , площа 12,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Лопухівське лісництво

Квартал 20 , виділ 24 , площа 4,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 5 , виділ 36 , площа 7,9 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 32 , виділ 15 , площа 4,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Насадження пошкоджене опеньком осіннім. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Брадульське лісництво

Квартал 12 , виділ 44 , площа 2,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 8 , виділ 63 , площа 2,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра

стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, та підірваною кореневою системою. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8 , виділ 64 , площа 2,8 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 21 , виділ 39 , площа 0,8 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 21 , виділ 13 , площа 5,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, та підірваною кореневою системою. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 12 , виділ 29 , площа 2,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, та підірваною кореневою системою. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8 , виділ 46 , площа 1,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Насадження пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Плайське лісництво

Квартал 22 , виділ 8 , площа 12,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Насадження пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 10 , виділ 16 , площа 12,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), кореневою губкою, що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 21 , виділ 32 , площа 15,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Насадження пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у

яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 47, виділ 20, площа 9,8 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Насадження пошкоджене опеньком осіннім. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі **355,3 га** при цьому виявлено:

Стовбурові гнилі – 242,1 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 158,0 га;
- середня ступінь пошкодження – 84,1 га;

Опеньок осінній – 47,6 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 8,0 га;
- середня ступінь пошкодження – 39,6 га;

Стовбурові шкідники – 65,6 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 65,6 га;

2. Відведення дерев у вибіркову санітарну рубку провести за рахунок пошкоджених стовбуровим шкідниками, стовбуровими гнилями, кореневою губкою, опеньком осіннім, трутовиками, поперечним раком дуба, повалених, зламаних та сухостійних дерев.

3. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження

стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибіркову санітарну рубку на площі **355,3 га**.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

Начальник Закарпатського ОЛП
ДСЛП "Львівлісозахист"

Олександр ГАЙЧЕНЯ

Інженер-лісопатолог Закарпатського ОЛП
ДСЛП "Львівлісозахист"

Олег СТЕБЕЛЕЦЬКИЙ

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу
ДСЛП "Львівлісозахист"

Микола ВИСОЧАНСЬКИЙ

Інженер з охорони та захисту лісу
1 категорії сектору охорони і захисту лісів
в Закарпатській області
відділу охорони і захисту лісів
філії «Карпатський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Микола СОЙМА

Лісничий Кедринського лісництва

Василь ЗОЛОТАР

Лісничий Плайського лісництва

Вадим МЕКЛЕШ

Лісничий Усть-Чорнянського лісництва

Юрій СОЙМА

Лісничий Нересницького лісництва

Петро ФЕРЕНЧУК

Лісничий Тернівського лісництва

Василь ЗОЛОТАР

Лісничий Теремблянського лісництва

Юрій БУЛИК

Лісничий Турбатського лісництва

Дмитро ЧУСА

Лісничий Лопухівського лісництва

Володимир БАНГА

Лісничий Брадульського лісництва

Федір ДЕКАТ

Лісничий Тарасівського лісництва

Іван ДЕКАТ

Лісничий Тарасівського №2 лісництва

Андрій КАЛИНИЧ

Лісничий Комсомольського лісництва

Валерій САСИН

Лісничий Краснянського лісництва

Михайло ФЕРИМА

Лісничий Тиховецького лісництва

Петро НОСА