

Акт
санітарного та лісопатологічного обстеження,
санітарної оцінки насаджень що потребують проведення
вибіркових санітарних рубок на території Гадяцького надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«15» вересня 2025 р.

м. Гадяч

Комісія в складі: Головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., начальника відділу діагностики ДЛСП «Харківлісозахист» Осадчого Р.А., інженера охорони і захисту лісу І категорії відділу охорони і захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Симітко Т.М., у присутності працівників лісової охорони Гадяцького надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України», провела обстеження насаджень Гадяцького надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» на площі 64,7 гектарів, а саме:

Гадяцьке лісництво(Гадяцьке агролісництво)
(ДП «ПДЛП» «Полтаваоблагроліс») (4,0 гектари):

Кв.61 вид 15(3), пл. 1,5 гектара, згідно таксаційного опису 2015 р., насадження 10Сз, вік 78 р., повнота 0,60, висота - 25 м, діаметр -30 см, бонітет 1, тип лісорослинних умов В2ДС, категорія захисності – захисні ліси.

Обстеженням встановлено:

Насадження сосни звичайної в різному ступені уражені інфекційним захворюванням кореневої губки, яка викликає кореневу та комлеву ядрово-заболонну гнилизну корозійно-деструктивного типу. В межах обстеженої ділянки всихання дерев носить перехідний (від поодинокого до групового) характер. Осередок кореневої губки належить до категорії діючих, що підтверджується наявністю свіжого сухостою та всихаючих дерев, які оточені деревами III категорії. В наявності поодинокі куртини всихання дерев діаметром до 5м. Крони дерев, що зростають в між осередковому просторі зріджені, мають блідо-зелене забарвлення.

Також, по всій обстеженій площі спостерігаються дерева з всиханням скелетних гілок різної інтенсивності. Мають місце вітровальні дерева та дерева з нахилом стовбурів понад 30° від вертикальної осі. Дереву V- VI категорії фізіологічного стану заселені короїдами, златками, вусачами.

Кв.30 вид 6(1), пл. 2,5 гектари, згідно таксаційного опису 2015 р., насадження 8Дз2КЛг+Лпд, вік 75 р., повнота 0,7, висота - 22 м, діаметр -28 см, бонітет 2, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – захисні ліси.

На стовбурах дерев дуба звичайного відмічається наявність плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків, що є збудниками стовбурових гнилей листяних порід.

На стовбурах супутніх порід наявні плодові тіла справжнього трутовика (*Fomes fomentarius*), який викликає білу «мармурову» ядрово-заболонну стовбурову гниль та

несправжнього трутовика, який викликає білу ядрово-смугектарасту стовбурову гниль корозійного типу.

Також спостерігаються ознаки хвороби бактеріальної водянки, якою вражені всі листяні породи дерев. Бактеріальна інфекція має системний характер, збудник поширюється по судинній системі рослин та заселяє всі її частини. Виявляється по макроскопічних ознаках: розтріскування кори, швидке розповсюдження виділення ексудату різного кольору із здуттям кори та її відшаруванням, що призводить до закупорення судин та до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев.

Слід відмітити в обстежених насадженнях спостерігається наявність не поодиноких дерев з підірваною кореневою системою, що свідчить про дію осередку корневих гнилей.

Також в наявності дерева – двійчатки з розчахнутими стовбурами в комлі, в результаті чого є дерева з нахилом середньої частини стовбура понад 30 градусів.

Під час обстеження на деревах листяних порід, які відібрані в вибірково санітарну рубку, під корою були виявлені характерні ходи вусачів та лубоїдів. Через них інфекція не тільки проникає в середину, але і активно поширюється по всьому дереву.

Краснолуцьке лісництво (ДП «Гадяцьке ЛГ») (17,8 гектарів):

Кв.34 вид 4, пл. 2,5 гектари, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 9Д31Брс+Клг, вік 77 р., повнота 0,70, висота - 24 м, діаметр - 30 см, бонітет 1, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – захисні ліси.

Кв.35 вид 1 пл. 2,2 гектари, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 9Д31Лпд, вік 72 р., повнота 0,50, висота - 23 м, діаметр - 28 см, бонітет 1, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – захисні ліси.

Кв.35 вид 11, пл. 3,1 гектари, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 8Д31Клг1Ос+Лпд+Брс, вік 72 р., повнота 0,70, висота - 22 м, діаметр - 26 см, бонітет 1, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – захисні ліси.

Кв.64 вид 4 пл. 10,0 гектарів, згідно таксаційного опису 2013 р., насадження 5Д33Клг1Лпд1Ос, вік 75 р., повнота 0,60, висота - 21 м, діаметр - 28 см, бонітет 3, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – захисні ліси.

Обстеженням встановлено:

На стовбурах дерев дуба звичайного відмічається наявність плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків, що є збудниками стовбурових гнилей листяних порід.

На стовбурах супутніх порід наявні плодові тіла справжнього трутовика (*Fomes fomentarius*), який викликає білу «мармурову» ядрово-заболонну стовбурову гниль та несправжнього трутовика, який викликає білу ядрово-смугектарасту стовбурову гниль корозійного типу.

Також спостерігаються ознаки хвороби бактеріальної водянки, якою вражені всі листяні породи дерев. Бактеріальна інфекція має системний характер, збудник поширюється по судинній системі рослин та заселяє всі її частини. Виявляється по макроскопічних ознаках: розтріскування кори, швидке розповсюдження виділення ексудату різного кольору із здуттям кори та її відшаруванням, що призводить до

закупорення судин та до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев.

Слід відмітити в обстежених насадженнях спостерігається наявність не поодиноких дерев з підірваною кореневою системою, що свідчить про дію осередку корневих гнилей.

Також в наявності дерева – двійчатки з розчахнутими стовбурами в комлі, в результаті чого є дерева з нахилом середньої частини стовбура понад 30 градусів.

Під час обстеження на деревах листяних порід, які відібрані в вибірково санітарну рубку, під корою були виявлені характерні ходи вусачів та лубоїдів. Через них інфекція не тільки проникає в середину, але і активно поширюється по всьому дереву.

Пирятинське лісництво (ДП «Пирятинське ЛГ») (22,7 гектари):

Кв.5 вид 16, пл. 1,1 гектара, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 9Дз1Лпд+Клг, вік 70 р., повнота 0,6, висота - 19 м, діаметр – 26 см, бонітет 2, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – байрачні та інші захисні ліси.

Кв.5 вид 29, пл. 4,3 гектари, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 9Дз1Клг+Лпд, вік 75 р., повнота 0,7, висота - 19 м, діаметр – 24 см, бонітет 3, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – байрачні та інші захисні ліси.

Кв.7 вид 10, пл. 3,6 гектари, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 10Дз, вік 75 р., повнота 0,6, висота - 24 м, діаметр – 28 см, бонітет 1, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – байрачні та інші захисні ліси.

Кв.8 вид 25, пл. 1,1 гектара, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 10Дз+Бп+Акб+Вгл, вік 70 р., повнота 0,7, висота - 20 м, діаметр – 26 см, бонітет 2, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – байрачні та інші захисні ліси.

Кв.8 вид 32, пл. 1,7 гектара, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 8Дз1Вгл1Акб+Бп+Ос, вік 75 р., повнота 0,7, висота - 20 м, діаметр – 28 см, бонітет 2, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – байрачні та інші захисні ліси.

Кв.21 вид 16, пл. 1,1 гектара, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 10Дз, вік 80 р., повнота 0,7, висота - 27 м, діаметр – 30 см, бонітет 1, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – байрачні та інші захисні ліси.

Кв.31 вид 14, пл. 0,8 гектара, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 7Дз2Лпд1Клг, вік 75 р., повнота 0,7, висота - 28 м, діаметр – 30 см, бонітет 1, тип лісорослинних умов С3ЗД, категорія захисності – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Кв.31 вид 17, пл. 1,2 гектара, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 7Дз3Лпд+Бп, вік 70 р., повнота 0,6, висота - 28 м, діаметр – 30 см, бонітет 1, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Кв.31 вид 19, пл. 1,6 гектара, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 9Дз1Лпд+Клг+Бп, вік 65 р., повнота 0,6, висота - 26 м, діаметр – 28 см, бонітет 1А, тип лісорослинних умов Д2ЗД, категорія захисності – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Кв.35 вид 2, пл. 1,3 гектара, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 6Дз2Клг2Лпд, вік 80 р., повнота 0,7, висота - 30 м, діаметр – 30 см, бонітет 1А, тип лісорослинних умов С2ЗД, категорія захисності – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Кв.35 вид 8, пл. 2,5 гектари, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 9Дз1Лпд+Клг, вік 77 р., повнота 0,7, висота - 28 м, діаметр – 30 см, бонітет 1А, тип лісорослинних умов С23Д, категорія захисності – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Кв.35 вид 13, пл. 0,3 гектара, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 10Дз+Лпд, вік 80 р., повнота 0,7, висота - 29 м, діаметр – 32 см, бонітет 1А, тип лісорослинних умов С23Д, категорія захисності – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Кв.35 вид 17, пл. 2,1 гектари, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 6Дз3Лпд1Бп+Вгл, вік 65 р., повнота 0,6, висота - 28 м, діаметр – 32 см, бонітет 1А, тип лісорослинних умов С23Д, категорія захисності – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Обстеженням встановлено:

На стовбурах дерев наявні водяні пагони, як свіжі так і всихаючі. У дуба звичайного відмічається наявність плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків, що є збудниками стовбурових гнилей листяних порід.

На стовбурах супутніх порід наявні плодові тіла справжнього трутовика (*Fomes fomentarius*), який викликає білу «мармурову» ядрово-заболонну стовбурову гниль та несправжнього трутовика, який викликає білу ядрово-смугектарасту стовбурову гниль корозійного типу.

Також спостерігаються ознаки хвороби бактеріальної водянки, якою вражені листяні породи дерев. Бактеріальна інфекція має системний характер, збудник поширюється по судинній системі рослин та заселяє всі її частини. Виявляється по макроскопічних ознаках: розтріскування кори, швидке розповсюдження виділення ексудату різного кольору із здуттям кори та її відшаруванням, що призводить до закупорення судин та до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев.

Слід відмітити в обстеженому насадженні спостерігається наявність не поодиноких дерев з підірваною кореневою системою, що свідчить про дію осередку корневих гнилей.

Також в наявності дерева – двійчатки з розчахнутими стовбурами в комлі, в результаті чого є дерева з нахилом середньої частини стовбура понад 30 градусів.

Під час обстеження на деревах листяних порід, які відібрані в вибірково санітарну рубку, під корою були виявлені характерні ходи вусачів та лубоїдів. Через них інфекція не тільки проникає в середину, але і активно поширюється по всьому дереву.

Чорнухинське лісництво (ДП «Пирятинське ЛГ») (20,2 гектарів)

Кв.43 вид 4, пл. 1,9 гектара, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 8Дз2Клг+Лпд+Яз вік 75 р., повнота 0,7, висота - 25 м, діаметр – 26 см, бонітет 1, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – байрачні та інші захисні ліси.

Кв.43 вид 5, пл. 1,5 гектара, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 4Дз5Лпд1Клг+Бп+Ос+Брс, вік 40 р., повнота 0,8, висота - 17 м, діаметр – 18 см, бонітет 1, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – байрачні та інші захисні ліси.

Кв.43 вид 6, пл. 5,8 гектари, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 5Дз3Клг2Лпд+Гз+Яз, вік 70 р., повнота 0,7, висота - 26 м, діаметр – 26 см, бонітет 1А, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – байрачні та інші захисні ліси.

Кв.43 вид 9, пл. 7,3 гектари, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 10Дз, вік 75 р., повнота 0,5, висота - 26 м, діаметр – 28 см, бонітет 1, тип лісорослинних умов Д2КЛД, категорія захисності – байрачні та інші захисні ліси.

Кв.62 вид 6, пл. 2,4 гектари, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 8Дз2Гз, вік 95 р., повнота 0,5, висота - 24 м, діаметр – 40 см, бонітет 2, тип лісорослинних умов С1ЕКД, категорія захисності – ліси протиерозійні.

Кв.62 вид 7, пл. 1,3 гектара, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 8Дз1Лпд1Гз, вік 70 р., повнота 0,6, висота - 23 м, діаметр – 28 см, бонітет 1, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності – ліси протиерозійні.

Обстеженням встановлено:

На стовбурах дерев наявні водяні пагони, як свіжі так і всихаючі. На стовбурах дерев дуба звичайного відмічається наявність плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків, що є збудниками стовбурових гнилей листяних порід, які відібрані в санітарні вибіркові рубки.

На стовбурах супутніх порід наявні плодові тіла справжнього трутовика (*Fomes fomentarius*), який викликає білу «мармурову» ядрово-заболонну стовбурову гниль та несправжнього трутовика, який викликає білу ядрово-смугектарасту стовбурову гниль корозійного типу.

Також спостерігаються ознаки хвороби бактеріальної водянки, якою вражені всі листяні породи дерев. Бактеріальна інфекція має системний характер, збудник поширюється по судинній системі рослин та заселяє всі її частини. Виявляється по макроскопічних ознаках: розтріскування кори, швидке розповсюдження виділення ексудату різного кольору із здуттям кори та її відшаруванням, що призводить до закупорення судин та до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев.

Слід відмітити в обстеженому насадженні спостерігається наявність не поодиноких дерев з підірваною кореневою системою, що свідчить про дію осередку корневих гнилей.

Також в наявності дерева – двійчатки з розчахнутими стовбурами в комлі, в результаті чого є дерева з нахилом середньої частини стовбура понад 30 градусів.

Під час обстеження на деревах листяних порід, які відібрані в вибірково санітарну рубку, під корою були виявлені характерні ходи вусачів та лубоїдів. Через них інфекція не тільки проникає в середину, але і активно поширюється по всьому дереву.

Висновок:

1. Основними факторами ослаблення фізіологічного стану та захисних функцій насаджень є: різке коливання погодно-кліматичних умов, коливання режиму зволоження ґрунтів, яке в свою чергу сприяє інтенсивному розвитку шкідників та збудників хвороб лісу;


2. В ослаблених лісових насадженнях, які втрачають біологічну стійкість та відмічається погіршення їх санітарного стану, необхідно терміново проводити санітарно-оздоровчі заходи, із застосуванням ефективних методів та технологій, в максимально стислі строки, за умови недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище з врахуванням

особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

3. З метою покращення санітарного стану, недопущення подальшого розповсюдження шкідливих комах та хвороб лісу у вищезазначених насадженнях, комісія вважає за доцільне провести вибіркові санітарні рубки у 2025 році на загальній площі **64,7** гектарів.

4. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів здійснити з дотриманням вимог «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою КМУ від 27.07.1995р. №555, в редакції постанови КМУ від 26.10.2016р. №756, в редакції постанови КМУ від 26.10.2016р. №756 та постанови КМУ від 09.12.2020р. №1224.

Підписи:



Марченко Я.О.

Осадчий Р.А.

Симітко Т.М.