

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

10 жовтня 2025 року

м. Тростянець

Нами, інженером-лісопатологом I категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., інженером-лісопатологом I категорії відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Коровкою Т. І., провідним інженером охорони та захисту лісу філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Павлушенко Є. А., інженером охорони та захисту лісу філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Яценком О. С., разом з лісовою охороною Груньського, Краснянського, Литовського, Маківського, Нескучанського, Олешнянського, Охтирського, Солдатського, Солдатського (Великописарівського), Тростянецького та Хухрянського лісництв проведено обстеження насаджень Тростянецького надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Сумської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **810,1 гектарів**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Груньське лісництво (74,9 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
8	11	2,5	10ДЗ+ГШЗ+БРС+ОС	68	0.75	1	24	28	335
9	12	2,6	8ДЗ2КЛГ+БРС+ЛПД	73	0.70	1	24	36	240
12	2	7,2	6ДЗ2ЛПД2КЛГ	90	0.70	2	25	40	280
20	2	4,4	6ДЗ3ЛПД1КЛГ	100	0.70	2	25	44	310
25	11	1,7	8ДЗ1КЛГ1ЛПД	86	0.70	2	24	30	310
31	2	1,7	9ДЗ1ЛПД+КЛГ	100	0.60	2	26	36	250
37	18	2,4	9ДЗ1ЛПД+КЛГ	86	0.70	1	25	30	330
38	7	2,5	10ДЗ+КЛГ+ЛПД	100	0.65	2	26	44	280
42	10	0,9	8ДЗ1КЛГ1ЛПД	85	0.70	2	24	36	270
47	10	5,5	8ДЗ1КЛГ1ЛПД+БРС+ГШЗ	95	0.70	2	24	48	240
52	17	4,6	5ДЗ5ЛПД+ЯЗ	110	0.60	2	27	48	270
69	7	8,0	7ДЗ1ЯЗ1КЛГ1ЛПД+ГШЗ	71	0.80	1	23	32	330
69	8	4,2	7ДЗ1ЯЗ1ЛПД1КЛГ	115	0.60	2	26	40	270
90	21	10,0	4ДЗ4ЯЗ1КЛГ1ЛПД+КЛП	105	0.70	1	28	40	360

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, халаровий некроз, трутовик звичайний, бактеріальний рак ясена, сірчано-жовтий трутовик, печіночниця звичайна та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодів тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
91	5	3,7	7ЯЗЗДЗ+КЛГ+ЛПД	70	0.70	1А	30	32	380
96	3	13,0	4ЯЗ2ДЗ2ЛПД2КЛГ+КЛП	105	0.70	1	30	40	330

При проведенні лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: халаровий некроз, несправжній дубовий трутовик, бактеріальний рак ясена, трутовик звичайний, опеньок осінній, сірчано-жовтий трутовик, щетиноволосий трутовик та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухоостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений малий ясеневий лубоїд та великий ясеневий лубоїд. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Краснянське лісництво (25,2 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
10	5	1	16,6	4ДЗ4ЯЗ1ЛПД1КЛГ	134	0.71	1	31	36	451
10	7		8,6	7ДЗ1ЯЗ1КЛГ1ЛПД	129	0.66	2	26	36	312

В ході проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, халаровий некроз, трутовик звичайний, бактеріальний рак ясена, сірчано-жовтий трутовик, печіночниця звичайна та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухоостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Литовське лісництво (69,2 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
39	1	2,1	7ДЗ2ЯЗ1КЛГ	104	0.78	2	26	36	371
39	6	2,7	5ДЗ2КЛГЗЯЗ	134	0.58	1	29	36	347
39	9	4,1	6ДЗ2ЛПД1ЯЗ1КЛГ	109	0.71	2	26	36	317
55	9	4,8	5ДЗ2ЯЗ2ЛПД1КЛГ	114	0.73	1	28	36	388
34	1	19,0	10ДЗ+ЯЗ+КЛГ	99	0.77	1	27	32	367
34	5	5,6	10ДЗ	104	0.62	2	26	36	277

Під час проведення лісопатологічного обстеження даного насадження встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, сірчано-жовтий трутовик, облямований трутовик та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
76	5	30,9	5ЯЗЗДЗІКЛГІЛПД	154	0.60	1	33	44	367

Лісопатологічним обстеженням даної ділянки встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: халаровий некроз, несправжній дубовий трутовик, бактеріальний рак ясена, трутовик звичайний, опеньок осінній та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений малий ясеневий лубоїд та великий ясеневий лубоїд. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Маківське лісництво (47,0 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер ділянки	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
24	10		14,0	6ДЗЗЛПДІКЛГ	124	0.72	1	32	52	417
39	9		4,6	7ДЗЗЛПДІКЛГ	109	0.72	2	25	32	307
43	10		3,7	8ДЗЗЛПД	104	0.72	2	25	36	307
45	3		5,0	7ДЗЗЛПД	104	0.74	2	27	32	347
51	3		15,9	8ДЗІСЗІКЛГ+МДЕ	120	0.72	2	26	36	337
54	6	1	3,8	9ДЗІЛПД	100	0.66	1	28	36	367

В ході проведення лісопатологічного обстеження даного насадження встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, сірчано-жовтий трутовик, облямований трутовик та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Нескучанське лісництво (82,6 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
52	10	13,3	5Д32ЛПД2Я31ДЧР+СЗ+КЛГ	116	0.77	1	28	28	412
70	6	6,7	7Д32КЛГ(74)1ЯЗ+КЛГ+МДЕ	120	0.61	2	28	36	317
73	15	3,9	6Д34ЯЗ+КЛГ+ЛПД	95	0.72	1	28	32	416
75	8	17,0	4Д34ЯЗ1ЛПД1КЛГ+БРС	95	0.75	1	26	28	356
81	3	7,7	4Д34ЯЗ1ЛПД1КЛГ	96	0.73	1	27	32	376
82	13	5,0	4Д34ЯЗ1КЛГ1ЛПД	93	0.74	1	29	30	427

Лісопатологічним обстеженням даних насаджень встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, халаровий некроз, трутовик звичайний, бактеріальний рак ясена, сірчано-жовтий трутовик, печіночниця звичайна та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками з родини короїдів. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
57	1	29,0	6Я32ДЗ1ЛПД1КЛГ	104	0.71	1А	32	42	381

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: халаровий некроз, несправжній дубовий трутовик, бактеріальний рак ясена, трутовик звичайний, опеньок осінній, сірчано-жовтий трутовик, щетиноволосий трутовик та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений малий ясеневий лубоїд та великий ясеневий лубоїд. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Олешнянське лісництво (95,3 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
1	4	4,2	8Д31ЛПД1КЛГ	90	0.80	2	25	36	300
21	9	5,4	4Д34ЯЗ1КЛГ1ЛПД	110	0.70	2	28	40	320

21	15	15,2	4ДЗ4ЯЗ1КЛГ1КЛП	100	0.70	2	26	36	320
53	5	6,5	8ДЗ(90)2ДЗ(70)+ОС+КЛГ	90/70	0.70	2	26/23	30/24	300
53	15	9,7	8ДЗ(100)2ДЗ(80)	100/80	0.70	1	28/24	40/28	330
56	1	26,5	7ДЗ2КЛГ1КЛП+ЛПД+ЯЗ	100	0.70	2	26	36	290

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, халаровий некроз, трутовик звичайний, печіночниця звичайна, сірчано-жовтий трутовик та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
5	1	9,8	7ЯЗ1ДЗ1ЛПД1КЛГ	90	0.70	1А	31	44	370
36	2	12,0	6ЯЗЗДЗ1КЛГ+ЛПД	95	0.70	1	30	36	370
36	13	6,0	6ЯЗ1ДЗ1КЛГ2ЛПД+БП+ОС	95	0.80	1	30	36	400

В ході проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: халаровий некроз, несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, опеньок осінній, щетиноволосий трутовик та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений малий ясеневий лубоїд та великий ясеневий лубоїд. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Охтирське лісництво (86,7 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
56	14	4,0	5ДЗЗЯЗ1ЛПД1КЛГ	100	0.60	1	28	40	320
60	1	36,0	4ДЗЗЯЗ2ЛПД1КЛГ	100	0.70	1	28	40	370
63	9	21,1	6ДЗЗЯЗ1КЛГ+ЛПД	85	0.90	2	26	36	390
64	5	6,2	7ДЗ2ЯЗ1КЛГ	86	0.70	1	25	30	320
65	7	4,5	10ДЗ+ЛПД	81	0.70	1	27	36	380
67	5	4,7	6ДЗЗЯЗ1ЛПД+КЛГ	66	0.90	1	24	28	390

При проведенні лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, халаровий

некроз, трутовик звичайний, бактеріальний рак ясена, сірчано-жовтий трутовик, печіночниця звичайна та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
57	1	10,2	6ЯЗЗДЗ1КЛГ+ЛПД	100	0.70	1	30	40	350

Лісопатологічним обстеженням даної ділянки встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: халаровий некроз, несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, бактеріальний рак ясена, опеньок осінній, щетиноволосий трутовик та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений малий ясеневий лубоїд та великий ясеневий лубоїд. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Солдатське лісництво (184,0 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
45	11	32,0	7ДЗ2КЛП1ЯЗ	91	0.70	1	27	36	330
46	3	0,9	5ДЗ4КЛП1КЛГ	61	0.70	1А	24	28	230
46	4	3,7	8ДЗ2КЛП	101	0.80	2	27	40	320
52	3	6,0	8ДЗ2ЯЗ	91	0.70	1	28	36	370
54	1	19,6	6ДЗ2ЯЗ2КЛГ	91	0.70	1	27	36	370
56	1	31,6	5ДЗ5ЯЗ	91	0.80	2	26	32	375
57	2	20,2	5ДЗ4ЯЗ1КЛГ	91	0.80	1	28	32	410
63	1	29,1	4ДЗЗЯЗ3КЛГ	70	0.70	1	27	36	310

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, халаровий некроз, трутовик звичайний, бактеріальний рак ясена, сірчано-жовтий трутовик та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
47	1	30,0	7ЯЗ1КЛГ1ЛПД1ДЗ	60	0.80	1	26	32	360
52	4	2,3	6ЯЗ2ДЗ2КЛГ	55	0.70	1	25	28	270
54	4	2,0	8ЯЗ2ДЗ+КЛП+БРС	91	0.70	1	27	36	360
58	4	6,6	8ЯЗ2ДЗ+КЛГ	81	0.70	1А	29	36	370

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: халаровий некроз, несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, бактеріальний рак ясена, опеньок осінній, щетиноволосий трутовик та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений малий ясеневий лубоїд та великий ясеневий лубоїд. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Солдатське (Великописарівське) лісництво (49,5 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
47	6	7,4	10ДЗ+ЯЗЛ	72	0.60	1	24	32	260
47	8	2,2	5ДЗ4КЛГ1ЯЗ+БРС	72	0.70	1	25	30	280
47	9	0,7	6ДЗ3КЛП1БРС	53	0.60	2	18	24	140
47	10	0,9	9ДЗ1КЛГ	91	0.50	2	25	44	200
47	11	0,9	8ДЗ2КЛГ+БРС	66	0.60	1	21	36	200
48	1	0,9	3ДЗ4ЯЗЛЗКЛП+ГШЗ	70	0.80	3	20	36	220
48	2	8,7	8ДЗ2КЛГ+ЛПД	72	0.70	1	24	32	260
48	4	1,9	10ДЗ	56	0.70	1А	22	30	260
48	6	2,4	5ДЗ5ЛПД+ЯЗЛ+КЛГ	66	0.70	1	23	28	280
48	7	0,6	10ДЗ+КЛП	71	0.60	1	23	32	240
48	15	10,3	8ДЗ2КЛП	126	0.80	2	26	40	320
49	6	12,6	8ДЗ2КЛГ	96	0.70	1	28	44	330

В ході проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, халаровий некроз, трутовик звичайний, бактеріальний рак ясена, сірчано-жовтий трутовик, бактеріальний рак ясена та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Тростянецьке лісництво (38,8 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
11	23	1,1	9ДЗ1КЛГ	104	0.71	1	27	40	339
17	16	5,6	4ДЗЗСЗ1ЯЗ1КЛГ1БРС	93	0.62	1	26	36	271
15	3	5,5	7ДЗ2КЛГ1ОС+СЗ+ЛПД+БП	89	0.61	1	26	32	281
49	4	10,6	6ЯЗ2ДЗ1КЛП1КЛГ	109	0.81	1	30	36	372
55	2	16,0	5ДЗЗЯЗ2КЛГ	99	0.71	1	28	36	341

При проведенні лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, халаровий некроз, трутовик звичайний, бактеріальний рак, коренева губка, ясена, сірчано-жовтий трутовик та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Хухрянське лісництво (56,9 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
29	7	1,4	9ДЗ1ЯЗ+КЛП+БРС	110	0.70	2	28	40	340
29	8	3,1	9ДЗ1ЯЗ+КЛП	110	0.70	2	28	40	340
34	16	14,5	10ДЗ+ЯЗ+КЛГ+ЛПД	77	0.70	1	25	28	330
73	7	2,1	3ДЗ4ОС2СЗ1БП	60	0.80	2	23	24	360
73	13	2,3	8ДЧР2БП+ОС+ДЗ	53	0.90	1	21	20	270
73	21	6,1	3ДЗ2ОС2СЗ3БП+ЛПД+БРС	60	0.80	1	24	26	350

Лісопатологічним обстеженням вищеперелічених ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, халаровий некроз, трутовик звичайний, бактеріальний рак ясена, облямований трутовик, сірчано-жовтий трутовик, березовий трутовик, несправжній осиковий трутовик та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
43	3	10,5	5Я31ЛПДЗД31КЛГ+КЛП+БРС	120	0.70	1	31	40	350
43	25	10,0	5Я31ЛПДЗД31КЛГ	120	0.70	1	31	48	360
50	8	6,9	5Я32Д31ЛПД2КЛГ	130	0.70	1	30	40	330

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: халаровий некроз, несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, бактеріальний рак ясена, опеньок осінній, щетиноволосий трутовик та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодів тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений малий ясеневий лубоїд та великий ясеневий лубоїд. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хворобами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2026 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів. Враховуючи ступінь ураження інфекційними хворобами та розповсюдження стовбурових шкідників - вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **810,1 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних хвороб. Адже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Тростянецьке надлісництво філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»
- Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

Підписи:

 I. V. Рідкокаша
 T. I. Коровка
 С. А. Павлушенко
 О. С. Яценко