

А К Т

обстеження насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок
в насадженнях філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»,
Рахівського надлісництва

24 грудня 2025 року

с.м.т. Ясіня

Нами, заступником начальника управління-начальник відділу лісового та мисливського господарства в Закарпатській області Василем Атаманюком, заступником селищного голови Ясінянської селищної ради Сергієм ТИМОЩЕНКОМ, інженером-лісопатологом Закарпатського опорного лісопатологічного пункту ДСЛП «Львівлісозахист» Олегом СТЕБЕЛЕЦЬКИМ, за участю лісного Лопушанського лісництва Михайла ЩЕРБЮКА, лісного Лазещинського лісництва Євгена ЗЕЛІНСЬКОГО, лісного Довжанського лісництва Михайла КУВІКА, помічника лісного Чорнотисянського лісництва Валерія ОНИЩУКА, лісного Станиславського лісництва Степана ЦУПЕРЯКА, в період 17-24.12.2025 року проведено комісійне обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них суцільних санітарних рубок.

Матеріали відведення і таксації лісосік наведені згідно даних наданих працівниками філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.

Довжанське лісництво

Квартал 1, виділ 50, площа відведена в рубку 0,4 га.

Таксаційна характеристика: кв. 1 , вид. 50 , площа 10,0 га, склад 10ЯЛЄ+БКЛ, вік 75 років, повнота 0,60 , бонітет 1А , середня висота 27 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 450 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 60 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 21, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 5 , вид. 21 , площа 11,5 га, склад 8ЯЛЄ2БКЛ+ЯЦБ, вік 55 років, повнота 0,80 , бонітет 1А , середня висота 24 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 500 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 62 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 32, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 5 , вид. 32 , площа 4,8 га, склад 8ЯЛЄ2БКЛ+ЯЦБ, вік 53 років, повнота 0,80 , бонітет 1А , середня висота 23 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 490 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 71 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 37, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: кв. 5 , вид. 37 , площа 9,5 га, склад 10ЯЛЄ+БКЛ, вік 55 років, повнота 0,80 , бонітет 1А , середня висота 23 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 510 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених

деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 70 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 45, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 6 , вид. 45 , площа 3,4 га, склад 10ЯЛЄ+БКЛ, вік 60 років, повнота 0,30 , бонітет 1А , середня висота 25 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 200 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверх спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 68 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 20д2, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: кв. 8 , вид. 20 , площа 34,5 га, склад 10ЯЛЄ+ЯВ+БКЛ, вік 52 років, повнота 0,90 , бонітет 1А , середня висота 23 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 560 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверх спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 75 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 20д4, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 8 , вид. 20 , площа 34,5 га, склад 10ЯЛЄ+ЯВ+БКЛ, вік 52 років, повнота 0,90 , бонітет 1А , середня висота 23 м,

середній діаметр 24 см, запас на 1 га 560 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 66 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Лопушанське лісництво

Квартал 2, виділ 28д1, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 2 , вид. 28 , площа 6,9 га, склад 8ЯЛЄ2ЯЦБ+БКЛ, вік 67 років, повнота 0,80 , бонітет 1А , середня висота 26 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 570 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками, раком ялиці. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 52 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 3, виділ 28д3, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 3 , вид. 28 , площа 9,6 га, склад 9ЯЛЄ1ЯЦБ, вік 53 років, повнота 0,85 , бонітет 1Б , середня висота 26 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 630 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками, раком ялиці. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена.

Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 65 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 3, виділ 28д4, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 3 , вид. 28 , площа 9,6 га, склад 9ЯЛЄ1ЯЦБ, вік 53 років, повнота 0,85 , бонітет 1Б , середня висота 26 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 630 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками, раком ялиці. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 75 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 3, виділ 43, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 3 , вид. 43 , площа 18,1 га, склад 10ЯЛЄ+ЯЦБ+ЯВ+БКЛ, вік 55 років, повнота 0,85 , бонітет 1Б , середня висота 25 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 590 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками, раком ялиці. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 62 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 3, виділ 50, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 3 , вид. 50 , площа 6,4 га, склад 9ЯЛЄ1ЯЦБ+БКЛ, вік 52 років, повнота 0,85 , бонітет 1А , середня висота 23 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 520 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками, раком ялиці. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 75 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 5, площа відведена в рубку 0,4 га.

Таксаційна характеристика: кв. 4 , вид. 5 , площа 20,0 га, склад 10ЯЛЄ+БКЛ, вік 62 років, повнота 0,75 , бонітет 1Б , середня висота 29 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 650 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками, раком ялиці. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 64 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 32, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 6 , вид. 32 , площа 5,2 га, склад 10ЯЛЄ, вік 37 років, повнота 0,90 , бонітет 1 , середня висота 15 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 300 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами,

переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 61 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 19д2, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 7 , вид. 19 , площа 10,2 га, склад 10ЯЛЄ, вік 52 років, повнота 0,80 , бонітет 1А , середня висота 22 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 470 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 58 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 22д1, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: кв. 7 , вид. 22 , площа 6,0 га, склад 10ЯЛЄ вік 52 років, повнота 0,80 , бонітет 1А , середня висота 22 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 470 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 70 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 23, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 7 , вид. 23 , площа 12,5 га, склад 10ЯЛЄ, вік 52 років, повнота 0,80 , бонітет 1А , середня висота 22 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 470 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 63 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 20д2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 8 , вид. 20 , площа 17,0 га, склад 6ЯЛЄ2ЯЦБ2БКЛ, вік 34 років, повнота 0,90 , бонітет 1 , середня висота 15 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 260 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 70 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 3д1, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 9 , вид. 3 , площа 17,0 га, склад 9ЯЛЄ1БКЛ, вік 54 років, повнота 0,80 , бонітет 1А , середня висота 23 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 480 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію.

Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 59 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 3д2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 9 , вид. 3 , площа 17,0 га, склад 9ЯЛЄ1БКЛ, вік 54 років, повнота 0,80 , бонітет 1А , середня висота 23 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 480 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 57 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 11, виділ 34, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 11 , вид. 34 , площа 20,7 га, склад 8ЯЛЄ1ЯЦБ1БКЛ, вік 67 років, повнота 0,85 , бонітет 1А , середня висота 26 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 620 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 52 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ бд4, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 14 , вид. 6 , площа 13,0 га, склад 10ЯЛЄ+ЯЦБ+ВЛС, вік 62 років, повнота 0,80 , бонітет 1А , середня висота 25 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 560 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 53 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 15, виділ бд1, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 15 , вид. 6 , площа 32,3 га, склад 8ЯЛЄ1ЯЦБ1БКЛ, вік 57 років, повнота 0,80 , бонітет 1А , середня висота 24 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 510 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 52 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 6, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 17 , вид. 6 , площа 2,0 га, склад 8ЯЛЄ1БКЛ1ЯВ, вік 58 років, повнота 0,70 , бонітет 1А , середня висота 24 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 400 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 57 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Лазещинське лісництво

Квартал 7, виділ 18д1, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 7, вид. 18, площа 15,0 га, склад 10ЯЛЄ, вік 65 років, повнота 0,75, бонітет 1А, середня висота 27 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 590 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиками. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 68 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 37д2, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: кв. 10, вид. 37, площа 16,0 га, склад 8ЯЛЄ2ЯЦБ+ЯВ+БКЛ, вік 43 років, повнота 0,75, бонітет 1Б, середня висота 23 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 430 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 52 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 38д2, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 10, вид. 38, площа 25,0 га, склад 10ЯЛЄ+БКЛ+ЯЦБ, вік 87 років, повнота 0,55, бонітет 1А, середня висота 29 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 470 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Таксаційна характеристика: кв. 7 , вид. 18 , площа 15,0 га, склад 10ЯЛЄ, вік 65 років, повнота 0,75 , бонітет 1А , середня висота 27 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 590 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиками. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 50 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 54, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 14 , вид. 54 , площа 5,1 га, склад 10ЯЛЄ+ЯЦБ+БКЛ, вік 43 років, повнота 0,80 , бонітет 1Б , середня висота 22 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 470 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиками. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 41 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 61, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: кв. 14 , вид. 61 , площа 11,0 га, склад 9ЯЛЄ+1ЯЦБ+БКЛ, вік 77 років, повнота 0,60 , бонітет 1А , середня висота 29 м, середній діаметр 34 см, запас на 1 га 520 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених

деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиками. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 57 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 7д2, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 15 , вид. 7 , площа 12,5 га, склад 9ЯЛЄ1ЯЦБ, вік 92 років, повнота 0,65 , бонітет 1А , середня висота 30 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 540 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиками. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 55 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 84д1, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика: кв. 15 , вид. 84 , площа 1,8 га, склад 8ЯЛЄ2ЯЦБ+БКЛ, вік 82 років, повнота 0,70 , бонітет 1А , середня висота 29 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 600 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиками, кореневою губкою, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 44 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Станиславське лісництво

Квартал 5, виділ 4д1, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: кв. 5 , вид. 4 , площа 5,0 га, склад 10ЯЛЄ, вік 72 років, повнота 0,70 , бонітет 1Б , середня висота 29 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 590 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 61 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 17д1, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 5 , вид. 17 , площа 20,5 га, склад 10ЯЛЄ+БКЛ+ЯВ, вік 62 років, повнота 0,65 , бонітет 1Б , середня висота 29 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 520 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиками. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 71 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 18, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 17 , вид. 18 , площа 7,4 га, склад 8ЯЛЄ2БКЛ+ЯЦБ+ЯВ, вік 47 років, повнота 0,80 , бонітет 1Б , середня висота 23 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 430 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного

стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиками. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 49 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Чорнотисянське лісництво

Квартал 2, виділ 48д1, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 2, вид. 48, площа 9,4 га, склад 10ЯЛЄ, вік 57 років, повнота 0,80, бонітет 1А, середня висота 22 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 500 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 62 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 3, виділ 47д5, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 3, вид. 47, площа 6,6 га, склад 10ЯЛЄ, вік 55 років, повнота 0,80, бонітет 1А, середня висота 22 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 520 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 63 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 40д1, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 10 , вид. 40 , площа 5,9 га, склад 7ЯЛЄ2БКЛ1ЯЦБ+БКЛ+ЯВ, вік 82 років, повнота 0,70 , бонітет 1А , середня висота 29 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 480 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 73 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 40д2, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 10 , вид. 40 , площа 5,9 га, склад 7ЯЛЄ2БКЛ1ЯЦБ+БКЛ+ЯВ, вік 82 років, повнота 0,70 , бонітет 1А , середня висота 29 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 480 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 69 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини, керуючись «СПЛУ» вважаємо за доцільне провести суцільні санітарні рубки на загальній площі 29,6 га; загальною кубомасою 13353 м³ в т. ч. ліквідної – 10428 м³, ділової – 6099 м³.

Довжанське лісництво

Кв. 1, виділ 50, площа 0,4 га, 171 м³ в т. ч. ліквідної – 144 м³, ділової – 82 м³;
Кв. 5, виділ 21, площа 0,8 га, 388 м³ в т. ч. ліквідної – 309 м³, ділової – 186 м³;
Кв. 5, виділ 32, площа 0,8 га, 272 м³ в т. ч. ліквідної – 211 м³, ділової – 115 м³;
Кв. 5, виділ 37, площа 0,6 га, 254 м³ в т. ч. ліквідної – 200 м³, ділової – 121 м³;
Кв. 6, виділ 45, площа 0,7 га 339, м³ в т. ч. ліквідної – 245 м³, ділової – 153 м³;
Кв. 8, виділ 20.2, площа 0,6 га 413, м³ в т. ч. ліквідної – 313 м³, ділової – 187 м³;
Кв. 8, виділ 20.4, площа 0,9 га 547, м³ в т. ч. ліквідної – 426 м³, ділової – 258 м³.

Лопушанське лісництво

Кв. 2, виділ 28.1, площа 0,7 га, 318 м³ в т. ч. ліквідної – 246 м³, ділової – 148 м³;
Кв. 3, виділ 28.3, площа 1,0 га, 378 м³ в т. ч. ліквідної – 278 м³, ділової – 146 м³;
Кв. 3, виділ 28.4, площа 1,0 га, 254 м³ в т. ч. ліквідної – 185 м³, ділової – 90 м³;
Кв. 3, виділ 43, площа 1,0 га 467, м³ в т. ч. ліквідної – 333 м³, ділової – 203 м³;
Кв. 3, виділ 50, площа 1,0 га 392, м³ в т. ч. ліквідної – 258 м³, ділової – 142 м³;
Кв. 4, виділ 5, площа 0,4 га 157, м³ в т. ч. ліквідної – 121 м³, ділової – 67 м³;
Кв. 6, виділ 32, площа 0,8 га 79, м³ в т. ч. ліквідної – 57 м³, ділової – 18 м³;
Кв. 7, виділ 19.2, площа 0,7 га 163, м³ в т. ч. ліквідної – 115 м³, ділової – 45 м³;
Кв. 7, виділ 22.1, площа 0,6 га 287, м³ в т. ч. ліквідної – 207 м³, ділової – 106 м³;
Кв. 7, виділ 23, площа 0,9 га 165, м³ в т. ч. ліквідної – 125 м³, ділової – 61 м³;
Кв. 8, виділ 20.2, площа 1,0 га 334, м³ в т. ч. ліквідної – 281 м³, ділової – 121 м³;
Кв. 9, виділ 3.1, площа 0,8 га 428, м³ в т. ч. ліквідної – 309 м³, ділової – 179 м³;
Кв. 9, виділ 3.2, площа 1,0 га 504, м³ в т. ч. ліквідної – 371 м³, ділової – 200 м³;
Кв. 11, виділ 34, площа 1,0 га 572, м³ в т. ч. ліквідної – 460 м³, ділової – 312 м³;
Кв. 14, виділ 6.4, площа 1,0 га 606, м³ в т. ч. ліквідної – 474 м³, ділової – 331 м³;
Кв. 15, виділ 6.1, площа 0,7 га 367, м³ в т. ч. ліквідної – 270 м³, ділової – 165 м³;
Кв. 17, виділ 6, площа 0,7 га 370, м³ в т. ч. ліквідної – 266 м³, ділової – 166 м³.

Лазещинське лісництво

Кв. 7, виділ 18.1, площа 0,7 га, 430 м³ в т. ч. ліквідної – 376 м³, ділової – 263 м³;
Кв. 10, виділ 37.2, площа 0,6 га, 216 м³ в т. ч. ліквідної – 190 м³, ділової – 80 м³;
Кв. 10, виділ 38.2, площа 0,8 га, 327 м³ в т. ч. ліквідної – 260 м³, ділової – 134 м³;
Кв. 14, виділ 54, площа 0,8 га, 287 м³ в т. ч. ліквідної – 256 м³, ділової – 150 м³;
Кв. 14, виділ 61, площа 0,6 га 358, м³ в т. ч. ліквідної – 295 м³, ділової – 191 м³;
Кв. 15, виділ 7.2, площа 0,8 га 467, м³ в т. ч. ліквідної – 362 м³, ділової – 240 м³;
Кв. 15, виділ 84.1, площа 0,5 га 224, м³ в т. ч. ліквідної – 188 м³, ділової – 106 м³.

Станиславське лісництво

Кв. 5, виділ 4.1, площа 0,6 га 250, м³ в т. ч. ліквідної – 220 м³, ділової – 154 м³.
Кв. 5, виділ 17.1, площа 0,9 га, 603 м³ в т. ч. ліквідної – 502 м³, ділової – 347 м³;
Кв. 17, виділ 18, площа 0,8 га, 329 м³ в т. ч. ліквідної – 255 м³, ділової – 128 м³.

Чорнотисянське лісництво


Кв. 2, виділ 48.1, площа 0,9 га, 465 м³ в т. ч. ліквідної – 367 м³, ділової – 248 м³;
Кв. 3, виділ 47.5, площа 0,8 га, 549 м³ в т. ч. ліквідної – 421 м³, ділової – 276 м³;

Кв. 10, виділ 40.1, площа 0,8 га, 281 м³ в т. ч. ліквідної – 226 м³, ділової – 69 м³;
Кв. 10, виділ 40.2, площа 0,9 га, 342 м³ в т. ч. ліквідної – 306 м³, ділової – 111 м³.


1. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.
 2. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.
 3. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.
- До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.
3. План відведених в рубку ділянок.


Заступник начальника управління-
начальник відділу лісового та мисливського
господарства у Закарпатській області

 Василь АТАМАНЮК


Заступник селищного голови
Ясінянської селищної ради

 Сергій ТИМОЩЕНКО


інженер-лісопатолог Закарпатського
опорного лісопатологічного пункту
ДСЛП „Львівлісозахист”

 Олег СТЕБЕЛЕЦЬКИЙ

Лісничий Лопушанського лісництва

 Михайло ЩЕРБЮК

Лісничий Лазещинського лісництва

 Євген ЗЕЛІНСЬКИЙ


Помічник лісничого Чорнотисянського
лісництва

 Валерій ОНИЩУК

Лісничий Станиславського лісництва

 Степан ЦУПЕРЯК

Лісничий Довжанського лісництва

 Михайло КУВІК