

А К Т

обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок, в насадженнях Зборівського РКАП «Зборіврайагроліс»

18 липня 2025 р.

м. Зборів

Нами, заступником директора ДСЛП „Львівлісозахист” Василем СЕНИКОМ, інженером-лісопатологом Тернопільського ОЛПП ДСЛП „Львівлісозахист” Марією МАКАРОЮ, за участю директора Зборівського РКАП «Зборіврайагроліс» Миколи ЧЕХОВИЧА та лісничого Зборівського РКАП «Зборіврайагроліс» Юрія СИСАКА в період з **17 по 18 липня 2025 року** проведено обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з веденням лісопатологічного журналу, з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарного рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».(далі – СПЛУ).

Лісопатологічний журнал додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування 2005 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок проведено на загальній площі **94,7 га**.

В процесі обстеження встановлено наступне:

Квартал 3, виділ 3, площа 6,0 га.

Насадження ослаблене, уражене **опеньком осіннім**.

Частина дерев сосни звичайної та модрини європейської вітровальні та буреломні, деякі дерева з підірваною кореневою системою та нахилом стовбура. На стовбурах сухостійних і пошкоджених дерев наявні ризоморфи **опенька осіннього**.

Деякі дерева граба звичайного, черешні та інших порід уражені стовбуровими гнилями.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 4, виділ 12, площа 1,8 га.

Спостерігається поодинокі всихання дерев сосни звичайної. На стовбурах ослаблених і сухостійних дерев наявні ризоморфи **опенька осіннього**, а також отвори та ходи стовбурових шкідників.

Деякі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 5, виділ 15, площа 19,0 га.

Габ звичайний (порослевого походження), береза повисла, клен, осика та деякі дерева інших порід ослаблені, уражені стовбуровими та прикореневими гнилями, поодинокі дерева сухостійні. В місцях гнилей наявні ризоморфи **опенька осіннього**. Присутні дерева з дугоподібно вигнутими стовбурами та нахилом понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 9, виділ 12, площа 1,5 га.

Крони дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтуватозелена; приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. На зламі сухостійних екземплярах дерева сосни виявлено посиніння заболоні та деревини, що свідчить про присутність офіостомових грибів. Також на мертвих деревах сосни під корою виявлено ризоморфи **опенька осіннього**. Частина дерев сосни пошкоджених вітром (вітровал, вітролом, злам вершин та неліквідна деревина).

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 9, виділ 14, площа 4 га (в рубку 3,0 га).

Крони дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтуватозелена, приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. На зламі дерева сосни в прикореневій його частині виявлено плодове тіло кореневої губки, а також на стовбурах сухостійних екземплярах наявне посиніння заболоні та деревини, що свідчить про присутність **офіостомових грибів**. Характер всихання поодиноке та групове. Частина дерев сосни пошкоджених вітром (вітровал, вітролом, злам вершин та значна частина неліквідної деревини), на стовбурах присутні отвори та ходи **стовбурових шкідників**.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 13, виділ 10, площа 3,4 га.

Дерева граба звичайного, берези повислої, клена та деяких інших порід уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, окремі дерева сухостійні.

На стовбурах сухостійних дерев спостерігаються сліди діяльності стовбурових шкідників.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 13, виділ 4, площа 2,9 га.

Дерева сосни звичайної ослаблені, хвоя жовто-зелена, а крона дуже ажурна, спостерігається поодиноке всихання. На стовбурах вітровальних дерев наявні ризоморфи **опенька осіннього**.

Габ звичайний, акація біла та деякі дерева інших порід уражені гнилями в нижній та середній частині стовбура, поодинокі сухостійні або всихають.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 14, виділ 18, площа 2,0 га.

Спостерігається поодинокі та групові всихання дерев сосни звичайної. На стовбурах ослаблених і сухостійних дерев наявні ризоморфи **опенька осіннього**, а також отвори та ходи стовбурових шкідників.

Присутні дерева з підірваною кореневою системою, вітровальні та з нахилом стовбура більше ніж 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 15 виділ 2 площа 4,3 га.

Габ звичайний переважно порослевого походження, уражений **стовбуровими гнилями** а також виявлені дуплистість, водяні пагони та мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони.

Черешня лісова та осика уражена стовбуровим гнилями. На не поодиноких стовбурах дерев черешні наявні ракові утворення.

Ступінь пошкодження насадження - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV -VI категорій стану.

Квартал 15, виділ 5, площа 8,3 га.

Габ звичайний переважно порослевого походження, уражений **стовбуровими гнилями**, а також виявлено дуплистість, водяні пагони та мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони.

Черешня лісова та осика уражена стовбуровим гнилями. На не поодиноких стовбурах дерев черешні наявні ракові утворення.

Стовбури граба та осики мають нахил більше 30 градусів від вертикальної осі.

Береза повисла присутня в складі насадження перестійна, уражена дуплистими утвореннями по всій висоті стовбура.

Ступінь пошкодження насадження - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV -VI категорій стану.

Квартал 15, виділ 9, площа 2,8 га .

Крони дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена; приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. Характер всихання насадження - поодинокі дерева. Також на мертвих деревах сосни під корою виявлено ходи **стовбурових шкідників**. Частина дерев сосни пошкоджених вітром мають дугастість та нахил більше 30 градусів від осі стовбура.

Ступінь пошкодження насадження - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV -VI категорій стану.

Квартал 19, виділ 1, площа 1,0 га.

Липа дрібнолиста переважно порослевого походження уражена **стовбуровими гнилями** в нижній прикореневій частині стовбура. Значна частина крон дерев липи мають злами.

Ясень звичайний уражений халаровим некрозом(крона дуже ажурна, приріст відсутній, листя дуже дрібне, жовтіє, всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони), а також в нижній прикореневій частині стовбура наявні стовбурові гнилі.

Поодинокі дерева ільма(береста) уражені графіозом (голландською хворобою) на стовбурах виявлено соковиділення, а також пожовтіле листя, суховершинність основних скелетних гілок крони та сліди заселення шкідників, присутні мертві дерева.

Ступінь пошкодження насадження - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV -VI категорій стану.

Квартал 19, виділ 2, площа 6,7 га.

Липа дрібнолиста переважно порослевого походження уражена стовбуровими **гнилями** в нижній прикореневій частині стовбура. Значна частина крон дерев липи мають злами.

Ясень звичайний уражений халаровим некрозом(крона дуже ажурна, приріст відсутній, листя дуже дрібне, жовтіє, всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони), а також в нижній прикореневій частині стовбура наявні стовбурові гнилі.

Ступінь пошкодження насадження - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV -VI категорій стану.

Квартал 20, виділ 7, площа 4,0 га.

Граб звичайний переважно порослевого походження, уражений стовбуровими **гнилями**, а також виявлені дуплистість, водяні пагони та мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони.

Черешня лісова та осика уражена стовбуровим **гнилями**. На не поодиноких стовбурах дерев черешні наявні ракові утворення.

Присутні дерева, які мають нахил більше 30 градусів від осі.

На деревах дуба звичайного наявні водяні пагони.

Ступінь пошкодження насадження - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV -VI категорій стану.

Квартал 21, виділ 4, площа 7,9 га.

Граб звичайний знаходиться в II ярусі насадження сильно пригнічений про що свідчить значна частина водяних пагонів на деревах. На стовбурових **гнилях** граба виявлено ризоморфи **опенька осіннього**.

Береза повисла перестійна, уражена стовбуровими **гнилями** по всій висоті стовбура. Стовбури берези мають нахил більше 30 градусів від осі.

Ступінь пошкодження насадження - середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV -VI категорій стану.

Квартал 21, виділ 17, площа 4,7 га.

Береза повисла перестійна, уражена стовбуровими **гнилями** по всій висоті стовбура. Стовбури берези мають нахил більше 30 градусів від осі та підірвану кореневу систему.

Черешня лісова уражена стовбуровими **гнилями**, має пошкодження крон та суховершинність.

Ступінь пошкодження насадження- слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV -VI категорій стану.

Квартал 21, виділ 18, площа 5,1 га.

Береза повисла перестійна, уражена стовбуровими **гнилями** по всій висоті стовбура. Стовбури берези мають нахил більше 30 градусів від осі та підірвану кореневу систему.

Черешня лісова уражена стовбуровими гнилями, має пошкодження крон та наявні мертві скелетні гілки.

Ступінь пошкодження насадження- слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV -VI категорій стану.

Квартал 28, виділ 17, площа 5,3 га.

Модрина європейська та дуб червоний уражені стовбуровими гнилями переважно в нижній прикореневій частині стовбура. На даних стовбурових гнилях в більшій їх частині спостерігаємо життєдіяльність вторинних стовбурових шкідників. Також є поодинокі зломи дерев дуба і модрини, а також мертві скелетні гілки крон.

Ступінь пошкодження насадження- слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV -VI категорій стану.

Квартал 28, виділ 37, площа 5,0 га.

Насадження похідне зі складною схемою посадки. Граб звичайний та клен знаходяться в одному ряді та мають значні ураження стовбуровими гнилями.

Осика та верба козяча має ураження гнилями та трутовиками.

Ясень звичайний уражений халаровим некрозом (крона дуже ажурна, приріст відсутній, листя дуже дрібне, жовтіє, всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони), а також в нижній прикореневій частині стовбура наявні стовбурові гнилі.

На даних стовбурових гнилях в більшій їх частині спостерігаємо **ризоморфи опенька осіннього**.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі **94,7 га** при цьому виявлено:

Опеньок осінній – 46,1 га, а саме:

- середня ступінь пошкодження – 46,1 га

Стовбурові та кореневі гнилі – 42,8 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 42,8 га

Стовбурові шкідники – 2,8 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 2,8 га

Комплексний осередок короїдів і офіостомових грибів – 3,0 га, а саме:

- середня ступінь пошкодження – 3,0 га


2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості

деревини та згідно вимог СПЛУ провести вибіркові санітарні рубки на площі **94,7 га.**

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

Заступник директора
ДСЛП «Львівлісозахист»

 Василь СЕНИК


Інженер-лісопатолог
Тернопільського ОЛПП
ДСЛП «Львівлісозахист»

 Марія МАКАРА

Директор
Зборівського РКАП
«Зборіврайагроліс»

 Микола ЧЕХОВИЧ

Лісничий
Зборівського РКАП
«Зборіврайагроліс»

 Юрій СИСАК