

**лісопатологічного обстеження лісових насаджень
ДП «Словечанський лісгосп АПК» на доцільність призначення в них
заходів з поліпшення санітарного стану лісів**

19 листопада 2025 року

с. Словечне
Коростенський район
Житомирська область

На звернення ДП «Словечанський лісгосп АПК», лист № 1867 від 14.11.2025 року, згідно пунктів 2 - 6 Санітарних правил в лісах України затверджених постановою КМУ від 27.07.1995 р. № 555, комісією в складі: провідного інженера-лісопатолога державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі - ДСЛП «Київлісозахист») Юрія ДВОРАКІВСЬКОГО, головного лісничого ДП «Словечанський лісгосп АПК» Михайла ЛІНКЕВИЧА, Слобідського лісництва Василя ГРИБА, Рокитнянського лісництва Андрія ВИШНЕВСЬКОГО та лісничого Перебродського лісництва Сергія КИКЛИ в період з 17 по 19 листопада 2025 року проведено лісопатологічне обстеження окремих лісових насаджень ДП «Словечанський лісгосп АПК» на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркової санітарної рубки (далі ВСР) на 2025 рік.

Результати обстеження

Таксаційна характеристика лісових насаджень, що обстежувались, наведена нижче за матеріалами базового лісовпорядкування 2023 року.

[illegible]

Обстежені насадження характеризуються незадовільним лісопатологічним станом – всиханням різної інтенсивності. Причинами погіршення лісопатологічного стану є діяльність стовбурових шкідників, враження та прогресування хвороби лісу - кореневої губки.

Насадження, пошкоджені стовбуровими шкідниками, характеризуються змішаним всиханням соснових деревостанів (наявні як куртини до 0,1 га, так і групове та поодинокі всихання). Дерев сосни, що потребують видалення, відносяться до дерев IV (відмираючі), V (свіжий сухостій) та VI (старий сухостій) категорій стану (крона дуже ажурна, хвоя світло-зелена або жовтуватозелена, характеризуються частковим опаданням кори, дерева відпрацьовані стовбуровими шкідниками, хвоя, гілки другого і третього порядків відсутні). Переважаючими видами стовбурових шкідників, які призвели до всихання, є лубоїд сосновий малий з відпрацюванням стовбурів дерев сосни в зоні тонкої кори, ходи якого можна спостерігати на поодиноких вивалених деревах з категорії старий сухостій, зламаних вершинах дерев сосни внаслідок бурелому, та великий сосновий лубоїд, синя соснова златка з відпрацюванням стовбурів дерев сосни в зоні товстої кори. Також внутрішні тканини стовбурів в місцях поширення личинкових ходів стовбурових шкідників характеризуються наявністю «синяви», яка характерна при поширенні її збудників - офіостомових грибів. Під деревами спостерігаються «стрижені» пагони зеленого кольору внаслідок додаткового живлення соснових лубоїдів в кількості від 1 шт. до 2 шт. на 1 квадратний метр.

Соснове насадження, вражене кореневою губкою, характеризується слабким ступенем прояву хвороби та всиханням групового характеру. Повнота насадження нерівномірна – наявні вікна малих та середніх розмірів. Крони дерев ажурні (III (дуже ослаблені) та особливо IV (відмираючі) категорій стану), приріст знижений, відпад глищі більше норми. Дерев IV категорії стану (відмираючі) характеризуються окрім ажурності сильного ступеня зміною забарвлення глищі до світлих або бурих тонів, всиханням до 2/3 крони. Також характеризуються поширенням стовбурових шкідників (комплексу родин лубоїдів). Під деревами спостерігаються «стрижені» пагони зеленого кольору внаслідок додаткового живлення соснових лубоїдів в кількості від 1 шт. до 2 шт. на 1 квадратний метр.

В даних насадженнях має місце нахил стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, дерев, які зависли на поруч ростучі дерева внаслідок шквальних поривів вітру в попередні роки, та дерев природного відпаду. Насадження мають знижений рівень загальної стійкості, що відповідно характеризується утворенням всихаючих дерев та дерев свіжого сухостою. Спостерігається накопичення старого сухостою і сушняку різних термінів давності. Утворенню відмираючих та сухостійних дерев безумовно сприяли посухи в минулі роки, зниження рівня ґрунтових вод, екстремальні короткотривалі метеорологічні умови, тощо). Як наслідок, всі ці процеси призвели до підвищення зростання чисельності стовбурових шкідників, в першу чергу таких як: великого соснового лубоїда, синьої соснової златки, тощо.

ВИСНОВОК

За результатами виконаного обстеження, з метою поліпшення санітарно стану насаджень ДП «Словечанський лісгосп АПК», покращення лісопатологічної ситуації та попередження поширення комплексу стовбурових шкідників, комісія визначила ділянки лісу на загальній площі **34,4 га**, що потребують вибіркової санітарної рубки (ВСР) на 2025 рік, зокрема:

Слобідське лісництво

У кв.62 вид.48 на загальній площі 5,3 га, з інтенсивністю 5 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.62 вид.71 на загальній площі 4,2 га, з інтенсивністю 5 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

Рокитнянське лісництво

У кв.27 вид.4 на загальній площі 2,5 га, з інтенсивністю 15 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.31 вид.35 на загальній площі 2,9 га, з інтенсивністю 10 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.46 вид.8 на загальній площі 0,8 га, з інтенсивністю 40 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.46 вид.9 на загальній площі 1,0 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.67 вид.56 на загальній площі 2,0 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.70 вид.17 на загальній площі 13,1 га, з інтенсивністю 10 м3/гектар. Причина пошкодження: коренева губка.

Перебродське лісництво

У кв.37 вид.1 на загальній площі 2,6 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, верхівковий короїд, синя соснова златка.

Всього обстежена площа по даному підприємству складає **34,4** гектарів.

Проведення ВСР не призведе до зменшення повноти нижче встановленого показника, визначеного в пункті 27 Санітарних правил в лісах України.

Примітка: відбір дерев до рубки, геодезична зйомка частин таксаційних виділів, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проводилась силами лісової охорони ДП «Словечанський лісгосп АПК».

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ВСР провести в 2025 році згідно пунктів 2-6,9,12,14,17,19,23,26 Санітарних правил в лісах України з використанням найефективніших методів і технологій запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища.

З метою оздоровлення та запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень, рубки провести в максимально стислі терміни з одночасним знищенням порубкових залишків. Оптимальний термін проведення ВСР – IV квартал 2025 року.


Лісовій охороні підприємства вести постійний лісопатологічний моніторинг за санітарним станом насаджень, своєчасно виявляти осередки прояву і поширення шкідників та хвороб.

Даним обстеженням нових осередків первинних шкідників та хвороб лісу не виявлено.

Осередків карантинних шкідників та хвороб дерев не виявлено. Рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, при обстеженні також не виявлено.


Підписи членів комісії:

Провідний інженер-лісопатолог
ДСЛП «Київлісозахист»




Юрій ДВОРАКІВСЬКИЙ

Головний лісничий
ДП «Словечанський лісгосп АПК»




Михайло ЛІНКЕВИЧ

Лісничий
Слобідського лісництва




Василь ГРИБ

Лісничий
Рокитнянського лісництва



Андрій ВИШНЕВСЬКИЙ

Лісничий
Перебродського лісництва



Сергій КИКЛА