

А К Т

обстеження насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок в насадженнях філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Рахівського надлісництва

08 жовтня 2025 року

сmt. Ясіня

Нами, заступником начальника відділу лісового та мисливського господарства у Закарпатській області ЗМРУЛМГ Романом СОБОЛІВСЬКИМ, головним спеціалістом ЗМРУЛМГ відділу лісового та мисливського господарства у Закарпатській області Юрієм ЦАЛАНОМ та, заступником селищного голови Ясінянської селищної ради Сергієм ТИМОЩЕНКОМ, начальником Закарпатського опорного лісопатологічного пункту ДСЛП „Львівлісозахист” Олександром ГАЙЧЕНЯМ, за участю лісного Лопушанського лісництва Михайло ЩЕРБЮКА, лісного Лазещинського лісництва Євгена ЗЕЛІНСЬКОГО, лісного Довжанського лісництва Михайло КУВІКА, лісного Чорнотисянського лісництва Володимира ЗЕЛІНСЬКОГО, лісного Станиславського лісництва Степана ЦУПЕРЯКА, лісного Квасівського лісництва Степана ДУДЧУКА проведено комісійне обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них суцільних санітарних рубок.

Матеріали відведення і таксації лісосік наведені згідно даних наданих працівниками філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.

Лазещинське лісництво

Квартал 7, виділ 17, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: квартал 7, виділ 17, площа 24,0 га, склад 10Яле, вік 82 роки, повнота 0,65, бонітет 1а, середня висота 28 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 490 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 61 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 23, площа відведена в рубку 0,4 га.

Таксаційна характеристика: квартал 8, виділ 23, площа 6,3 га, склад 10Яле, вік 87 років, повнота 0,55, бонітет 1а, середня висота 30 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 470 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 67 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 24.1, площа відведена в рубку 0,4 га.

Таксаційна характеристика: квартал 8, виділ 24, площа 8,2 га, склад 9Яле1Яцб, вік 65 років, повнота 0,90, бонітет 1, середня висота 27 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 690 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 60 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 27, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: квартал 8, виділ 27, площа 8,8 га, склад 10Яле, вік 45 років, повнота 0,80, бонітет 1б, середня висота 23 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 500 м³.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 52 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 41, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 10, виділ 41, площа 13,0 га, склад 10Яле вік 65 років, повнота 0,55, бонітет 1а, середня висота 27 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 490 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна,

укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 57 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 37.1, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: квартал 10, виділ 37, площа 16,0 га, склад 8Яле2Яцб+Яв+Бкл, вік 43 роки, повнота 0,75, бонітет 1б, середня висота 23 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 430 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 44 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квасівське лісництво

Квартал 17, виділ 11.2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 17, виділ 11, площа 16,0 га, склад 9Яле1Бкл+Яв, вік 63 роки, повнота 0,80, бонітет 1б, середня висота 29 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 660 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 64 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 33.1, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика: квартал 19, виділ 33, площа 11,0 га, склад 6Яле3Бкл1Яв, вік 71 рік, повнота 0,70, бонітет 1б, середня висота 30 м, середній діаметр 40 см, запас на 1 га 450 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 69 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 21.4, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 25, виділ 21, площа 20,0 га, склад 7Бкл2Яцб1Яле+Яз+Яв, вік 46 років, повнота 0,80, бонітет 1, середня висота 18 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 300 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 63 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Довжанське лісництво

Квартал 1, виділ 38.1, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: квартал 1, виділ 38, площа 3,9 га, склад 9Яле1Яцб, вік 62 роки, повнота 0,60, бонітет 1а, середня висота 26 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 420 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 83 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 12, виділ 8, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: квартал 12, виділ 8, площа 12,0 га, склад 10Яле, вік 45 років, повнота 0,80, бонітет 1б, середня висота 22 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 490 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 82 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 43, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика: квартал 10, виділ 43, площа 4,4 га, склад 10Яле+Бкл+Яв, вік 43 роки, повнота 0,80, бонітет 16, середня висота 21 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 440 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 84 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 52.1, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: квартал 10, виділ 52, площа 19,3 га, склад 10Яле, вік 82 роки, повнота 0,60, бонітет 1а, середня висота 29 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 520 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 84 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 35, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: квартал 4, виділ 35, площа 6,5 га, склад 10Яле+Бкл+Яцб, вік 62 роки, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 26 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 580 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 91 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 40, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: квартал 4, виділ 40, площа 6,7 га, склад 8Яле2Бкл+Яцб, вік 62 роки, повнота 0,70, бонітет 1б, середня висота 27 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 470 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 91 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 33, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: квартал 5, виділ 33, площа 3,9 га, склад 10Яле+Бкл+Яцб, вік 53 роки, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 23 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 500 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 91 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Лопушанське лісництво

Квартал 2, виділ 12, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: квартал 2, виділ 12, площа 7,8 га, склад 10Яле, вік 77 років, повнота 0,70, бонітет 1а, середня висота 29 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 590 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній, поодинокі наявні дерева уражені раком ялиці. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 51 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 22, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 7, виділ 22, площа 6,0 га, склад 10Яле, вік 52 роки, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 22 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 470 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 63 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 24, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: квартал 7, виділ 24, площа 4,9 га, склад 10Яле, вік 52 роки, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 22 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 470 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 69 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 3, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 9, виділ 3, площа 17,0 га, склад 9Яле1Бкл, вік 54 роки, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 23 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 480 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 58 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 11, виділ 36, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика: квартал 11, виділ 36, площа 9,9 га, склад 8Яле2Яцб+Бкл, вік 67 років, повнота 0,85, бонітет 1а, середня висота 26 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 620 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 52 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 6, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 15, виділ 6, площа 32,3 га, склад 8Яле1Яцб1Бкл, вік 57 років, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 24 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 510 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 55 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Станиславське лісництво

Квартал 15, виділ 22, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: квартал 15, виділ 22, площа 5,4 га, склад 9Яле1Яв, вік 55 років, повнота 0,80, бонітет 16, середня висота 26 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 520 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 60 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 17, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 17, виділ 17, площа 9,7 га, склад 8Яле2Бкл вік 36 років, повнота 0,75, бонітет 16, середня висота 18 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 290 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 58 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 18, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 4, виділ 18, площа 8,8 га, склад 10Яле+Бкл, вік 60 років, повнота 0,75, бонітет 1а, середня висота 26 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 540 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 64 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 40.2, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: квартал 6, виділ. 40, площа 15,0 га, склад 10Яле, вік 112 років, повнота 0,60, бонітет 1, середня висота 30 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 530 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 68 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Чорнотисянське лісництво

Квартал 3, виділ 50, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика: квартал 3, виділ 50, площа 1,9 га, склад 10Яле, вік 42 роки, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 19 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 400 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 78 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 3, виділ 49, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика: квартал 3, виділ 49, площа 4,8 га, склад 10Яле, вік 50 років, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 22 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 460 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 75 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 22, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: квартал 5, виділ 22, площа 16,1 га, склад 9Яле1Яв, вік 67 років, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 27 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 600 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 65 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 16, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: квартал 5, виділ 16, площа 7,1 га, склад 10Яле, вік 67 років, повнота 0,90, бонітет 1а, середня висота 26 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 670 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 60 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 41, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: квартал 4, виділ 41, площа 6,3 га, склад 10Яле+Яв, вік 67 років, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 26 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 650 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 58 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини, керуючись «СПЛУ» вважаємо за доцільне провести суцільні санітарні рубки на загальній площі 23,0 га; загальною кубомасою 11363 м³ в т. ч. ліквідної – 9306 м³, ділової – 5873 м³;

Лазешинське лісництво

Кв. 7, виділ 17, площа 0,6 га 175 м³, в т. ч. ліквідної – 142 м³, ділової – 82 м³;
Кв. 8, виділ 23, площа 0,4 га 166 м³, в т. ч. ліквідної – 130 м³, ділової – 85 м³;
Кв. 8, виділ 24.1, площа 0,4 га 125 м³, в т. ч. ліквідної – 94 м³, ділової – 64 м³;
Кв. 8, виділ 27, площа 0,7 га 251 м³, в т. ч. ліквідної – 213 м³, ділової – 124 м³;
Кв. 10, виділ 41, площа 1,0 га 329 м³, в т. ч. ліквідної – 250 м³, ділової – 125 м³;
Кв. 10, виділ 37.1, площа 0,8 га 151 м³, в т. ч. ліквідної – 134 м³, ділової – 58 м³;

Квасівське лісництво

Кв. 17, виділ 11.2, площа 1,0 га 715 м³, в т. ч. ліквідної – 603 м³, ділової – 424 м³;
Кв. 19, виділ 33.1, площа 0,5 га 294 м³, в т. ч. ліквідної – 250 м³, ділової – 57 м³;
Кв. 25, виділ 21.4, площа 1,0 га 623 м³, в т. ч. ліквідної – 552 м³, ділової – 365 м³;

Довжанське лісництво

Кв. 1, вид. 38.1, площа 0,8 га 394 м³, в т. ч. ліквідної – 315 м³, ділової – 227 м³;
Кв. 12, вид. 8, площа 0,7 га 240 м³, в т. ч. ліквідної – 188 м³, ділової – 129 м³;
Кв. 10, вид. 43, площа 0,5 га 165 м³, в т. ч. ліквідної – 134 м³, ділової – 97 м³;
Кв. 10, вид. 52.1, площа 0,9 га 431 м³, в т. ч. ліквідної – 336 м³, ділової – 275 м³;
Кв. 4, вид. 35, площа 0,6 га 354 м³, в т. ч. ліквідної – 251 м³, ділової – 177 м³;
Кв. 4, вид. 40, площа 0,8 га 478 м³, в т. ч. ліквідної – 362 м³, ділової – 253 м³;
Кв. 5, вид. 33, площа 0,7 га 340 м³, в т. ч. ліквідної – 261 м³, ділової – 190 м³;

Лопушанське лісництво

Кв. 2, вид. 12, площа 0,6 га 220 м³, в т. ч. ліквідної – 176 м³, ділової – 128 м³;
Кв. 7, вид. 22, площа 1 га 340 м³, в т. ч. ліквідної – 260 м³, ділової – 104 м³;
Кв. 7, вид. 24, площа 0,9 га 113 м³, в т. ч. ліквідної – 71 м³, ділової – 33 м³;
Кв. 9, вид. 3, площа 1,0 га 427 м³, в т. ч. ліквідної – 318 м³, ділової – 191 м³;
Кв. 11, вид. 36, площа 0,5 га 421 м³, в т. ч. ліквідної – 349 м³, ділової – 227 м³;
Кв. 15, вид. 6, площа 1,0 га 536 м³, в т. ч. ліквідної – 440 м³, ділової – 316 м³;

Станиславське лісництво

Кв. 15, вид. 22, площа 0,7 га 497 м³, в т. ч. ліквідної – 390 м³, ділової – 231 м³;
Кв.л 17, вид. 17, площа 1,0 га 520 м³, в т. ч. ліквідної – 471 м³, ділової – 232 м³;
Кв. 4, вид. 18, площа 1,0 га 617 м³, в т. ч. ліквідної – 546 м³, ділової – 403 м³;
Кв. 6, вид. 40.2, площа 0,7 га 583 м³, в т. ч. ліквідної – 495 м³, ділової – 323 м³;

Чорнотисянське лісництво

Кв. 3, вид. 50, площа 0,3 га 182 м³, в т. ч. ліквідної – 157 м³, ділової – 98 м³;
Кв. 3, вид. 49, площа 0,3 га 181 м³, в т. ч. ліквідної – 144 м³, ділової – 76 м³;
Кв. 5, вид. 22, площа 0,8 га 481 м³, в т. ч. ліквідної – 436 м³, ділової – 236 м³;


Кв. 5, вид. 16, площа 0,9 га 383 м³, в т. ч. ліквідної – 321 м³, ділової – 175 м³
Кв. 4, вид. 41, площа 0,9 га 631 м³, в т. ч. ліквідної – 517 м³, ділової – 368 м³

1. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.
2. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.
3. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:


1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.
3. План відведених в рубку ділянок.

Заступник начальника відділу лісового
та мисливського господарства
у Закарпатській області ЗМРУЛМГ



Роман СОБОЛІВСЬКИЙ

Головний спеціаліст ЗМРУЛМГ,
відділу лісового та мисливського
господарства у Закарпатській області



Юрій ЦАЛАН

Заступник селищного голови
Ясінянської селищної ради



Сергій ТИМОЩЕНКО

Начальник відділу Закарпатського
ОЛП ДСЛП „Львівлісозахист”



Олександр ГАЙЧЕНЯ

Лісничий Лопушанського лісництва




Михайло ЩЕРБЮК

Лісничий Лазещинського лісництва



Євген ЗЕЛІНСЬКИЙ

Лісничий Довжанського лісництва




Михайло КУВІК

Лісничий Чорнотисянського лісництва



Володимир ЗЕЛІНСЬКИЙ

Лісничий Станиславського лісництва



Степан ЦУПЕРЯК

Лісничий Квасівського лісництва



Степан ДУДЧУК