

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркового санітарних рубок
в насадженнях відокремленого структурного підрозділу «Закарпатський
лісотехнічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету
України»

08 травня 2025 року

м. Хуст

Нами, інженером-лісопатологом Закарпатського ОЛПП ДСЛП
„Львівлісозахист” Олегом СТЕБЕЛЕЦЬКИМ, в присутності заступника директора
з навчально-виробничої роботи «Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж
Національного лісотехнічного університету України» Юрія ГОБАНА, за участю
лісничого Липчанського навчально-виробничого лісництва Василя ГОБАНА,
інженера лісу Липчанського навчально-виробничого лісництва Василя ТРИКУРА,
старшого майстра лісу Юрія ГОБАНА, з 05.05. по 09.05. 2025 року, проведено
лісопатологічне обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них
заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркового санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з
уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарних
рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою
визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових
насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають
обов'язковому вирубуванню згідно вимог „Санітарних правил в лісах України”
(далі – СІПУ).

Лісопатологічний журнал додається, таксаційна характеристика насаджень
взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в
них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок
проведено на загальній площі 35,5 га.

Липчанське НВЛ

Квартал 3, виділ 19.1, площа 5,9 га.

Насадження пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями,
трутовиками, що призвело до всихання та відмирання дерев. Викликаються вони
переважно трутовими базидіальними грибами і рідше сумчастими. В уражених
дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.
Плодові тіла найчастіше виростають у місцях обламаних гілок, тобто там, де
відбулося зараження і почався розвиток грибниці. Наявні дерева із зламаними
стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірково
санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 35.1, площа 5,1 га.

Насадження пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями,
трутовиками, що призвело до всихання та відмирання дерев. Викликаються вони
переважно трутовими базидіальними грибами і рідше сумчастими. В уражених
дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Плодові тіла найчастіше виростають у місцях обламаних гілок, тобто там, де відбулося зараження і почався розвиток грибниці. Також пошкоджене стовбуровими шкідниками. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою та нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 11.2, площа 4,6 га.

Насадження пошкоджене стовбуровими та кореновими гнилями, трутовиками, що призвело до всихання та відмирання дерев. Викликаються вони переважно трутовими базидіальними грибами і рідше сумчастими. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Плодові тіла найчастіше виростають у місцях обламаних гілок, тобто там, де відбулося зараження і почався розвиток грибниці. Наявні дерева із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 21.1, площа 3,6 га.

Насадження пошкоджене стовбуровими та кореновими гнилями, трутовиками, що призвело до всихання та відмирання дерев. Викликаються вони переважно трутовими базидіальними грибами і рідше сумчастими. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Плодові тіла найчастіше виростають у місцях обламаних гілок, тобто там, де відбулося зараження і почався розвиток грибниці. Наявні дерева із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 15.1, площа 3,0 га.

Насадження пошкоджене стовбуровими та кореновими гнилями, трутовиками, що призвело до всихання та відмирання дерев. Викликаються вони переважно трутовими базидіальними грибами і рідше сумчастими. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Плодові тіла найчастіше виростають у місцях обламаних гілок, тобто там, де відбулося зараження і почався розвиток грибниці. Наявні дерева із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 33, виділ 12.2, площа 4,0 га.

Насадження пошкоджене стовбуровими та кореновими гнилями, трутовиками, пожежою минулих років, що призвело до всихання та відмирання дерев. Викликаються вони переважно трутовими базидіальними грибами і рідше сумчастими. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Плодові тіла найчастіше виростають у місцях обламаних гілок,

тобто там, де відбулося зараження і почався розвиток грибниці. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені. Наявні дерева із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 37, виділ 1.2, площа 9,3 га.

Насадження пошкоджене вітром (вітровал, вітролом). Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою. Окремі дерева уражені стовбуровими та кореновими гнилями, трутовиками, що призводить до всихання та відмирання дерев.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі 35,5 га, при цьому виявлено:

Вітровал, вітролом – 9,3 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 9,3 га;

Стовбурові гнилі – 26,2 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 22,2 га;
- середня ступінь пошкодження – 4,0 га;

2. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних гнилей, втрати технічної якості деревини провести вибіркові санітарні рубки на площі 35,5 га.

3. Відведення дерев в рубку проведено з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

Інженер-лісопатолог
Закарпатський ОЛПП
ДСЛП „Львівлісозахист”

Олег СТЕБЕЛЕЦЬКИЙ

Заступник директора з навчально-виробничої роботи
ВСП „ЗЛФК НЛТУ України”

Юрій ГОБАН

Лісничий Липчанського навчально-виробничого лісництва

Василь ГОБАН

Інженер лісу Липчанського навчально-виробничого лісництва

Василь ТРИКУР

Старший майстер лісу

Юрій ГОБАН