

АКТ

лісопатологічного обстеження окремих насаджень дочірнього підприємства «Оратівський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» для призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів

15.10.2025

селище Оратів

На звернення Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» (далі – ВОКСЛП «Віноблагроліс»), лист від 03.10.2025 № 487, згідно з п.п.3,4,5,13 Санітарних правил в лісах України затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555, комісією в складі: т.в.о директора державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі -ДСЛП «Київлісозахист») Сергія СОЛОХИ, головного лісопатолога державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі - ДСЛП «Київлісозахист») Валентина ГОЛИКА, інженера лісопатолога І категорії державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі - ДСЛП «Київлісозахист») Валерія ГУТНІКОВА, директора ДП «Оратівський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» Євгенія ЗАВАДЕЦЬКОГО, головного лісничого ДП «Оратівський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» Сергія БІЛОКОНЯ проведене лісопатологічне обстеження окремих насаджень, на предмет доцільності призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2026 рік.

У таблиці наведено перелік ділянок та їх коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів базового лісовпорядкування 2016 року, де відмічається погіршення санітарного стану лісових насаджень.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Площа, що потребує ВСР, гектарів	Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності
8	31	5.8	5.8	10СЗ+ЯЗ+БП	49	0.70	1	20	26	300	3

9	8	6.3	6.3	10АКБ	48	0.60	1А	20	24	160	3
22	4	11.5	11.5	4ДЗЗЛПДІЯЗІГЗІОС+БП	63	0.70	1	23	28	290	3
27	23	3.5	3.5	5СЗ2БП2ДЧР1ЧШ	46	0.70	1А	19	26	190	3
30	20	0.5	0.5	7СЗ1ДЗ1ЯЗ1ГЗ	53	0.70	1	21	32	230	3
32	5	2.1	2.1	10СЗ+ЯВ	51	0.70	1А	21	26	340	3
34	32	6.6	6.6	9АКБ1КЛГ	56	0.60	1А	23	28	190	3
35	5	7.5	7.5	8АКБ2ЯЗ+КЛГ+ВЛГІ	53	0.70	1А	23	26	220	3
35	6	2.2	2.2	10АКБ	48	0.70	1А	21	24	190	3
41	3	3.5	3.5	5ДЧР2ДЗ1ЯВ2КЛГ	44	0.85	1А	20	32	210	3
41	7	1.3	1.3	10СЗ	44	0.50	1	17	26	185	3
43	1	3.6	3.6	10СЗ+БП	46	0.80	1А	19	26	310	3
43	13	3.5	3.5	7ДЗ1ЯЗ2ГЗ+КЛГ	105	0.60	2	25	36	240	3
44	1	0.7	0.7	10СЗ	48	0.60	1	19	28	220	3
44	3	9.5	9.5	10СЗ+КЛГ	49	0.70	1	20	26	290	3
44	4	7.0	7.0	10СЗ	48	0.70	2	17	26	230	3
47	2	35.0	4.1	5ЯЗЗГЗ1КЛГ1ЛПД+ДЗ+ЧШ	81	0.70	1А	29	32	300	3
47	2(5)	35.0	17.9	5ЯЗЗГЗ1КЛГ1ЛПД+ДЗ+ЧШ	81	0.70	1А	29	32	300	3
49	7	3.3	3.3	6СЗ2БП2АКБ	51	0.70	1А	21	28	240	3
49	8	0.4	0.4	10СЗ	53	0.60	1А	23	28	300	3
52	6	4.0	4.0	4ЯЗЗЛПДЗГЗ+ДЗ+БП+ЧШ	61	0.85	1	26	28	320	3
52	7	4.0	4.0	4ДЗ2ЯЗЗГЗ1ЛПД	58	0.85	1	22	24	270	3
52	8	10.5	10.5	4ЯЗ1ДЗ1БП1ЛПДЗГЗ+КЛГ+ЧШ	71	0.70	1А	27	32	260	3
52	19	8.0	8.0	5ГЗ2ДЗ2ЯЗ1ЛПД+КЛГ	61	0.70	2	23	24	290	3
52	20	0.9	0.9	5ГЗ2ДЗ2ЧШ1ЯЗ+БП	66	0.70	2	22	24	260	3
52	21	0.8	0.8	10ЯЗ+ЛПД	48	0.70	1В	27	28	340	3
53	1	6.2	6.2	4ДЧР3АКБ1ДЗ1ЯЗ1ЛПД	53	0.70	1А	22	28	250	3
53	4	1.5	1.5	4ДЧР4СЗ1ДЗ1АКБ	43	0.70	1А	20	26	220	3
55	11	2.5	2.5	10ДЗ+ЯЗ	98	0.70	3	23	32	290	3
55	19	1.1	1.1	10ДЗ	113	0.70	3	24	32	310	3
55	20	1.2	1.2	10ДЗ	98	0.60	3	23	30	255	3
62	5	4.4	4.4	6СЗ2ДЗ1КЛГ1ЛПД	51	0.70	1А	21	30	255	3
62	10	6.0	6.0	4ДЗ4ЛПД1ЯЗ1ЧШ+ОС	58	0.80	1	20	24	265	3
65	17	0.8	0.8	8СЗ2АКБ	50	0.70	1	20	28	250	3
65	18	2.6	2.6	10СЗ	43	0.70	1	18	26	240	3
65	20	0.7	0.7	8СЗ2АКБ	43	0.70	1	18	24	210	3
72	13	6.0	6.0	8ГЗ1ЯЗ1ЛПД+ДЗ	86	0.70	3	22	26	260	3
Разом ВСР		162.0									

Дерева осіли внаслідок стовбурами та гілками, що спричинили внаслідок
 пошкодження осінового трутовика *Родіція* *Родіція*.
 Для поліпшення санітарного стану лісу необхідно провести
 вибіркової санітарної рубки на площі 11,5 га з використанням запасу деревини,
 що підлягає вирубуванню, 25 куб. метрів на
 квартал 27, вибір 23, загальна площа вибірки 3,5 га, головна порода
 сосна значна *Pinus sylvestris*, береза *Betula*
pendula Roth., дуб черешковий *Quercus*
 У дерезі сосни значної частини лісу, що підлягає вирубуванню.
 Переважна частина IV-VI класу, що підлягає вирубуванню великим
Tomicus piniperda та малим *Tomicus* *piniperda* та малим *Tomicus* *piniperda*.

РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ:

Квартал 8 , виділ 31, загальна площа виділу 5,8 га, головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris* L., в складі є ясен звичайний *Fraxinus excelsior* L. та берест *Ulmus minor* Mill., береза повисла *Betula pendula* Roth.

У дерев сосни звичайної відмічено групове та поодинокі відмирання. Переважна частина IV-VI категорії стану мають ознаки пошкодження великим *Tomicus piniperda* та малим *Tomicus minor* L. сосновими лубоїдами.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 5,8 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 30 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 9 , виділ 8, загальна площа виділу 6,3 га, головна порода акація біла *Robinia pseudoacacia*.

Виявлено поодинокі та групове відмирання дерев акації. Переважна частина дерев акації білої IV-VI категорії стану вражені несправжнім трутовиком *Phellinus igniarius*, та вражені зеленою вузькотілою златкою *Agrilus viridis*.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 6,3 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 15 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 22 , виділ 4, загальна площа виділу 11,5 га, головна порода дуб звичайний *Quercus robur* L., в складі є липа дрібнолиста *Tilia cordata* Mill., ясен звичайний *Fraxinus excelsior* L., граб звичайний *Carpinus betulus* L., осика *Populus tremula* L., та береза повисла *Betula pendula* Roth.

Переважна частина дерев дуба звичайного IV-VI категорії стану, вражені стовбуровими гнилями, підтвердженням є плодове тіла несправжнього дубового трутовика *Phellinus robustus*. Більшість дерев мають ознаки відпрацювання ксилофагами з родин Вусачів *Gerambycidae* (під корою присутні типові личинкові ходи, на стовбурі - вилітні отвори імаго).

Дерева липи дрібнолистої IV-VI категорії стану вражені грибковою інфекцією, яку викликає гриб справжній трутовик *Fomes fomentarius* Gill. На деревах виявлені плодове тіла даного гриба.

Дерева осики вражені стовбуровими гнилями, що спричинені враженням несправжнього осикового трутовика *Phellinus tremulae*.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 11,5 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 25 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 27 , виділ 23, загальна площа виділу 3,5 га, головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris* L., в складі є береза повисла *Betula pendula* Roth., дуб червоний *Quercus rubra*, черешня *Prunus avium*.

У дерев сосни звичайної відмічено групове та поодинокі відмирання. Переважна частина IV-VI категорії стану мають ознаки пошкодження великим *Tomicus piniperda* та малим *Tomicus minor* L. сосновими лубоїдами.

На поодиноких деревах дуба червоного, берези повислої є плодові тіла несправжнього трутовика *Phellinus igniarius*.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 3,5 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 10 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 30 , виділ 20, загальна площа виділу 0,5 га, головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris* L., в складі є дуб звичайний *Quercus robur* L., ясен звичайний *Fraxinus excelsior* L., граб звичайний *Carpinus betulus* L.

У дерев сосни звичайної відмічено групове та поодинокі відмирання. Переважна частина IV-VI категорії стану мають ознаки пошкодження великим *Tomicus piniperda* та малим *Tomicus minor* L. сосновими лубоїдами.

На поодиноких деревах дуба звичайного, граба звичайного є плодові тіла несправжнього трутовика *Phellinus igniarius*.

В насаджені відмічене відмирання окремих гілок з подальшим усиханням дерев ясена звичайного. Відмирання дерев ясена звичайного зумовлене враженням халаровим некрозом, збудником якого є *Hymenoscyphus fraxineus*.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 0,5 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 20 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 32 , виділ 5, загальна площа виділу 2,1 га, головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris* L., в складі є явір *Acer pseudoplatanus*.

У дерев сосни звичайної відмічено групове та поодинокі відмирання. Переважна частина IV-VI категорії стану мають ознаки пошкодження великим *Tomicus piniperda* та малим *Tomicus minor* L. сосновими лубоїдами.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 2,1 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 30 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 34 , виділ 32, загальна площа виділу 6,6 га, головна порода акація біла *Robinia pseudoacacia*., в складі є клен гостролистий *Acer platanus* L.

Виявлено поодинокі та групове відмирання дерев акації. Переважна частина дерев акації білої IV-VI категорії стану вражені несправжнім трутовиком *Phellinus igniarius*, та вражені зеленою вузькотілою златкою *Agilus viridis*.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 6,6 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 10 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 35 , виділ 5, загальна площа виділу 7,5 га, головна порода акація біла *Robinia pseudoacacia*., в складі є ясен звичайний *Fraxinus excelsior* L., клен гостролистий *Acer platanus* L., вільха чорна *Alnus glutinosa* (L.) Gaerth.

Виявлено поодинокі та групове відмирання дерев акації. Переважна частина дерев акації білої IV-VI категорії стану вражені несправжнім трутовиком *Phellinus igniarius*, та вражені зеленою вузькотілою златкою *Agilus viridis*.

В насаджені відмічене відмирання окремих гілок з подальшим усиханням дерев ясена звичайного. Відмирання дерев ясена звичайного зумовлене враженням халаровим некрозом, збудником якого є *Hymenoscyphus fraxineus*.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 7,5 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 20 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 35 , виділ 6, загальна площа виділу 2,2 га, головна порода акація біла *Robinia pseudoacacia*., в складі є ясен звичайний *Fraxinus excelsior* L., клен гостролистий *Acer platanus* L., вільха чорна *Alnus glutinosa* (L.) Gaerth.

Виявлено поодинокі та групові відмирання дерев акації. Переважна частина дерев акації білої IV-VI категорії стану вражені несправжнім трутовиком *Phellinus igniarius*, та вражені зеленою вузькотілою златкою *Agrilus viridis*.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 2,2 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 20 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 41 , виділ 3, загальна площа виділу 3,5 га, головна порода дуб червоний *Quercus rubra*., в складі є дуб звичайний *Quercus robur* L., явір *Acer pseudoplatanus*., клен гостролистий *Acer platanus* L.

Переважна частина дерев дуба червоного та дуба звичайного IV-VI категорії стану, вражені стовбуровими гнилями, підтвердженням є плоді тіла несправжнього дубового трутовика *Phellinus robustus*. Більшість дерев мають ознаки відпрацювання ксилофагами з родин Вусачів *Gerambycidae* (під корою присутні типові личинкові ходи, на стовбурі - вилітні отвори імаго).

Дерева клена гостролистого та явора IV-VI категорії стану вражені грибовою інфекцією, яку викликає гриб справжній трутовик *Fomes fomentarius* Gill. На деревах виявлені плоді тіла даного гриба.

Ділянка базовим лісовпорядкуванням призначена у прохідну рубку. Згідно п. 18 «Правил поліпшення якісного складу лісів, проведення інших рубок та робіт, пов'язаних і не пов'язаних із веденням лісового господарства» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 року № 724 під час рубок догляду вилучаються також сухостійні, фаутні дерева та ліквідація захаращеності. Для поліпшення якісного та санітарного стану доцільно на ділянці провести прохідну рубку на площі 3,5 гектарів.

Квартал 41 , виділ 7, загальна площа виділу 1,3 га, головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris* L.

У дерев сосни звичайної відмічено групові та поодинокі відмирання. Переважна частина IV-VI категорії стану мають ознаки пошкодження великим *Tomicus piniperda* та малим *Tomicus minor* L. сосновими лубоїдами.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 1,3 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 10 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 43 , виділ 1, загальна площа виділу 3,6 га, головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris* L., в складі є береза повисла *Betula pendula* Roth.

У дерев сосни звичайної відмічено групове та поодинокі відмирання. Переважна частина IV-VI категорії стану мають ознаки пошкодження великим *Tomicus piniperda* та малим *Tomicus minor* L. сосновими лубоїдами.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 3,6 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 25 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 43 , виділ 13, загальна площа виділу 3,5 га, головна порода дуб звичайний *Quercus robur* L., ясен звичайний *Fraxinus excelsior* L., в складі є граб звичайний *Carpinus betulus* L., клен гостролистий *Acer platanus* L.

Переважна частина дерев дуба звичайного IV-VI категорії стану, вражені стовбуровими гнилями, підтвердженням є плодове тіла несправжнього дубового трутовика *Phellinus robustus*. Більшість дерев мають ознаки відпрацювання ксилофагами з родин Вусачів *Gerambycidae* (під корою присутні типові личинкові ходи, на стовбурі - вилітні отвори імаго).

Відмічене поодинокі відмирання дерев ясена звичайного. Відмирання дерев ясена звичайного зумовлене враженням халаровим некрозом, збудником якого є *Hymenoscyphus fraxineus*.

Дерева клена гостролистого IV-VI категорії стану вражені грибковою інфекцією, яку викликає гриб справжній трутовик *Fomes fomentarius* Gill. На деревах виявлені плодове тіла даного гриба.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 3,5 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 15 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 44 , виділ 1, загальна площа виділу 0,7 га, головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris* L.

У дерев сосни звичайної відмічено поодинокі відмирання. Переважна частина IV-VI категорії стану мають ознаки пошкодження великим *Tomicus piniperda* та малим *Tomicus minor* L. сосновими лубоїдами.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 0,7 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 10 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 44 , виділ 3, загальна площа виділу 9,5 га, головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris* L., в складі є клен гостролистий *Acer platanus* L. У дерев сосни звичайної відмічено групове та поодинокі відмирання. Переважна частина IV-VI категорії стану мають ознаки пошкодження великим *Tomicus piniperda* та малим *Tomicus minor* L. сосновими лубоїдами.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 9,5 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 30 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 44 , виділ 4, загальна площа виділу 7,0 га, головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris* L.

У дерев сосни звичайної відмічено поодинокі відмирання. Переважна частина IV-VI категорії стану мають ознаки пошкодження великим *Tomicus piniperda* та малим *Tomicus minor* L. сосновими лубоїдами.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 7,0 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 20 куб.метрів на 1 гектар.

Квартал 47 , виділ 2, загальна площа виділу 35,0 га, головна порода ясен звичайний *Fraxinus excelsior* L., в складі є граб звичайний *Carpinus betulus* L., клен гостролистий *Acer platanus* L., липа дрібнолиста *Tilia cordata* Mill., дуб звичайний *Quercus robur* L., черешня *Prunus avium*.

На ділянці площею 4,1 га та ділянці площею 17,9 га відмічене групове та поодинокі відмирання дерев ясеня звичайного. Відмирання дерев ясеня звичайного зумовлене враженням халаровим некрозом, збудником якого є *Hymenoscyphus fraxineus*.

Дерева клена гостролистого та явора IV-VI категорії стану вражені грибковою інфекцією, яку викликає гриб справжній трутовик *Fomes fomentarius* Gill. На деревах виявлені плодові тіла даного гриба.

Дерева липи дрібнолистої IV-VI категорії стану вражені грибковою інфекцією, яку викликає гриб справжній трутовик *Fomes fomentarius* Gill. На деревах виявлені плодові тіла даного гриба.

Для поліпшення санітарного стану ділянка площею 4,1 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 15 куб. метрів на 1 гектар, та ділянка площею 17,9 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 20 куб. метрів на 1 гектар, потребують проведення вибіркової санітарної рубки.

Квартал 49 , виділ 7, загальна площа виділу 3,3 га, головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris* L., в складі є береза повисла *Betula pendula* Roth., акація біла *Robinia pseudoacacia*.

У дерев сосни звичайної відмічено групове та поодинокі відмирання. Переважна частина IV-VI категорії стану мають ознаки пошкодження великим *Tomicus piniperda* та малим *Tomicus minor* L. сосновими лубоїдами.

На поодиноких деревах берези повислої, акації білої є плодові тіла несправжнього трутовика *Phellinus igniarius*.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 3,3 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 25 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 49 , виділ 8, загальна площа виділу 0,4 га, головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris* L.

У дерев сосни звичайної відмічено поодинокі відмирання. Переважна частина IV-VI категорії стану мають ознаки пошкодження великим *Tomicus piniperda* та малим *Tomicus minor* L. сосновими лубоїдами.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 0,4 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 30 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 52 , виділ 6, загальна площа виділу 4,0 га, головна порода порода ясен звичайний *Fraxinus excelsior* L., в складі є липа дрібнолиста *Tilia cordata* Mill., граб звичайний *Carpinus betulus* L., дуб звичайний *Quercus robur* L., береза повисла *Betula pendula* Roth., черешня *Prunus avium*.

Відмічене групове та поодинокі відмирання дерев ясена звичайного. Відмирання дерев ясена звичайного зумовлене враженням халаровим некрозом, збудником якого є *Hymenoscyphus fraxineus*.

Дерева липи дрібнолистої, берези повислої та граба звичайного IV-VI категорії стану вражені грибковою інфекцією, яку викликає гриб справжній трутовик *Fomes fomentarius* Gill. На деревах виявлені плодові тіла даного гриба.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 4,0 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 20 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 52 , виділ 7, загальна площа виділу 4,0 га, головна порода порода дуб звичайний *Quercus robur* L., в складі є ясен звичайний *Fraxinus excelsior* L., граб звичайний *Carpinus betulus* L., липа дрібнолиста *Tilia cordata* Mill.

Переважає частина дерев дуба звичайного IV-VI категорії стану, вражені стовбуровими гнилями, підтвердженням є плодові тіла несправжнього дубового трутовика *Phellinus robustus*.

Відмічене групове та поодинокі відмирання дерев ясена звичайного. Відмирання дерев ясена звичайного зумовлене враженням халаровим некрозом, збудником якого є *Hymenoscyphus fraxineus*.

Дерева липи дрібнолистої та граба звичайного IV-VI категорії стану вражені грибковою інфекцією, яку викликає гриб справжній трутовик *Fomes fomentarius* Gill. На деревах виявлені плодові тіла даного гриба.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 4,0 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 25 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 52 , виділ 8, загальна площа виділу 10,5 га, головна порода порода ясен звичайний *Fraxinus excelsior* L., в складі є дуб звичайний *Quercus robur* L., береза повисла *Betula pendula* Roth., липа дрібнолиста *Tilia cordata* Mill., граб звичайний *Carpinus betulus* L.

Відмічене групове та поодинокі відмирання дерев ясена звичайного. Відмирання дерев ясена звичайного зумовлене враженням халаровим некрозом, збудником якого є *Hymenoscyphus fraxineus*.

Переважає частина дерев дуба звичайного IV-VI категорії стану, вражені стовбуровими гнилями, підтвердженням є плодові тіла несправжнього дубового трутовика *Phellinus robustus*.

Дерева липи дрібнолистої, берези повислої та граба звичайного IV-VI категорії стану вражені грибковою інфекцією, яку викликає гриб справжній трутовик *Fomes fomentarius* Gill. На деревах виявлені плодові тіла даного гриба.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 10,5 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 15 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 52 , виділ 19 , загальна площа виділу 8,0 га, головна порода порода граб звичайний *Carpinus betulus* L., в складі є дуб звичайний *Quercus robur* L., ясен звичайний *Fraxinus excelsior* L., липа дрібнолиста *Tilia cordata* Mill., клен гостролистий *Acer platanus* L.

Дерева граба звичайного IV-VI категорії стану вражені грибковою інфекцією, яку викликає гриб справжній трутовик *Fomes fomentarius* Gill. На деревах виявлені плодові тіла даного гриба.

Переважна частина дерев дуба звичайного IV-VI категорії стану, вражені стовбуровими гнилями, підтвердженням є плодові тіла несправжнього дубового трутовика *Phellinus robustus*.

Відмічене групове та поодинокі відмирання дерев ясена звичайного. Відмирання дерев ясена звичайного зумовлене враженням халаровим некрозом, збудником якого є *Hymenoscyphus fraxineus*.

Дерева липи дрібнолистої, клена гостролистого IV-VI категорії стану вражені грибковою інфекцією, яку викликає гриб справжній трутовик *Fomes fomentarius* Gill. На деревах виявлені плодові тіла даного гриба.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 8,0 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 15 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 52 , виділ 20 , загальна площа виділу 0,9 га, головна порода порода граб звичайний *Carpinus betulus* L., в складі є дуб звичайний *Quercus robur* L., черешня *Prunus avium*., ясен звичайний *Fraxinus excelsior* L., береза повисла *Betula pendula* Roth.

Дерева граба звичайного IV-VI категорії стану вражені грибковою інфекцією, яку викликає гриб справжній трутовик *Fomes fomentarius* Gill. На деревах виявлені плодові тіла даного гриба.

Переважна частина дерев дуба звичайного IV-VI категорії стану, вражені стовбуровими гнилями, підтвердженням є плодові тіла несправжнього дубового трутовика *Phellinus robustus*.

Відмічене групове та поодинокі відмирання дерев ясена звичайного. Відмирання дерев ясена звичайного зумовлене враженням халаровим некрозом, збудником якого є *Hymenoscyphus fraxineus*.

На ділянці є екземпляри берези VI категорії стану вражені грибковою інфекцією, яку викликає гриб справжній трутовик *Fomes fomentarius* Gill.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 0,9 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 20 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 52 , виділ 21, загальна площа виділу 0,8 га, головна порода ясен звичайний *Fraxinus excelsior* L., в складі є липа дрібнолиста *Tilia cordata* Mill.

Відмирання дерев ясена звичайного зумовлене враженням халаровим некрозом, збудником якого є *Hymenoscyphus fraxineus*.

Дерева липи дрібнолистої IV-VI категорії стану вражені грибковою інфекцією, яку викликає гриб справжній трутовик *Fomes fomentarius* Gill. На деревах виявлені плодові тіла даного гриба.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 0,8 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 15 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 53 , виділ 1, загальна площа виділу 6,2 га, головна порода дуб червоний *Quercus rubra.*, в складі є акація біла *Robinia pseudoacacia.*, дуб звичайний *Quercus robur* L., ясен звичайний *Fraxinus excelsior* L., липа дрібнолиста *Tilia cordata* Mill.

Переважає частина дерев дуба червоного, дуба звичайного та акації білої IV-VI категорії стану, вражені стовбуровими гнилями, підтвердженням є плодове тіла несправжнього дубового трутовика *Phellinus robustus*. Більшість дерев мають ознаки відпрацювання ксилофагами з родин Вусачів *Gerambycidae* (під корою присутні типові личинкові ходи, на стовбурі - вилітні отвори імаго).

Відмирання дерев ясеня звичайного зумовлене враженням халаровим некрозом, збудником якого є *Hymenoscyphus fraxineus*.

Дерева липи дрібнолистої IV-VI категорії стану вражені грибковою інфекцією, яку викликає гриб справжній трутовик *Fomes fomentarius* Gill. На деревах виявлені плодове тіла даного гриба.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 6,2 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 20 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 53 , виділ 4, загальна площа виділу 1,5 га, головна порода дуб червоний *Quercus rubra.*, в складі є сосна звичайна *Pinus sylvestris* L., дуб звичайний *Quercus robur* L., акація біла *Robinia pseudoacacia*.

Переважає частина дерев дуба червоного, дуба звичайного та акації білої IV-VI категорії стану, вражені стовбуровими гнилями, підтвердженням є плодове тіла несправжнього дубового трутовика *Phellinus robustus*. Більшість дерев мають ознаки відпрацювання ксилофагами з родин Вусачів *Gerambycidae* (під корою присутні типові личинкові ходи, на стовбурі - вилітні отвори імаго).

У дерев сосни звичайної відмічено групове та поодинокі відмирання. Переважає частина IV-VI категорії стану мають ознаки пошкодження великим *Tomicus piniperda* та малим *Tomicus minor* L. сосновими лубоїдами.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 1,5 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 20 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 55 , виділ 11, загальна площа виділу 2,5 га, головна порода дуб червоний *Quercus rubra.*, в складі є ясен звичайний *Fraxinus excelsior* L. Переважає частина дерев дуба звичайного IV-VI категорії стану, вражені стовбуровими гнилями, підтвердженням є плодове тіла несправжнього дубового трутовика *Phellinus robustus*. Більшість дерев мають ознаки відпрацювання ксилофагами з родин Вусачів *Gerambycidae* (під корою присутні типові личинкові ходи, на стовбурі - вилітні отвори імаго).

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 2,5 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 15 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 55 , виділ 19, загальна площа виділу 1,1 га, головна порода дуб звичайний *Quercus robur* L.

Переважна частина дерев дуба звичайного IV-VI категорії стану, вражені стовбуровими гнилями, підтвердженням є плодові тіла несправжнього дубового трутовика *Phellinus robustus*. Більшість дерев мають ознаки відпрацювання ксилофагами з родин Вусачів *Gerambycidae* (під корою присутні типові личинкові ходи, на стовбурі - вилітні отвори імаго).

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 1,1 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 15 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 55, виділ 20, загальна площа виділу 1,2 га, головна порода дуб звичайний *Quercus robur* L.

Переважна частина дерев дуба звичайного IV-VI категорії стану, вражені стовбуровими гнилями, підтвердженням є плодові тіла несправжнього дубового трутовика *Phellinus robustus*. Більшість дерев мають ознаки відпрацювання ксилофагами з родин Вусачів *Gerambycidae* (під корою присутні типові личинкові ходи, на стовбурі - вилітні отвори імаго).

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 1,2 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 10 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 62, виділ 5, загальна площа виділу 4,4 га, головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris* L., в складі є дуб звичайний *Quercus robur* L., клен гостролистий *Acer platanus* L., липа дрібнолиста *Tilia cordata* Mill.

У дерев сосни звичайної відмічено групове та поодинокі відмирання. Переважна частина IV-VI категорії стану мають ознаки пошкодження великим *Tomicus piniperda* та малим *Tomicus minor* L. сосновими лубоїдами.

Дерева клена гостролистого та липи дрібнолистої IV-VI категорії стану вражені грибковою інфекцією, яку викликає гриб справжній трутовик *Fomes fomentarius* Gill. На деревах виявлені плодові тіла даного гриба.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 4,4 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 20 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 62, виділ 10, загальна площа виділу 6,0 га, головна порода дуб звичайний *Quercus robur* L., в складі є липа дрібнолиста *Tilia cordata* Mill., ясен звичайний *Fraxinus excelsior* L., черешня *Prunus avium*., осика *Populus tremula* L.

Переважна частина дерев дуба звичайного IV-VI категорії стану, вражені стовбуровими гнилями, підтвердженням є плодові тіла несправжнього дубового трутовика *Phellinus robustus*. Більшість дерев мають ознаки відпрацювання ксилофагами з родин Вусачів *Gerambycidae* (під корою присутні типові личинкові ходи, на стовбурі - вилітні отвори імаго).

Дерева липи дрібнолистої IV-VI категорії стану вражені грибковою інфекцією, яку викликає гриб справжній трутовик *Fomes fomentarius* Gill. На деревах виявлені плодові тіла даного гриба.

Дерева осики вражені стовбуровими гнилями, що спричинені враженням несправжнього осикового трутовика *Phellinus tremulae*.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 6,0 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 15 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 65 , виділ 17, загальна площа виділу 0,8 га, головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris* L., в складі є акація біла *Robinia pseudoacacia*.

У дерев сосни звичайної відмічено групове та поодинокі відмирання. Переважна частина IV-VI категорії стану мають ознаки пошкодження великим *Tomicus piniperda* та малим *Tomicus minor* L. сосновими лубоїдами.

На поодиноких деревах акації білої є плодові тіла несправжнього трутовика *Phellinus igniarius*.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 0,8 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 20 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 65 , виділ 18, загальна площа виділу 2,6 га, головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris* L.

У дерев сосни звичайної відмічено групове та поодинокі відмирання. Переважна частина IV-VI категорії стану мають ознаки пошкодження великим *Tomicus piniperda* та малим *Tomicus minor* L. сосновими лубоїдами.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 2,6 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 15 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 65 , виділ 20, загальна площа виділу 0,7 га, головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris* L., в складі є акація біла *Robinia pseudoacacia*.

У дерев сосни звичайної відмічено групове та поодинокі відмирання. Переважна частина IV-VI категорії стану мають ознаки пошкодження великим *Tomicus piniperda* та малим *Tomicus minor* L. сосновими лубоїдами.

На поодиноких деревах акації білої є плодові тіла несправжнього трутовика *Phellinus igniarius*.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 0,7 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 20 куб. метрів на 1 гектар.

Квартал 72 , виділ 13 , загальна площа виділу 6,0 га, головна порода порода граб звичайний *Carpinus betulus* L., в складі є ясен звичайний *Fraxinus excelsior* L., липа дрібнолиста *Tilia cordata* Mill дуб звичайний *Quercus robur* L.

Дерева граба звичайного IV-VI категорії стану вражені грибковою інфекцією, яку викликає гриб справжній трутовик *Fomes fomentarius* Gill. На деревах виявлені плодові тіла даного гриба.

Відмічене групове та поодинокі відмирання дерев ясен звичайного. Відмирання дерев ясен звичайного зумовлене враженням халаровим некрозом, збудником якого є *Hymenoscyphus fraxineus*.

Дерева липи дрібнолистої IV-VI категорії стану вражені грибковою інфекцією, яку викликає гриб справжній трутовик *Fomes fomentarius* Gill. На деревах виявлені плодові тіла даного гриба.

Для поліпшення санітарного стану ділянка потребує проведення вибіркової санітарної рубки на площі 6,0 га з орієнтовним запасом деревини, що підлягає вирубуванню, 15 куб. метрів на 1 гектар.

Всього обстежена площа ділянок навчально-дослідного лісового господарства складає **162,0 гектарів**.

З метою поліпшення санітарного стану лісових насаджень, недопущення подальшого формування хронічних осередків хвороб лісу комісія призначає проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів вибірково санітарну рубку (далі – ВСР) на площі **158,5 га з вибіркою від 10 до 30 м³/га** згідно «Санітарних правил в лісах України (затверджених постановою КМУ від 27 липня 1995 р. № 555.).

ВСР провести в 2026 році згідно пунктів 2,3,4,5,6,9,12,14,17,19-23,26 чинних Санітарних правил в лісах України, з використанням найефективніших методів і технологій запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища, з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників, хвороб лісу.

При проведенні призначених ВСР необхідно враховувати особливості популяцій видів стовбурових шкідників стосовно їх термінів розвитку.

За станом прилеглих насаджень необхідно вести посилений нагляд.

Нових осередків хвое та листогризучих шкідників та хвороб лісу, видів карантинних шкідників та хвороб дерев під час обстеження не виявлено.

Рослин і тварин, занесених до Червоної книги України при обстеженні не виявлено.

Акт складений у 4-х примірниках.

1й – ДСЛП «Київлісозахист»

2й – Центрально-західне МУЛМГ

3й – ДП «Оратівський райагроліс»

4й – ВОЛКСЛП «Віноблагроліс»


Підписи членів комісії:


Т.в.о директора
ДСЛП «Київлісозахист»

Головний-лісопатолог
ДСЛП «Київлісозахист»
Інженер-лісопатолог I категорії
ДСЛП «Київлісозахист»


Директор ДП «Оратівський райагроліс»
ВОКСЛП «Віноблагроліс»


Головний лісничий ДП «Оратівський
райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс»

 Сергій СОЛОХА

 Валентин ГОЛИК

Валерій ГУТНІКОВ

 Євген ЗАВАДЕЦЬКИЙ

 Сергій БЛОКОНЬ