

АКТ

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркового санітарного рубку в насадженнях Бережанського
районного державного агропромислового підприємства
«Бережанирагроліс»

30 травня 2025 року

м. Бережани

Нами, заступником директора ДСЛП „Львівлісозахист” Василем СЕНИКОМ, інженером-лісопатологом Тернопільського ОЛП ДСЛП „Львівлісозахист” Марією МАКАРОЮ, в присутності головного лісничого Бережанського ДП «Бережанирагроліс» Михайла ДУТКЕВИЧА та адміністратора електронного обліку деревини Бориса ПІДФІГУРНОГО з 19.05.2025 по 20.05.2025; 23.05.2025 та з 26.05.2025 по 30.05.2025 року, проведено лісопатологічне рекогносцирувальне обстеження лісових деревостанів ДП «Бережанирагроліс» на предмет доцільності призначення в їх межах заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркового санітарного рубку на загальній площі 359,2 га.

Лісівничо-таксаційна характеристика обстежених деревостанів наведена на підставі матеріалів лісовпорядкування від 01.01. 2011 року.

Лісопатологічне обстеження проведено рекогносцирувальним методом по ходових лініях з уточненням границь шляхом проходження по периметру ділянок з метою діагностики патологічних процесів в деревостанах, встановлення частки пошкоджених дерев, які підлягають обов'язковій вирубці згідно «Санітарних правил в лісах України» та визначенні потреби в проведенні певних видів заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

В процесі обстеження встановлено наступне:

Квартал 1 виділ 2, площа 25,0 га (в рубку 6,0 га)

Під корою сосни звичайної на мертвих деревах виявлені міцеліальна плівка та ризоморфи опенька осіннього, а також ходи технічних шкідників(лубоїдів, вусачів). Крона дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. На стовбурах сухостійних дерев сосни виявлено посиніння заболоні та деревини, що свідчить про присутність офіостомових грибів. Значна кількість дерев сосни пошкоджених вітром (вітровал, вітролом, злам вершин).

Ступінь пошкодження – середня

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 1 виділ 4, площа 6,0 га (в рубку 5,2 га)

На мертвих деревах сосни звичайної з локальним відшаруванням кори, виявлені ходи та отвори від життєдіяльності технічних шкідників(лубоїдів, вусачів). Крона дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-

зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. На стовбурах сухостійних дерев сосни виявлено посиніння заболоні та деревини, що свідчить про присутність **офіостомових грибів**. Значна кількість дерев сосни пошкоджених вітром (вітровал, вітролом, злам вершин).

Ступінь пошкодження – середня

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 1 виділ 10, площа 7,8 га

На мертвих деревах сосни звичайної з локальним відшаруванням кори, виявлені **ходи та отвори від життєдіяльності технічних шкідників**(лубоїдів, вусачів). Крона дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. На стовбурах сухостійних дерев сосни виявлено посиніння заболоні та деревини, що свідчить про присутність **офіостомових грибів**. Значна кількість дерев сосни пошкоджених вітром і має нахил стовбурів більше 30 градусів від осі дерева.

Ступінь пошкодження – середня

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 1 виділ 12, площа 8,8 га.

Крони дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена; приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. На стовбурах сухостійних дерев сосни виявлено посиніння заболоні та деревини, що свідчить про присутність **офіостомових грибів**. Частина дерев сосни пошкоджених вітром (вітровал, вітролом, злам вершин).

Вербка козяча, яка є в складі насадження, розміщена в другому ярусі сильно уражена трутовиками (наявні плодові тіла на стовбурах).

Ступінь пошкодження – слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 1 виділ 13, площа 16,5 га (рубку 8,0 га).

Крони дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена; приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. На стовбурах сухостійних дерев сосни виявлено посиніння заболоні та деревини, що свідчить про присутність **офіостомових грибів**. Частина дерев сосни пошкоджених вітром (вітровал, вітролом, злам вершин).

Ступінь пошкодження – слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 2 виділ 1, площа 9,3 га (в рубку 3,0 га).

Крони дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена; приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. На зламі дерева сосни в прикореневій його частині виявлено плодове тіло кореневої губки, а також на стовбурах сухостійних екземплярах виявлено посиніння заболоні та деревини, що свідчить про присутність **офіостомових грибів**. Частина дерев сосни пошкоджених вітром (вітровал, вітролом, злам вершин).

Ступінь пошкодження – слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 2 виділ 2, площа 4,1 га.

На мертвих деревах сосни звичайної з локальним відшаруванням кори, виявлені ходи та отвори від життєдіяльності технічних шкідників(лубоїдів, вусачів). Крони дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. На стовбурах сухостійних дерев сосни виявлено посиніння заболоні та деревини, що свідчить про присутність офіостомових грибів. Всихання сосни поодинокі та групові по всій частині виділу. Значна кількість дерев сосни пошкоджених вітром і має нахил стовбурів більше 30 градусів від осі дерева. На даному таксаційному виділі наявна значна кількість неліквідної деревини.

Крони дерев акації білої уражені омелою білою, а на стовбурах виявлені стовбурові гнилі.

Підлісок в даному виділі складається в основному з черемхи, ліщини, свидини та інших порід уражений різними хворобами (раковим утвореннями на корі, гілках та стовбурах, стовбуровими гнилями, зламами та інше.)

Ступінь пошкодження - середня

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 2 виділ 3, площа 1,6 га.

На мертвих деревах сосни звичайної з локальним відшаруванням кори, виявлені ходи та отвори від життєдіяльності технічних шкідників(лубоїдів, вусачів). Крона дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. На стовбурах сухостійних дерев сосни виявлено посиніння заболоні та деревини, що свідчить про присутність офіостомових грибів. Значна кількість дерев сосни пошкоджених вітром і має нахил стовбурів більше 30 градусів від осі дерева.

Ступінь пошкодження – слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 2 виділ 4 площа 11,0 га (в рубку 5,0 га).

На мертвих деревах сосни звичайної з локальним відшаруванням кори, виявлені ходи та отвори від життєдіяльності технічних шкідників(лубоїдів, вусачів). Крони дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена; приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. На стовбурах сухостійних дерев сосни виявлено посиніння заболоні та деревини, що свідчить про присутність офіостомових грибів. Всихання поодинокі та групові.

Ступінь пошкодження – слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 4 виділ 11 площа 4,3 га.

Груб звичайний уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено ризоморфи оценька осіннього та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука).

На деревах вільхи чорної та осики виявлено плодові тіла трутовиків, а під їхньою корою наявні ходи стовбурових шкідників.

Береза повисла з наявними дугоподібними стовбурами.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 7 виділ 5 площа 7,0 га.

Граб звичайний, порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві, а також виявлені плодові тіла несправжнього грабового трутовика.

Дерева берези повислої із підірваною кореневою системою та нахилом більше 30 градусів від осі стовбура.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 7 виділ 6 площа 4,0 га.

Граб звичайний, порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві.

На окремих деревах бука лісового наявні ракові утворення по всій висоті стовбура.

Осика уражена стовбуровими гнилями із наявним опаданням кори від стовбура.

Ступінь пошкодження — сильна

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 7 виділ 7 площа 12,0 га.

Граб звичайний уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві.

На частині дерев ялини звичайної виявлено всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. Також на частині крон дерев хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена внаслідок пошкодження верхівковим короїдом, великим та малим сосновим лубоїдом та зараження офіостомовими грибами. Частина дерев ялини вітровальна та з підірваною кореневою системою. На корінні та стовбурах (в нижній частині) вітровальних і сухостійних дерев ялини виявлені **ризоморфи опенька осіннього**.

Осика уражена трутовиками та із наявними стовбуровими гнилями та зламами стовбурів.

Ступінь пошкодження — сильна

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 7 виділ 19 площа 5,0 га (в рубку 2,8 га).

Граб звичайний, порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено ризоморфи опенька осіннього та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві.

Осика уражена трутовиками та із наявними стовбуровими гнилями та зламами стовбурів.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 9 виділ 1 площа 2,7 га.

Граб звичайний, порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено ризоморфи опенька осіннього та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві.

Береза повисла уражена трутовиками та із наявними зламами стовбурів.

Осика уражена трутовиками та із наявними стовбуровими гнилями та зламами стовбурів.

Ступінь пошкодження — сильна

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 9 виділ 11 площа 4,9 га (в рубку 2,5 га).

Граб звичайний уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено ризоморфи опенька осіннього та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві, а також виявлені водяні пагони на стовбурах дерев.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 9 виділ 12 площа 9,1 га (в рубку 5,0 га).

Граб звичайний порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено ризоморфи опенька осіннього та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві, а також виявлені плодові тіла несправжнього грабового трутовика.

На мертвих деревах сосни звичайної з локальним відшаруванням кори, виявлені ходи та отвори від життєдіяльності технічних шкідників(лубоїдів, вусачів). На стовбурах сухостійних дерев сосни виявлено посиніння заболоні та деревини, що свідчить про присутність офіостомових грибів. Всихання сосни поодинокі та групові по всій частині виділу. Значна кількість дерев сосни пошкоджених вітром і має нахил стовбурів більше 30 градусів від осі стовбура. На даному виділі наявна значна кількість неліквідної деревини.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 11 виділ 31 площа 8,4 га.

На мертвих деревах сосни звичайної з локальним відшаруванням кори, виявлені ходи та отвори від життєдіяльності технічних шкідників(лубоїдів, вусачів). Крона дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена; приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. На стовбурах сухостійних дерев сосни виявлено посиніння заболоні та деревини, що свідчить про присутність **офіостомових грибів**. Значна кількість дерев сосни пошкоджених вітром і має нахил стовбурів більше 30 градусів від осі дерева. На даному таксаційному виділі наявна значна кількість неліквідної деревини.

Ступінь пошкодження – середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 12 виділ 1, площа 6,5 га (в рубку 3,5 га).

Крони дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. На стовбурах сухостійних дерев сосни виявлено посиніння заболоні та деревини, що свідчить про присутність **офіостомових грибів**. На мертвих деревах сосни звичайної з локальним відшаруванням кори, виявлені ходи та отвори від життєдіяльності технічних шкідників(лубоїдів, вусачів). Значна кількість дерев сосни пошкоджених вітром і має нахил стовбурів більше 30 градусів від осі дерева.

Верба козяча та осика, яка є в складі насадження уражена стовбуровими гнилями з наявними плодовими тілами дереворуйнівних грибів

На даному таксаційному виділі наявна значна кількість неліквідної деревини.

Ступінь пошкодження – середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 12 виділ 3, площа 2,0 га.

Крони дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. На стовбурах сухостійних дерев сосни виявлено посиніння заболоні та деревини, що свідчить про присутність **офіостомових грибів**. На мертвих деревах сосни звичайної з локальним відшаруванням кори, виявлені ходи та отвори від життєдіяльності технічних шкідників(лубоїдів, вусачів). Значна кількість дерев сосни пошкоджених вітром і має нахил стовбурів більше 30 градусів від осі дерева.

На даному таксаційному виділі наявна значна кількість неліквідної деревини.

Ступінь пошкодження – середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 12 виділ 14 площа 14,8 га (в рубку 4,0 га).

Граб звичайний, порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього**

та ознаки діяльності технічних шкідників (наявна буро́ва мука). У частині дерев гра́ба нижні скелетні гілки мертві, а також наявні водяні пагони.

На частині даного виділу осика розміщена групами та куртинами. Майже всі дерева осики уражені і гнилями та опеньком осіннім (наявні плодові тіла несправжнього та осикового трутовиків, а також ризоморфи опенька осіннього).

Ступінь пошкодження — сильна.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 14 виділ 3 площа 7,2 га.

Виявлено поодинокі та групові всихання дерев сосни звичайної внаслідок масового заселення їх стовбуровими шкідниками та ураження грибами офіостомової групи. Крони дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтуватو-зелена; приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони.

Частина дерев гра́ба звичайного та інших порід уражені стовбуровими гнилями.

На стовбурах вітровальних дерев наявні отвори та ходи шкідників.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 15, виділ 2, площа 5,3 га.

Граб звичайний порослевий, уражений стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до всихання та відмирання дерев.

Наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів, вітровальні та з дугоподібно вигнутими стовбурами.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 15, виділ 11, площа 12,0 га (в рубку 3,0 га).

Частина дерев гра́ба звичайного та деяких інших порід уражені гнилями в нижній та середній частині стовбура, що призвело до всихання та відмирання дерев.

На не поодиноких деревах липи наявні ракові нарости по всій висоті стовбура.

Злам дерева, вершин та вітровал виявлено на даному таксаційному виділі.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 17, виділ 3, площа 3,6 га.

Вільха чорна, береза повисла, клена гостролистого, граб звичайного та деякі дерева інших порід уражені стовбуровими та кореневими гнилями на яких наявні ризоморфи опенька осіннього.

На стовбурах ослаблених дерев наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Частина дерев вітровальна та сухостійна.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 17, виділ 9, площа 24,0 га (в рубку 14,0 га).

Насадження уражене стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до всихання та відмирання дерев, також спостерігаються плодові тіла дереворуйнівних грибів. На стовбурах ослаблених та пошкоджених дерев наявні ризоморфи опенька осіннього.

При обстеженні даного виділу виявлено вітровальні та вітроломні дерева.

Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 17, виділ 11, площа 3,0 га (в рубку 1,6 га).

Деякі дерева граба звичайного та інших порід з наявними ознаками стовбурових гнилей, сильно ослаблені та всихають. Також наявні дерева з дугоподібно вигнутими стовбурами та нахилом стовбура більше ніж 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 17, виділ 12, площа 5,6 га (в рубку 3,6).

Габ звичайний, вільха чорна, клен гостролистий, та деякі дерева інших порід уражені гнилями в нижній та середній частині стовбура. При обстеженні виявлено поодинокі та куртинні всихання дерев.

Наявні дерева з нахилом стовбура більше ніж 30 градусів від вертикальної осі та вітровальні.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 17, виділ 13, площа 13,5 га (в рубку 7,5).

Дерева берези повислої, граба звичайного, клена та деяких інших порід уражені стовбуровими та прикореневими гнилями. Також на деревах виявлені плодові тіла дереворуйнівних грибів та ризоморфи опенька осіннього.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 17 виділ 14 площа 11,0 га (в рубку 6,0).

Дерева граба звичайного, вільхи чорної, берези повислої та деяких інших порід уражені стовбуровими та прикореневими гнилями. Наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів, а також сухостійні дерева та з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 18 виділ 20 площа 1,0 га.

Габ звичайний порослевого походження.

Насадження уражене стовбуровими та кореневими гнилями. Всихання та ослаблення дерев граба розміщена поодинокі та куртинно. Частина дерев вітроломні та з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 18 виділ 21 площа 2,0 га.

Береза повисла, граб звичайний, поодинокі дерева модрини європейської та інших порід уражені стовбуровими та прикореневими гнилями. На стовбурах деяких дерев спостерігаються плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Наявні вітровальні та зломані дерева нерівномірно розміщені по всій площі таксаційного виділу.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 18 виділ 22 площа 3,8 га.

Дерева сосни звичайної сухостійні та всихають внаслідок масового заселення їх стовбуровими шкідниками та ураження грибами офіостомової групи. На стовбурах вітровальні дерева наявні отвори та ходи шкідників. Хвоя сосни світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній також наявне всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони.

Граб звичайний, береза повисла уражені стовбуровими гнилями, сильно ослаблені, всихають.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 18, виділ 24, площа 6,9 га.

Спостерігається поодинокі та групове всихання дерев сосни звичайної внаслідок масового заселення їх стовбуровими шкідниками та ураження грибами офіостомової групи. Крони дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони.

Наявні вітровальні дерева та із підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 18, виділ 25, площа 5,5 га.

Насадження сосни звичайної всихає внаслідок масового заселення їх стовбуровими шкідниками та ураження грибами офіостомової групи. Хвоя сосни світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони.

Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 22 виділ 4 площа 6,0 га (в рубку 2,0 га).

Граб звичайний уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено ризоморфи опенька осіннього та ознаки діяльності технічних шкідників (наявна буро́ва мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві, а також виявлені плодові тіла несправжнього грабового трутовика.

Непоодинокі дерева бука уражені раковими утвореннями. У частина дерев бука нижні скелетні гілки мертві.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 22 виділ 5 площа 11,5 га (в рубку 2,5 га).

Граб звичайний, порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві, а також наявні водяні пагони.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 22 виділ 6 площа 25,0 га (в рубку 6,0 га).

Граб звичайний, порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві, а також наявні водяні пагони.

Сосна звичайна, яка присутня в складі насадження має хвою світло-зелену та жовтувато-зелену, приріст відсутній; всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 22 виділ 7 площа 3,3 га.

Граб звичайний, уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів знаходиться в II ярусі насадження. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві, а також наявні водяні пагони.

Сосна звичайна, яка присутня в складі насадження має хвою світло-зелена та жовтувато-зелену, приріст відсутній; всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, а також відпад кори, ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників. Частина дерев сосни з підірваною кореневою системою та нахилом стовбурів та зламаними вершинами.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 22 виділ 15 площа 4,2 га.

Граб звичайний, уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві, а також наявні водяні пагони.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 22 виділ 16 площа 10,2 га.

Граб звичайний, порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та

прилеглий до них частині стовбура виявлено ризоморфи опенька осіннього та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві, а також наявні водяні пагони і водяні пагони.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 22 виділ 28, площа 2,8 га.

Крони дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. На стовбурах сухостійних дерев сосни виявлено посиніння заболоні та деревини, що свідчить про присутність офіостомових грибів. На мертвих деревах сосни звичайної з локальним відшаруванням кори, виявлені ходи та отвори від життєдіяльності технічних шкідників(лубоїдів, вусачів). Частина дерев сосни пошкоджених вітром і має нахил стовбурів більше 30 градусів від осі дерева та дугоподібно зігнуті стовбури.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 23 виділ 5 площа 1,6 га.

Граб звичайний, порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено ризоморфи опенька осіннього та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві.

Осика уражена трутовиками та із наявними стовбуровими гнилями та зламами стовбурів.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 23 виділ 13 площа 0,7 га.

Граб звичайний, порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено ризоморфи опенька осіннього та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві.

Береза повисла уражена стовбуровими гнилями з наявною дуплистістю на деревах по всій висоті стовбура.

Осика уражена трутовиками та із наявними стовбуровими гнилями та зламами стовбурів.

Сосна звичайна випала із складу насадження

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 23 виділ 14 площа 0,8 га.

Граб звичайний, порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено ризоморфи опенька осіннього

та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві.

Бере́за повисла уражена стовбуровими гнилями з наявною дуплистістю на деревах по всій висоті стовбура.

Оси́ка уражена трутовиками та із наявними стовбуровими гнилями та зламами стовбурів.

Кора бука лісового уражена раковими утвореннями.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 23 виділ 15 площа 0,4 га.

Граб звичайний, порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві.

На окремих деревах бука виявлені ракові утворення на стовбурах.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 23 виділ 16 площа 0,3 га.

Граб звичайний, порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві.

Оси́ка уражена трутовиками та із наявними стовбуровими гнилями та зламами стовбурів.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 23 виділ 17 площа 1,6 га.

Граб звичайний, порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба наявні ознаки ослаблення (водяні пагони).

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану

Квартал 23 виділ 30 площа 3,7 га.

Граб звичайний, порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві.

Бук лісовий є осередком несправжнього трутовика (наявні плодові тіла на частині дерев)

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 23 виділ 59, площа 2,0 га.

Хвоя сосни звичайної світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, а також наявне ураження раком сірянкою. На стовбурах сухостійних дерев сосни виявлено посиніння заболоні та деревини, що свідчить про присутність **офіостомових грибів**. На мертвих деревах сосни з локальним відшаруванням кори, виявлені ходи та отвори від життєдіяльності **технічних шкідників**(лубоїдів, вусачів). Частина дерев сосни пошкоджених вітром і має нахил стовбурів більше 30 градусів від осі дерева та дугоподібні зігнуті стовбури.

Ступінь пошкодження – слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 24 виділ 15, площа 2,5 га.

Крони дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. На стовбурах сухостійних дерев сосни виявлено посиніння заболоні та деревини, що свідчить про присутність **офіостомових грибів**. На мертвих деревах сосни звичайної з локальним відшаруванням кори, виявлені ходи та отвори від життєдіяльності **технічних шкідників**(лубоїдів, вусачів) та **ризоморфи опенька осіннього**. Частина дерев сосни пошкоджених вітром і має нахил стовбурів більше 30 градусів від осі дерева та дугоподібні зігнуті стовбури.

Ступінь пошкодження – середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 24 виділ 16 площа 4,0 га.

Крони дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. На стовбурах сухостійних дерев сосни виявлено посиніння заболоні та деревини, що свідчить про присутність **офіостомових грибів**. На мертвих деревах сосни звичайної з локальним відшаруванням кори, виявлені ходи та отвори від життєдіяльності **технічних шкідників**(лубоїдів, вусачів) та **ризоморфи опенька осіннього**. Частина дерев сосни пошкоджених вітром і має нахил стовбурів більше 30 градусів від осі дерева та дугоподібні зігнуті стовбури.

Ступінь пошкодження – середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 25 виділ 11 площа 3,5 га.

Вільха чорна порослевого походження. В прикореневій частині стовбурів вільхи виявлено ураження стовбуровими гнилями на яких наявні **ризоморфи опенька осіннього**. Непоодинокі частини дерев вільхи уражені несправжнім трудовиком (наявні плодові тіла). Також є дерева з нахилом більше 30 градусів від осі та дугоподібними стовбурами.

Значна частина крон дерев клена явора та клена гостролистого уражена омелою білою.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 27 виділ 12 площа 2,5 га.

Вільха чорна, перестійна, порослевого походження. В прикореневій частині стовбурів вільхи виявлено ураження стовбуровими гнилями на яких наявні **ризоморфи опенька осіннього**. Не поодинокі частина дерев вільхи уражена несправжнім трутовиком (наявні плодові тіла). Також є дерева з нахилом більше 30 градусів від осі та дугоподібними стовбурами.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 27 виділ 13 площа 2,2 га.

Вільха чорна порослевого походження. В прикореневій частині стовбурів вільхи виявлено ураження стовбуровими гнилями на яких наявні **ризоморфи опенька осіннього**. Не поодинокі частина дерев вільхи уражена несправжнім трутовиком (наявні плодові тіла). Також є дерева з нахилом більше 30 градусів від осі та дугоподібними стовбурами.

Габ звичайний, порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників (наявна бурова мука).

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 27 виділ 15 площа 2,3 га.

Вільха чорна, перестійна порослевого походження. В прикореневій частині стовбурів вільхи виявлено ураження стовбуровими гнилями на яких наявні **ризоморфи опенька осіннього**. Не поодинокі частина дерев вільхи уражена несправжнім трутовиком (наявні плодові тіла). Також є дерева з нахилом більше 30 градусів від осі та дугоподібними стовбурами.

Габ звичайний, порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників (наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 27 виділ 16 площа 3,7 га (в рубку 3,4 га).

Вільха чорна порослевого походження. В прикореневій частині стовбурів вільхи виявлено ураження стовбуровими гнилями на яких наявні **ризоморфи опенька осіннього**. На значній частині дерев вільхи наявні плодові тіла несправжнього трутовика. Також є дерева з нахилом більше 30 градусів від осі та дугоподібними стовбурами.

Габ звичайний, порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників (наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 33 виділ 2 площа 4,2 га.

Граб звичайний уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглій до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві, а також виявлені водяні пагони на стовбурах дерев.

Дерева берези повислої уражені стовбуровими гнилями у верхній та середній частині стовбура

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 33 виділ 10 площа 2,6 га.

Граб звичайний порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглій до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві, а також виявлені водяні пагони на стовбурах дерев.

Дерева бука уражені раковими утвореннями (на корі стовбурів висотою від двох до десяти метрів).

Осика та береза повисла, перестійні, уражені стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 33 виділ 15 площа 7,2 га.

Граб звичайний порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглій до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві, а також виявлені водяні пагони на стовбурах дерев.

Дерева бука уражені раковими утвореннями (на корі стовбурів висотою від двох до десяти метрів).

Береза повисла уражена стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 33 виділ 17 площа 36,0 га.

Граб звичайний порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглій до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). Значна частина дерев граба ослаблена про, що свідчить наявність водяних пагонів.

Дерева бука уражені раковими утвореннями (на корі стовбурів висотою від двох до десяти метрів).

Береза повисла уражена стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 33 виділ 22 площа 6,3 га.

Дерева бука уражені раковими утвореннями (на корі стовбурів висотою від двох до десяти метрів).

Граб звичайний порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). Значна частина дерев граба ослаблена про, що свідчить наявність водяних пагонів.

Осика та береза повисла, перестійні, уражені стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 33 виділ 23 площа 8,6 га (в рубку 3,6 га).

Дерева бука уражені раковими утвореннями (на корі стовбурів висотою від двох до десяти метрів).

Граб звичайний порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). Значна частина дерев граба ослаблена про, що свідчить наявність водяних пагонів.

Осика та береза повисла, перестійні, уражені стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів.

Ступінь пошкодження — слабка..

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 43 виділ 30 площа 13,7 га (в рубку 9,7 га).

Дерева бука уражені раковими утвореннями, а також виявлені плодові тіла несправжнього трутовика.

Граб звичайний уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві, а також виявлені водяні пагони на стовбурах дерев.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 43 виділ 34 площа 3,3 га (в рубку 2,2 га).

Граб звичайний уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві, а також виявлені плодові тіла трутовиків та водяні пагони на стовбурах дерев.

Дерева бука уражені раковими утвореннями (на корі стовбурів висотою від двох до десяти метрів).

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 43 виділ 35 площа 4,4 га.

Осика уражена несправжнім та осиковим трутовиками. Граб звичайний порслевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві, а також виявлені водяні пагони на стовбурах дерев.

Дерева берези повислої мають дуго подібні форми та уражені раковими утвореннями на корі стовбурів.

Ступінь пошкодження — середня

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 43 виділ 36 площа 4,5 га (в рубку 3,6 га).

Осика фактично вся уражена трутовиками. Під корою мертвих дерев осики виявлені **ризоморфи опенька осіннього**.

Граб звичайний уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві, а також наявні водяні пагони на стовбурах дерев.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 43 виділ 46 площа 6,3 га.

Береза повисла в значній частині виділу має підірвану кориневу систему і нахил дерев більше 30 градусів від осі стовбура. Також виявлено плодові тіла трутовиків на стовбурах берези.

Граб звичайний уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука).

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 43 виділ 47 площа 5,6 га (в рубку 3,8 га).

Береза повисла в значній частині виділу має підірвану кореневу систему і нахил дерев більше 30 градусів від осі стовбура. Також виявлено плодові тіла трутовиків на стовбурах берези.

Граб звичайний уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука).

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 43 виділ 53 площа 1,8 га (в рубку 0,9 га).

Граб звичайний порслевого походження, уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього**

та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві, а також виявлені водяні пагони на стовбурах дерев.

Осика та береза повисла, перестійні, уражені стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 44 виділ 4 площа 44,0 га (в рубку 22,7 га).

Граб звичайний уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві, а також виявлені водяні пагони на стовбурах дерев.

Дерева бука уражені раковими утвореннями (на корі стовбурів висотою від двох до десяти метрів). У частина дерев бука нижні скелетні гілки мертві.

Ясень звичайний уражений халаровим некрозом, більшість скелетних гілок мертві в прикореневій частині стовбура наявні гнилі на яких виявлені ризоморфи опенька осіннього.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 51 виділ 8 площа 13,5 га (в рубку 4,5 га).

Граб звичайний порослевого походження уражений стовбуровими гнилями в нижній прикореневій частині стовбурів. На стовбурових гнилях та прилеглий до них частині стовбура виявлено **ризоморфи опенька осіннього** та ознаки діяльності технічних шкідників(наявна бурова мука). У частині дерев граба нижні скелетні гілки мертві, а також виявлені водяні пагони та дуплистість по всій висоті стовбурів..

Дерева бука уражені раковими утвореннями (на корі стовбурів висотою від двох до десяти метрів).

Осика та береза повисла, перестійні, уражені стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Висновки та пропозиції

1. В процесі лісопатологічного рекогносцирувального обстеження оглянуто 72 лісові ділянки на загальній площі 359,2 га., при цьому виявлено:

Стовбурові гнилі – 24,7 га, а саме:

Слабка ступінь пошкодження – 13,6 га.

Середня ступінь пошкодження – 11,1 га.

Опеньок осінній – 248,9 га, а саме:

Слабка ступінь пошкодження – 26,3 га.

Середня ступінь пошкодження – 199,9 га.

Сильна ступінь пошкодження – 22,7 га.

Комплексний осередок короїдів та офіостомових грибів – 85,6 га, а саме:

Слабка ступінь пошкодження – 28,4 га.

Середня ступінь пошкодження – 57,2 га.

2. У відповідності до вимог «Санітарних правил в лісах України», з метою покращення загального санітарного стану, недопущення розвитку та поширення шкідників та хвороб лісу, рекомендувати погодити проведення вибіркового санітарного рубок в межах 72 обстежених ділянок на загальній площі 359,2 га.

Заступник директора
ДСЛП „Львівлісозахист”




Василь СЕНИК

Інженер-лісопатолог
Тернопільського ОЛП
ДСЛП „Львівлісозахист”



Марія МАКАРА

Головний лісничий
Бережанського
ДП „Бережаниагроліс”



Михайло ДУТКЕВИЧ

Адміністратор
електронного обліку деревини
Бережанського
ДП „Бережаниагроліс”



Борис ПІДФІГУРНИЙ