

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

22 жовтня 2025 року

м. Лебедині

Нами, головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., інженером - лісопатологом I категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» І. В. Рідкокашею, головним лісничим ДП «Лебединський агролісгосп» Богуславцем О. В., разом з лісовою охороною проведено лісопатологічне обстеження насаджень ДП «Лебединський агролісгосп» ОКАП «Сумиоблагроліс» Сумської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження: **247,8 гектара.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревини, куб. метрів на 1 гектар
72	11	1,4	8Д32ВЛЧ	90	0,50	2	25	40	230
72	13	3,8	10ДЗ	90	0,50	1	26	36	250
72	20	3,6	9Д31КЛТ	90	0,60	2	25	40	250
72	24	4,4	8Д32ВЛЧ	80	0,50	1	27	40	250
90	10	4,2	6Д34ЯЗЛ+АКБ	63	0,60	1А	26	36	300
92	1	14,4	7Д31ОС1БП1ЛПД+ВЛЧ	76	0,60	2	20	32	190
5	4	4,2	9Д31ЯЗЛ+ЛПД	80	0,60	1	24	32	260
14	3	5,1	4Д36ЯЗЛ	73	0,60	2	20	32	210
24	17	8,2	4Д33ЯЗ2КЛГ1ЯЗЛ	53	0,60	1А	22	26	220
29	11	4,2	6Д32БП2ОС	81	0,50	2	23	32	190
29	14	4,3	8Д32БП	81	0,50	2	24	32	184
58	6	8,1	8Д31КЛГ1БРС	67	0,60	1А	25	28	220
103	13	2,1	7Д31ЯЗЛ1КЛГ1БРС	57	0,6	1А	23	28	220
104	14	4,2	6Д32ЯЗЛ1КЛГ1БРС+АКБ	60	0,70	2	18	26	200
104	16	5,7	8Д31БРС1КЛГ	78	0,70	3	20	26	230
126	38	30,9	7Д32КЛП1ЛПД+ОС	71	0,70	2	21	28	200
131	42	2,0	7Д31КЛП1ЛПД1ОС+БРС	70	0,50	2	23	30	190
132	3	3,5	9Д31БРС+ЛПД	62	0,60	1	20	26	190
132	5	10,0	6Д33ЯЗ1КЛП	72	0,60	1	23	30	210
154	16	3,9	9Д31БРС	68	0,60	1	25	28	270
154	12	1,9	10ДЗ	68	0,60	1	24	32	260
154	13	3,2	4Д34КЛЯ1ЯЗ1БРС	73	0,60	2	22	28	160

В результаті лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, щетинковослоєні трутовик, березовий трутовик, халаровий некроз, несправжній осиковий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний, графіоз та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плоді тіла на стовбурах, венчаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами

(морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
20	1	5,1	6ЯЗЛ4ВЗШ	62	0,60	2	18	24	140
20	22	2,3	6ЯЗЛ1ЯЗ2ВЗШ1ДЗ	53	0,70	1А	22	32	230
103	11	3,0	7ЯЗЛ2ДЗ1КЛГ+ВРЛ+ТК	77	0,70	1	24	30	280

Лісопатологічним обстеженням даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: халаровий некроз, бактеріальний рак ясені, несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, щетиноволосий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, вертицильозне в'янення та трутовик звичайний. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухоостою, плодові тіла на стовбурах, висихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			Склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
25	55	3,2	10СЗ	58	0,60	1А	23	28	290
27	13	2,4	10СЗ	51	0,60	1	20	26	240
53	16	6,4	10СЗ	53	0,50	1Б	25	28	270
72	18	2,5	10СЗ	44	0,60	1Б	22	24	280
75	41	6,8	10СЗ	58	0,40	1А	25	28	230
91	14	5,8	10СЗ	58	0,60	1А	25	32	340
110	7	23,3	10СЗ+ДЧР	78	0,50	1	27	32	310
24	39	3,7	10СЗ	83	0,50	1	28	32	350
52	24	6,3	10СЗ	90	0,60	1	28	40	390
116	64	4,3	10СЗ+БП	58	0,60	1А	25	28	230
79	2	8,3	10СЗ	83	0,60	1	26	28	340
123	61	5,3	10СЗ+БП	83	0,50	1	27	34	300
132	24	4,6	8СЗ2БП	53	0,60	1	19	20	210

В ході проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер висихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжсередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та щетинозубчастий короїд, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облімованого

трутовика, березового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком-водянкою. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	щільність деревостану, куб. метрів на 1 гектар
78	57	7.1	10ВЛЧ	36	0.60	1	19	20	160
156	42	4.3	10ВЛЧ	55	0.70	2	22	24	250

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження та пошкодження – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній вільховий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний та трутовик променистий. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	щільність деревостану, куб. метрів на 1 гектар
19	2	2.2	8БП2СЗ	45	0.60	1А	20	26	170
122	61	7.6	7БПЗДЧР	46	0.50	1Б	23	26	160

При проведенні лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження та пошкодження – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: березовий трутовик, березова губка, бактеріальний рак-водянка, трутовик звичайний та несправжній дубовий трутовик. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хворобами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2026 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів. Враховуючи

ступінь ураження інфекційними хворобами, розповсюдження стовбурових шкідників - вибіркові санітарні рубки (на загальній площі 247,8 га), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних хвороб. Адаже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 - х примірниках:

1 - ДСЛП «Харківлісозахист».

2 - ДП «Лебединський агролісгосп».

3 - Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

Підписи:



А. Д. Воробей



І. В. Рідкоман



О. В. Богуславський