

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

03.10.2025 року

м. Суми

Нами: інженером-лісопатологом I категорії відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Коровкою Т.І., провідним інженером з охорони та захисту лісу філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Жерьобкіним В.Д., інженером з охорони та захисту лісу I категорії філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Голубом В.М. проведено обстеження насаджень Сумського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Сумської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **720,4 гектара**.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Сумське лісництво – 108,2 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота,	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м.
48	1	38.2	4Д34Я32КЛГ	105	0.80	2	27	36	360
44	7	30.4	4Я32Д32КЛГ2ЛПД+БРС+ОС	135	0.60	1	32	52	330
45	1	3.8	5Я33КЛГ1БРС1ЛПД+ОС+БП	81	0.60	1А	30	36	290
44	6	4.3	4Я31БРС3КЛГ1Д31ЛПД+ОС+БП	76	0.70	1А	29	32	340
37	10	5.1	3КЛГ3ОС3ЛПД1ЯЗ+ДЗ	43	0.70	3	16	18	175
37	11	1.0	4Д34Я31КЛГ1ЛПД+БП	100	0.60	1	28	44	310
33	7	2.5	5Я33Д32КЛГ+ЛПД	96	0.60	1А	31	36	325
40	13	19.9	4Д34Я31КЛГ1ЛПД+ОС	110	0.70	1	30	40	390
40	3	3.0	6Д32Я31ЛПД1КЛГ+БП	110	0.70	2	28	36	370

В ході проведення лісопатологічного обстеження було виявлено, що на даних ділянках дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження - слабкий та середній, характер розповсюдження - поодинокий, дифузний та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, халаровий некроз, опеньок осінній, трахеомікоз про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, дупел, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (III-IV категорії стану) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений великий ясеневий лубоїд (вхідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери). Окрім цього, в насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дерева з ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), та дерева з виваленою кореневою системою.

Межиріцьке лісництво - 20,3 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
80	5	20.3	8Д31С31БП	111	0.60	2	28	36	290

При проведенні лісопатологічного обстеження було виявлено, що на даних ділянках дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження - слабкий, характер розповсюдження - дифузний та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, опеньок осінній, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Відмічено дерева з ознаками ураження кореневою губкою та стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди). Окрім цього в насадженні присутні дерева з виваленою кореневою системою, зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Глинське лісництво - 38,7 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
4	30	4.9	10ДЗ+КЛГ+ЯЗ+ЛПД+БП+ОС	76	0.70	1	24	30	350
7	5	1.3	8ЯЗ2ДЗ	55	0.70	1Б	27	36	330
7	14	2.8	8Д32ЛПД+КЛГ	71	0.70	1	24	30	290
21	5	5.8	3ДЗ3ОС3ЛПД1ЯЗ+БРС	71	0.70	1	25	30	325
56	15	2.8	4Д33ЛПД2ЯЗ1КЛГ+ДЧР+БП+ОС	66	0.70	1	24	28	310
62	7	1.6	6Д32ЛПД2КЛГ	71	0.60	2	23	30	220
62	16	2.8	5ЛПД2ДЗ1КЛГ1ОС1ЯЗ	71	0.65	2	23	26	280
62	18	3.0	4Д34ЛПД2КЛГ+АКБ	81	0.65	2	25	32	260
70	21	3.7	9Д31КЛГ+БРС+ЛПД	86	0.70	1	25	32	313
84	1	10.0	4Д34ЛПД2ЯЗ+КЛГ	76	0.70	2	25	32	310

Лісопатологічним обстеженням було встановлено, що на даних ділянках дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження - слабкий та середній, характер розповсюдження - поодинокий, груповий та дифузний. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, халаровий некроз, опеньок осінній, трахеомікоз та вертицильозне в'янення, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (III-IV категорії стану) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений великий ясеневий лубоїд (вхідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери). Окрім цього в насадженні

присутні дерева з виваленою кореневою системою, зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Українське лісництво - 33,9 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
17	2	5.2	9Д31СЗ+БП	111	0.65	2	26	36	295
31	7	9.6	7Д32С31БП+ОС	111	0.75	3	25	36	330
53	12	3.7	7Д33СЗ+ОС+БП	76	0.75	2	23	28	320
66	14	2.7	8Д32СЗ+КЛГ	85	0.75	2	23	28	305
66	11	6.9	6Д33С31БП	91	0.75	2	24	28	335
67	1	0.9	7Д33СЗ+БП	75	0.7	2	23	28	300

При обстеженні насаджень вищеперелічених ділянок було встановлено, що дерева та групи дерев відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження - слабкий та середній, характер розповсюдження — дифузний, груповий та куртинний. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, халаровий некроз, звичайний трутовик, трахеомікоз та вертицильозне в'янення, коренева та соснова губка, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (III-IV категорії стану) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками, а саме: верхівковий та шести зубчастий короїди, сосновий лубоїд (вхідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери). Окрім цього, в насадженнях присутні дерева з виваленою кореневою системою зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
63	4	4.9	7С33ДЗ+ЯЛЕ+БП	86	0.7	1	26	36	350

За результатами обстеження даної ділянки було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами: коренева губка, несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, трахеомікоз та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження - середній, характер всихання - дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерев у міжсередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). В насадженні присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Верхньосироватське лісництво - 75,2 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
28	4	15.0	6Д32Я32КЛГ+ЛПД+БРС+КЛП+ОС	80	0.70	1А	33	44	400
30	1	8.0	6Д32Я32КЛГ+ЛПД+БРС+КЛП	80	0.70	1	27	44	350
22	4	10.0	5Я33Д31ЛПД1КЛГ+БРС+КЛП	131	0.70	1А	35	48	410
28	1	5.0	4Д34Я32КЛГ+БРС+ЛПД+БП	100	0.70	1А	34	48	400
33	17	7.7	10Д3+КЛГ+БРС+ЛПД	91	0.70	2	25	32	330
35	4	5.9	6Я32Д32КЛГ+БРС+ЛПД+КЛП	70	0.70	1	28	48	350
40	12	2.8	6Д33Я31ЛПД+БРС+КЛП	101	0.80	1	27	36	400
40	13	4.6	6Я32ЛПД2КЛГ+БП+Д3+БРС+КЛП	59	0.90	1А	26	26	360
40	21	6.0	6Д32Я31ЛПД1КЛГ+БРС+КЛП	100	0.70	1	29	40	360
92	14	10.2	10Д3+Я3+КЛГ+КЛП+ЛПД+БРС	90	0.70	1	28	32	376

При проведенні лісопатологічного обстеження даних ділянок було виявлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження - середній, характер розповсюдження - дифузний та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, халаровий некроз, опеньок осінній, трахеомікоз про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, дупел, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (III-IV категорії стану) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений великий та малий ясеневі лубоїди (вхідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери). Окрім цього, в насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Бишкінське лісництво - 26,4 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
1	12	22.2	6Д32Я32ЛПД+ОС+БРС+КЛГ	100	0.70	2	27	40	330
23	5	4.2	8Д32С3+БП+ОС	100	0.50	2	26	36	230

В ході проведення лісопатологічного обстеження було виявлено, що на даних ділянках дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження - слабкий та середній, характер розповсюдження - поодинокий, груповий та куртиний. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, халаровий некроз, опеньок осінній, коренева та соснова губка, трахеомікоз, вертицильозне в'янення, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (III-IV категорії стану) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений великий ясеневий лубоїд (вхідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери), також виявлені ознаки ушкоджень шести зубчастим та верхівковим короїдами. Окрім цього в насадженні присутні дерева з виваленою кореневою системою, зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Недригайлівське (Липоводолинське) - 29,1 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
7	4	8.2	6Д34ЯЗ+КЛГ	96	0.65	2	26	36	320
7	7	3.8	5Д35ЯЗ	90	0.65	2	25	40	300
30	34	6.1	5ОС2КЛГ1ЛПД1БРС1БП+ДЗ	37	0.80	1А	22	28	250
30	35	6.8	2Д32КЛГ2ЛПД2БП2ОС+БРС	59	0.85	1	22	28	310
33	3	4.2	10ВЛЧ	40	0.80	1А	18	22	200

При проведенні лісопатологічного обстеження даних ділянок було виявлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження - середній, характер розповсюдження - дифузний та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, халаровий некроз, опеньок осінній, трахеомікоз про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, дупел, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (III-IV категорії стану) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений великий та малий ясеневі лубоїди (вхідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери). Окрім цього, в насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Недригайлівське лісництво - 104,0 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану,
48	10	14.7	10ДЗ+КЛГ+ЯЗ+ЛПД	96	0.70	1	28	36	360
52	3	9.3	7Д33КЛГ+ЯЗ	81	0.70	1А	28	34	370
58	1	13.1	10ДЗ+КЛГ+ЛПД	86	0.70	1	27	32	370
58	2	15.0	10ДЗ+КЛГ+ЛПД	86	0.70	1	27	32	370
64	3	10.8	10ДЗ+КЛГ+ЛПД+ЯЗ	86	0.70	1	28	38	390
91	4	16.0	10ДЗ+ЛПД	106	0.70	2	27	36	320
117	4	6.2	7Д33ЯЗ+КЛЯ	72	0.70	1	25	30	330
117	8	0.5	10ДЗ	59	0.70	1А	24	28	300
118	5	4.1	10ДЗ+КЛГ+БП	86	0.70	2	23	32	290
118	7	0.9	10ДЗ+ЯЗ	64	0.70	1	22	26	260
120	8	1.2	7Д32КЛГ1ЛПД	58	0.65	1	20	24	200
126	2	5.8	10ДЗ+ЛПД	91	0.70	1	27	40	340
127	9	6.4	10ДЗ	91	0.65	1	27	36	330

В ході проведення лісопатологічного обстеження було виявлено, що на даних ділянках дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження - слабкий та середній, характер розповсюдження - поодинокий, дифузний та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: несправжній дубовий трутовик, трутовик

звичайний, халаровий некроз, опеньок осінній, трахеомікоз та вертицильозне в'янення, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (III-IV категорії стану) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений великий ясеневий лубоїд (вхідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери). Окрім цього в насадженні присутні дерева з виваленою кореневою системою, зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Низівське лісництво - 22,1 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану,
9	3	7.5	4Д34ЛПД1ЯЗ1КЛГ	50	0.70	1	20	26	220
9	4	7.3	4Д33ЛПД2ЯЗ1ОС+БП	76	0.70	1	26	32	370
13	9	7.3	3ЛПД2ЯЗ2КЛГ1ДЗ1ОС1БРС+БП	90	0.70	2	26	30	360

Обстеженням було встановлено, що на даних ділянках дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження - слабкий та середній, характер розповсюдження - поодинокий, груповий та дифузний. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, халаровий некроз, опеньок осінній, трахеомікоз та вертицильозне в'янення, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (III-IV категорії стану) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений великий ясеневий лубоїд (вхідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери). Окрім цього в насадженні присутні дерева з виваленою кореневою системою, зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Роменське лісництво - 30,7 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану,
10	3	16.0	8ЛПД2КЛГ+ДЗ	85	0.80	2	25	32	320
11	9	2.9	5КЛП2ЛПД1БР2БП	46	0.70	2	17	20	175
11	18	3.3	4КЛГ3ЛПД2ДЗ1ОС	67	0.70	1	26	32	310
20	26	0.5	10 ОС	46	0.60	1А	25	46	300
20	33	0.2	4Д34ЯЗ1КЛГ1ЛПД	71	0.60	1	24	30	300
21	30	0.2	5ЯЗ1Д34КЛГ+ЛПД	66	0.70	1А	24	30	290
19	1	4.1	6Д32КЛГ2ЛПД	76	0.60	1	25	30	310
19	6	0.6	6Д33АКБ1ЛПД	81	0.70	1	26	30	270
21	4	2.9	4Д34ЛПД1КЛГ1ОС	66	0.70	1	21	24	240

В ході проведення лісопатологічного обстеження було виявлено, що на даних ділянках дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження - слабкий та середній, характер розповсюдження - поодинокий, дифузний та груповий. Серед

виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, халаровий некроз, опеньок осінній, осиковий трутовик, трахеомікоз та вертицильозне в'янення, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (III-IV категорії стану) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений великий ясеневий лубоїд (вхідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери). Окрім цього в насадженні присутні дерева з виваленою кореневою системою, зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Роменське (Томашівське) лісництво - 5,7 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану,
34	12	3.8	4Д34Я32КЛГ	78	0.90	1	24	28	400
32	7	1.9	6КЛГЗЯ31ДЗ+БРС	61	0.70	1А	24	26	300

Лісопатологічним обстеженням було встановлено, що на даних ділянках дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження - середній, характер розповсюдження - дифузний та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, халаровий некроз, опеньок осінній, трахеомікоз та вертицильозне в'янення, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (III-IV категорії стану) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений великий ясеневий лубоїд (вхідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери). Окрім цього в насадженні присутні дерева з виваленою кореневою системою, зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Великобобрицьке лісництво - 56,1 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану,
6	5	3.3	4Д34КЛГ2ЛПД	79	0.70	1	25	28	280
9	23	16.0	3Д33ЛПД1КЛГЗЯЗ	94	0.70	2	24	32	290
15	26	6.2	10ДЗ+ЯЛЕ+АКБ	96	0.70	2	25	32	345
16	1	6.6	10ДЗ	86	0.70	1	25	32	320
19	9	10.0	5Д34ЛПД1КЛГ+БХА	86	0.70	1	25	32	280
27	12	14.0	8Д32ЛПД+КЛГ	66	0.70	1	22	26	260

При проведенні лісопатологічного обстеження даних ділянок було виявлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження слабкий та середній, характер розповсюдження - поодинокий, дифузний та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, халаровий некроз, опеньок осінній, трахеомікоз про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, дупел, сухостійних дерев, всохлих та

всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (III-IV категорії стану) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений великий та малий ясеневі лубоїди (вхідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери). Окрім цього, в насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Краснопільське лісництво - 31,2 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану,
68	10	3.5	9ДЗІКЛГ	80	0.70	1	27	28	310
57	10	5.7	8ДЗІСЗІКЛГ+ЛПД	96	0.70	1	28	32	280
44	2	22.0	7ДЗ2ЯЗІЛПД+КЛГ	106	0.75	1	28	36	375

В ході проведення лісопатологічного обстеження було виявлено, що на даних ділянках дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження - середній, характер розповсюдження - дифузний та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, халаровий некроз, опеньок осінній, трахеомікоз та вертицильозне в'янення, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Також виявлені сосни з ознаками ураження кореневою губкою. Ослаблені дерева (III-IV категорії стану) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений великий ясеневий лубоїд (вхідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери). Окрім цього в насадженні присутні дерева з виваленою кореневою системою, зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Піщанське лісництво - 91,4 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м.
90	12	3.8	6ДЗ2БРСІЯЗЛІЛПД+ГХЧ+ВРБ+КЛГ+ДЧР	91	0.60	1	27	40	300
90	8	5.8	ЗДЗ3БРСІВРБІЛПДІОСІКЛГ	130	0.50	2	27	48	210
90	9	5.4	ЗДЗ(81)2ДЗ(130)2ЛПДІКЛГІБРСІОС+ЯЗ+ВРБ	81	0.60	2	24	32	250
99	9	5.5	ЗДЗ2ОС2БРСІКЛГІВРЛІЯЗ+КЛЯ	71	0.50	1	26	36	240
99	18	4.1	6ДЗ2БРСІЯЗІЛПД+КЛГ+ОС	76	0.70	1	27	32	330
99	2	11.0	4БРС3ОС2ДЗІКЛГ+КЛП+ВЛЧ+БП+ЛПД+ВРБ	71	0.60	1	25	28	270
88	7	29.7	ЗДЗ2БРС2КЛГІЛПДІВЛЧІВРБ	120	0.70	2	25	40	280
75	6	4.2	7ДЗ2ЛПДІКЛГ+ОС+БП	110	0.60	1	30	44	320
93	17	5.0	6ДЗ3ЛПДІКЛГ	100	0.70	1	28	36	340
94	14	5.9	4ДЗ4ЛПД2КЛГ+БП	100	0.70	1	28	36	340
75	3	11.0	7ДЗ2ЛПДІКЛГ+ОС	105	0.60	1	29	40	310

При обстеженні насаджень вищеперелічених ділянок було встановлено, що дерева та групи дерев відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження - слабкий та середній, характер розповсюдження - поодинокий, дифузний та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: несправжній дубовий трутовик, сірчано-жовтий трутовик, халаровий некроз, опеньок осінній, печіночниця звичайна, березовий трутовик, осиковий трутовик, трахеомікоз та вертицильозне в'янення, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (III-IV категорії стану) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками (великий та малий ясеневий лубоїди). Окрім цього, в насадженнях присутні дерева з морозобоїнами, з виваленою кореневою системою зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Осоївське лісництво - 47,4 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
67	6	8.2	6ЯЗ1ДЗ1ДЧР1БРС1КЛГ	60	0.80	1А	26	28	350
71	13	5.9	7ЯЗ1БРС1КЛГ1ДЗ+БП+ОС+ЛПД	50	0.70	1А	23	26	260
70	28	3.6	6ЯЗ3ДЗ1КЛГ+БП+БРС	96	0.70	1	29	40	350
77	24	5.5	5ЯЗ2ДЗ2КЛГ1БРС+ЛПД	70	0.75	1	27	40	340
80	23	3.7	4ЯЗ2БРС2БП2КЛГ	54	0.80	1А	28	30	330
83	11	6.4	6ЯЗ2ДЗ2КЛГ+БРС+ЛПД	70	0.70	1	28	36	350
85	15	6.8	5ЯЗ3ДЗ2КЛГ+ЛПД	70	0.80	1	27	40	385
72	4	7.3	5ЯЗ3ДЗ2КЛГ+БРС+ЛПД	96	0.75	1	28	36	370

Лісопатологічним обстеженням було встановлено, що на даних ділянках дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження - середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: халаровий некроз, несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, опеньок осінній, трахеомікоз та вертицильозне в'янення, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (III-IV категорії стану) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений великий ясеневий лубоїд (вхідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери). Окрім цього в насадженні присутні дерева з виваленою кореневою системою, зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:


В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани, що в свою чергу негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб і шкідників. Враховуючи біологічні особливості виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано, керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2026 році, з урахуванням ступеню поширення виявлених хвороб - вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **720,4 га.**), з вилученням з деревостанів небезпечних сухостійних, відмираючих дерев, з ознаками ураження стовбуровими та

комлевими гнилями, дерев з ознаками заселення стовбуровими шкідниками та дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних хвороб. Адже зменшити наслідки розвитку стовбурових шкідників та інфекційних хвороб, попередити розповсюдження по площі та масове розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 - х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист».
- 2 – Сумське надлісництво філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»
- 3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи

 Коровка Т.І.
 Жерьобкін В.Д.
 Голуб В.М.

№	Площа, га	Висота, м	Вид дерева	Вік, років	Площа, га	Висота, м	Вид дерева	Вік, років	Площа, га	Висота, м	Вид дерева	Вік, років
42	1	28,2	4-ОС-БЕРУЛІ	105	0,80	2	29	36	105			
43	2	30,4	4-ОС-БЕРУЛІ	173	0,60	1	32	42	173			
44	1	3,8	4-ОС-БЕРУЛІ	81	0,60	1A	30	36	290			
44	6	2,3	4-ОС-БЕРУЛІ	76	0,70	1A	29	32	149			
37	10	5,1	3-КАС-ОС-БЕРУЛІ	43	0,70	1	16	18	173			
39	11	1,0	4-ОС-БЕРУЛІ	100	0,60	1	28	44	110			
13	2	2,3	4-ОС-БЕРУЛІ	96	0,60	1A	31	36	325			
40	13	10,0	4-ОС-БЕРУЛІ	110	0,70	1	30	40	390			
40	7	7,5	4-ОС-БЕРУЛІ	110	0,70	2	28	36	170			

В ході проведення лісотопічного обстеження було виявлено, що на чотирьох ділянках деревно-кущовий та підмертвий запаси ураження їх комплексом наразішніх хвороб. Ступінь ураження слабкий та середній, характер розповсюдження - поодинокий, дифузний та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: несправжній дубовий трітовик, трітовик значаний, характерне висихання гілок осини, трахеомікоз про що свідчать наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, дупел, сухостійних дерев, висохлих та висихаючих водних пагонів, скелетних гілок та вітьових дерев. Ослаблені дерева (III-IV категорії стану) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджені великий асеновий чубок (вхідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери). Окрім цього, в насадженні присутні дерева з нахилними стовбурами, вершинами дерев з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дерева з ознаками пошкодження стовбурів на ікни температурами (морозобоїни), та дерева з виявленою кореневою системою.