

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

15 жовтня 2025 року

м. Ромни

Нами, головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., інженером – лісопатологом I категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., головним лісничим ДП «Роменський агролісгосп» Похилом М. І., разом з лісовою охороною проведено лісопатологічне обстеження насаджень ДП «Роменський агролісгосп» ОКАП «Сумиоблагроліс» з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження: **186,6 гектара.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Андріяшівське лісництво (83,0 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
159	7	1	1,9	4Д34ЛПД1Я31ОС	70	0.60	2	23	30	240
161	14	1	1,5	4Д33ЛПД2Я31КЛГ+АКБ	70	0.70	1	22	26	260
163	19	1	5,0	4Д32ЛПД2Я32КЛГ+ВЛЧ	80	0.60	2	24	36	260
168	23		0,6	10ДЗ	70	0.70	2	21	30	250
186	23		1,9	4Д32Я32АКБ1БП1БРС+ОС	67	0.70	2	19	28	190
248	1		2,5	4Д34ЛПД2БРС	45	0.60	1	18	24	150
248	5		1,2	5Д35АКБ	73	0.60	1	23	32	180

В результаті обстеження встановлено, що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження насаджень – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, березовий трутовик, трутовик звичайний, лускатий трутовик, халаровий некроз, печіночниця звичайна, опеньок осінній, сірчано – жовтий трутовик та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
158	19		1,1	6ЛПД2КЛГ2ДЗ	55	0.70	2	22	24	250
161	22	2	7,4	5ЛПД3Я32ДЗ+КЛГ+ОС	60	0.70	2	22	24	270
161	25		2,7	6ЛПД2ОС1БП1КЛГ	55	0.70	2	21	26	230
187	6	2	5,0	4ЛПД3Я32Д31КЛГ+БП	75	0.60	2	22	28	250
192	20	1	5,0	4ЛПД3БРС2Д31Я3+АКБ	70	0.60	2	23	28	260
206	26		1,3	6ЛПД2ОС2ДЗ+БП	55	0.60	2	22	24	230

Під час проведення обстеження встановлено, що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження насаджень – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: вертицильозне в'янення, несправжній дубовий трутовик, березовий трутовик, трутовик звичайний, опеньок осінній, сірчано – жовтий трутовик та несправжній осиковий трутовик. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні

дерева вивалені з коренем зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
155	30	2	5,3	10ВЛЧ	60	0.70	2	23	26	270
159	1	3	1,4	10ВЛЧ	55	0.70	1	24	28	290
159	13	1	2,0	10ВЛЧ	70	0.70	2	23	28	270
159	15		2,1	10ВЛЧ	35	0.70	1	19	22	190
162	35		1,8	10ВЛЧ	45	0.60	3	16	22	120
170	3	2	3,0	10ВЛЧ	45	0.70	1	21	28	230
170	21		4,6	4ВЛЧ3ОС2ЛПД1БРС+ДЗ	50	0.60	1	21	26	210
182	37		2,2	10ВЛЧ	50	0.70	1	21	22	230
184	6		2,0	10ВЛЧ	45	0.70	1А	24	26	290
189	44	2	3,9	10ВЛЧ+ВРЛ	50	0.60	1	23	28	230
213	16		4,0	10ВЛЧ	55	0.60	2	20	24	180
257	33	1	2,9	10ВЛЧ	70	0.60	2	24	30	250

В ході проведення обстеження встановлено, що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження насаджень – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній вільховий трутовик, трутовик звичайний, сірчано – жовтий трутовик, несправжній осиковий трутовик, вертицильозне в'янення та графіоз. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
222	10	1	2,0	5КЛГ2ДЗ2БРС1ОС	65	0.60	2	21	28	190
236	40		2,1	6КЛГ2ЛПД1ДЗ1БРС	55	0.70	2	21	24	210

При проведенні лісопатологічного обстеження встановлено, що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження насаджень – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: вертицильозне в'янення, несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, опеньок осінній, сірчано – жовтий трутовик, графіоз та несправжній осиковий трутовик. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
225	10	3,0	8ТБ2БП	60	0.60	4	24	30	240

В результаті обстеження встановлено, що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження насаджень – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній вільховий трутовик, березовий трутовик, трутовик звичайний, сірчано – жовтий трутовик та бактеріальний рак-водянка. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення

стовбуровими шкідниками. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
229	13	2,5	8БП2АКБ+ОС+КЛГ	45	0.70	1	21	28	200
250	5	1,1	10БП	48	0.70	1А	21	26	190

Під час проведення обстеження встановлено, що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження насаджень – слабкий, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: березовий трутовик, трутовик звичайний, сірчано – жовтий трутовик та бактеріальний рак-водянка. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плоді тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Роменське лісництво (103,6 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
2	22		2,8	10ДЗ+АКБ+ОС	74	0.70	2	20	28	270
23	10	1	3,0	4ДЗЗЛПД2ОС1КЛГ+БП	75	0.70	3	21	28	260
24	34		2,5	3ДЗЗБП2ДЧР2ЛПД+КЛГ	54	0.70	1	21	26	280
26	5		3,1	10ДЗ+ЛПД+КЛГ	79	0.60	2	21	30	220
27	20		3,7	10ДЗ+ЛПД+КЛГ	75	0.60	2	20	24	210
33	16		0,6	4ДЗЗЛПД2ОС1КЛГ+БРС	80	0.70	2	23	32	300
37	26		3,2	8ДЗ1ЯЗЛ1БРС	67	0.80	1	21	32	280
39	2		2,8	8ДЗ2ЛПД	75	0.70	1	24	30	270
45	16	1	3,5	4ДЗ4АКБ1КЛГ1ОС+БП	82	0.70	1	24	30	270
46	11	1	3,0	3ДЗ2КЛГ3ЛПД2ОС+БП	75	0.70	2	24	32	330
47	7	1	2,9	4ДЗ3КЛГ2АКБ1ЛПД+ЯЗ+ОС	75	0.70	1	23	30	290
51	26	1	3,0	3ДЗ4КЛГ3ЛПД+ОС+БРС	100	0.60	2	24	48	220
67	22		3,8	4ДЗ3БРС3АКБ+БП	65	0.70	2	20	30	220
70	3		1,1	7ДЗ3ЛПД+КЛГ+БП	90	0.60	2	24	36	260
74	27		3,0	4ДЗ3ОС3ЛПД	80	0.70	2	23	32	280
79	13		3,0	3ДЗ3ЛПД2ЯЗ2КЛГ	60	0.70	2	20	24	220
80	3		3,2	6ДЗ2КЛГ2ЯЗ	75	0.70	2	22	26	250
80	7	1	2,0	4ДЗ4ЛПД1ЯЗ1КЛГ	85	0.70	2	24	30	290
80	11	1	3,0	4ДЗ2ЛПД2КЛГ2ЯЗ	80	0.70	2	23	30	280
83	18		0,4	10ДЗ	72	0.60	1	23	30	280
89	4		2,0	8ДЗ1ЛПД1БРС+БП	87	0.60	2	24	36	270
98	14	1	3,0	7ДЗ1ГШ31КЛЯ1МДЕ	66	0.70	2	20	28	210
98	26		0,8	7ДЗ2ЛПД1КЛГ	78	0.60	2	21	26	210
113	13	1	2,0	3ДЗ2ЛПД3ЯЗ1ОС+КЛГ	80	0.70	3	21	30	230
114	25		0,8	4ДЗ4ЛПД1КЛГ1ЯЗ+БРС	60	0.60	2	21	32	180
119	11	1	2,5	6ДЗ3ЛПД1ЯЗ	70	0.70	3	20	28	220

В ході проведення лісопатологічного обстеження встановлено, що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження насаджень – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, лускатий трутовик, халаровий некроз, печіночниця звичайна, опеньок осінній, сірчано – жовтий трутовик, графіоз та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плоді тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем зі

зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
22	4	1	4,0	6ЛПДЗКЛГ1ДЗ+ОС+БП	55	0.70	2	22	30	320
33	14		5,1	5ЛПД2ОС2КЛГ1ДЗ+БРС	75	0.70	2	22	28	280
39	5		9,8	5ЛПД3ОС1КЛГ1ДЗ+АКБ+БП	75	0.60	2	23	32	290
71	7		4,6	5ЛПД2ОС2Д31БРС+КЛГ	65	0.70	3	20	28	270
76	11		1,4	6ЛПД2Д32ЯЗ+ОС	65	0.70	3	17	26	170
114	17	1	6,0	4ЛПД2ЯЗ2КЛГ1Д31ОС	60	0.70	2	22	28	270
119	12	1	3,0	6ЛПД2ЯЗ1Д31КЛГ	70	0.70	3	20	28	230

Лісопатологічним обстеженням встановлено, що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження насаджень – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: вертицильозне в'янення, несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, опеньок осінній, сірчано – жовтий трутовик та несправжній осиковий трутовик. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодови тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
24	35	1	1,0	10СЗ+ЛПД+КЛГ+БП	51	0.70	1А	23	28	355

При проведенні лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою та вертицильозним в'яненням. В насадженні присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
97	11		1,6	10ВЛЧ	55	0.70	2	21	26	220

В результаті проведення обстеження встановлено, що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження насаджень – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній вільховий трутовик, трутовик звичайний та сірчано – жовтий трутовик. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодови тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. В насадженні

присутні дерева вивалені з коренем зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
98	20		2,4	9КЛГ1ДЗ+ЯЗ	83	0.70	2	22	32	220

При проведенні лісопатологічного обстеження встановлено, що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження насаджень – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: вертицильозне в'янення, несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний та сірчано – жовтий трутовик. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодови тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хворобами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2026 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **186,6 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибів. Адже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.



Акт складено в 3 – х примірниках:

1 – ДСЛП «Харківлісозахист».

2 – ДП «Роменський агролісгосп».

3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

Підписи:

 А. Д. Воробей
 І. В. Рідкокаша
 М. І. Похил