

А К Т

обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок, в насадженнях Бережанського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

15 серпня 2025 р.

Бережанське надлісництво

Нами, заступником директора ДСЛП „Львівлісозахист” Василем СЕНИКОМ, інженером-лісопатологом Тернопільського ОЛП ДСЛП „Львівлісозахист” Марією Макарою, помічником начальника Бережанського надлісництва Філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» за участю інженера лісового господарства I категорії відділу лісового господарства філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Оксани БРИЛІНСЬКОЇ, та лісової охорони надлісництва з **04 серпня по 15 серпня 2025 року** проведено обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з веденням лісопатологічного журналу, з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарного рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог «Санітарних правил в лісах України». (далі – СПЛУ).

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2014 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок проведено на загальній площі **647,7 га.**

Бережанське лісництво:

Квартал 21 виділ 5 площа 2,2 га.

Граб звичайний уражений стовбуровими гнилями переважно в нижній прикореневій частині стовбура. На даних стовбурових гнилях в більшій їх частині спостерігаємо наявні **ризоморфи опенька осіннього**, а також життєдіяльність вторинних стовбурових шкідників.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними стовбуровими гнилями в різних частинах дерева.

Ступінь пошкодження насадження - середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 23 виділ 1 площа 9,4 га.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними стовбуровим гнилями в різних частинах дерева.

Береза повисла присутня в складі насадження перестійна, уражена стовбуровими гнилями по всій висоті стовбура.

На стовбурових гнилях берези та бука наявні ризоморфи **опенька осіннього**.

Граб звичайний, перестійний знаходиться в II ярусі насадження сильно пригнічений про, що свідчить значна частина водяних пагонів на деревах.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 35 виділ 10 площа 1,1 га. Бук лісовий уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. Злам вершин бука виявлено в поодиноких деревах. Також наявні мертві скелетні гілки в нижній частині крон дерев.

Ступінь пошкодження насадження- слабка.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев IV -VI категорій стану.

Квартал 46 виділ 1 площа 9,5 га. Бук лісовий уражений стовбуровими гнилями переважно в нижній прикореневій частині стовбура. На даних стовбурових гнилях в більшій їх частині спостерігаємо наявні **ризоморфи опенька осіннього**, а також життєдіяльність вторинних стовбурових шкідників.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними мертвими скелетними гілками в нижній і середній частині крони.

Ступінь пошкодження насадження- слабка.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 46 виділ 3 площа 8,1 га.

Граб звичайний та бук лісовий уражений стовбуровими гнилями переважно в нижній прикореневій частині стовбура. На даних стовбурових гнилях в більшій їх частині спостерігаємо наявні **ризоморфи опенька осіннього**, а також життєдіяльність вторинних стовбурових шкідників.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними мертвими скелетними гілками в нижній і середній частині крони.

Ступінь пошкодження насадження- слабка.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 52 виділ 26 площа 8,2 га. Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними **стовбуровим гнилями** в різних частинах дерева.

Граб звичайний знаходиться в II ярусі насадження сильно пригнічений про, що свідчить значна частина водяних пагонів на деревах

Ступінь пошкодження насадження- слабка.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев IV -VI категорій стану.

Квартал 52 виділ 30 площа 6,2 га. Граб звичайний та бук лісовий уражений стовбуровими гнилями переважно в нижній прикореневій частині стовбура. На даних стовбурових гнилях в більшій їх частині спостерігаємо наявні **ризоморфи опенька осіннього**, а також життєдіяльність вторинних стовбурових шкідників.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними мертвими скелетними гілками в нижній і середній частині крони.

Дерева берези повислої присутні в складі насадження фактично всі уражені стовбуровими гнилями.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Завалівське лісництво:

✓ **Квартал 8 виділ 29 площа 1,4 га.** Дерева берези повислої та граба звичайного уражені **стовбуровими гнилями**.

Граб звичайний та дуб звичайний відсталі в рості та ослаблені з наявними водяними пагонами на стовбурах.

Поодинокі дерева модрина європейської присутні в складі насадження мають злами вершин та нахил більше 30 градусів від осі стовбура.

Ступінь пошкодження насадження- слабка.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев IV -VI категорій стану.

✓ **Квартал 16 виділ 16 площа 4,6 га.** Граб звичайний та бук лісовий уражений стовбуровими гнилями переважно в нижній прикореневій частині стовбура. На даних стовбурових гнилях в більшій їх частині спостерігаємо наявні **ризоморфи опенька осіннього**, а також життєдіяльність вторинних стовбурових шкідників.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними мертвими скелетними гілками в нижній і середній частині крони.

Дерева берези та осики присутні в складі насадження фактично всі уражені стовбуровими гнилями.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 19 виділ 5 площа 2,6 га. Граб звичайний уражений стовбуровими гнилями переважно в нижній прикореневій частині стовбура. На даних стовбурових гнилях в більшій їх частині спостерігаємо наявні **ризоморфи опенька осіннього**, а також життєдіяльність вторинних стовбурових шкідників.

Ясень звичайний уражений халаровим некрозом (крона дуже ажурна, приріст відсутній, листя дуже дрібне, жовтіє, всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони), а також в нижній прикореневій частині стовбура наявні стовбурові гнилі.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними стовбуровим гнилями в різних частинах дерева.

Ступінь пошкодження насадження- слабка.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 23 виділ 4 площа 3,1 га. Граб звичайний переважно порослевого походження спостерігається поодинокі всихання дерев по всьому виділу. В нижній прикореневій частині дерев граба утворилися дупла з наявними стовбуровими гнилями на яких виявлені **ризоморфи опенька осіннього**.

Не значна частина дерев дуба звичайного уражена поперечний раком та водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження- слабка.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 31 виділ 7 площа 3,7 га. Граб звичайний, порослевого походження та бук лісовий уражений стовбуровими гнилями переважно в нижній прикореневій частині стовбура. На даних стовбурових гнилях в більшій їх частині спостерігаємо наявні **ризоморфи опенька осіннього**, а також життєдіяльність вторинних стовбурових шкідників.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними мертвими скелетними гілками в нижній і середній частині крони.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 31 виділ 8 площа 17,5 га. Граб звичайний та бук лісовий уражений стовбуровими гнилями переважно в нижній прикореневій частині стовбура. На даних стовбурових гнилях в більшій їх частині спостерігаємо наявні **ризоморфи опенька осіннього**, а також життєдіяльність вторинних стовбурових шкідників.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними мертвими скелетними гілками в нижній і середній частині крони.

Дерева берези повислої присутні в складі насадження фактично всі уражені стовбуровими гнилями.

Ступінь пошкодження насадження - середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 37 виділ 7 площа 2,5 га. Граб звичайний переважно порослевого походження спостерігається поодинокі всихання дерев по всьому виділу. В нижній прикореневій частині дерев граба утворилися дупла з наявними стовбуровими гнилями на яких виявлені ризоморфи **опенька осіннього**.

Не значна частина дерев дуба звичайного уражена поперечним раком та водяними пагонами.

Поодинокі дерева бука лісового уражені раковими утвореннями по всій висоті стовбура.

Ступінь пошкодження насадження - слабка.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 41 виділ 12 площа 6,0 га. Граб звичайний переважно порослевого походження. В нижній прикореневій частині дерев граба утворилися дупла з наявними стовбуровими гнилями на яких виявлені ризоморфи **опенька осіннього**.

На ослаблених деревах граба та дуба звичайного наявні водяні пагони по всій висоті стовбурів.

Осика та липа в даному насадженні уражені гнилями та стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження насадження - середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 47 виділ 8 площа 5,5 га. Граб звичайний переважно порослевого походження. В нижній прикореневій частині дерев граба утворилися дупла з наявними стовбуровими гнилями на яких виявлені ризоморфи **опенька осіннього**.

На ослаблених деревах граба та дуба звичайного наявні водяні пагони по всій висоті стовбурів.

Ступінь пошкодження насадження - середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 49 виділ 25 площа 2,5 га. Граб звичайний уражений стовбуровими гнилями переважно в нижній прикореневій частині стовбура. На даних стовбурових гнилях в більшій їх частині спостерігаємо наявні

ризоморфи опенька осіннього, а також життєдіяльність вторинних стовбурових шкідників.

Ясень звичайний уражений халаровим некрозом (крона дуже ажурна, приріст відсутній, листя дуже дрібне, жовтіє, всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони), а також в нижній прикореневій частині стовбура наявні стовбурові гнилі.

Не значна частина дерев дуба звичайного уражена поперечний раком.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 50 виділ 8 площа 1,0 га. Ясень звичайний уражений халаровим некрозом(крона дуже ажурна, приріст відсутній, листя дуже дрібне, жовтіє, всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони), а також в нижній прикореневій частині стовбура наявні стовбурові гнилі та ризоморфи **опенька осіннього**.

Не значна частина дерев дуба звичайного уражена поперечний раком.

Ступінь пошкодження насадження- слабка.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 50 виділ 9 площа 2,3 га. Граб звичайний, модрина європейська та уражені стовбуровими гнилями переважно в нижній прикореневій частині стовбура. На даних стовбурових гнилях в більшій їх частині спостерігаємо наявні **ризоморфи опенька осіннього**, а також життєдіяльність вторинних стовбурових шкідників.

Ступінь пошкодження насадження- слабка.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Козівське лісництво:

Квартал 14 виділ 8, площа 11,3 га. Виявлене поодинокі всихання дуба звичайного. Під корою мертвих дерев дуба наявні ходи вторинних шкідників , а також ризоморфи **опенька осіннього**.

Черешня лісова уражена стовбуровим гнилями. На не поодиноких стовбурах дерев черешні наявні ракові утворення та злами вершин..

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Ільм(берест) уражений **графіозом (голландською хворобою)** на стовбурах виявлено соковиділення, а також пожовтіле листя, суховершинність основних скелетних гілок крони та сліди заселення шкідників, а також мертві дерева.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 15 виділ 15 площа 5,8 га. Граб звичайний перестійний, порослевого походження уражений стовбуровими гнилями та **опеньком осіннім**, а також виявлені дуплистість, водяні пагони та мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони.

Черешня лісова уражена стовбуровим гнилями. На не поодиноких стовбурах дерев черешні наявні ракові утворення.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 15 виділ 16 площа 5,3 га. Граб звичайний перестійний, порослевого походження уражений стовбуровими гнилями та **опеньком осіннім**, а також виявлені дуплистість, водяні пагони та мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони.

Черешня лісова уражена стовбуровим гнилями. На не поодиноких стовбурах дерев черешні наявні ракові утворення.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 28 виділ 13 площа 6,7 га. Граб звичайний порослевого походження уражений стовбуровими гнилями та **опеньком осіннім**, а також виявлені дуплистість, водяні пагони та мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони.

Черешня лісова уражена стовбуровим гнилями. На не поодиноких стовбурах дерев черешні наявні ракові утворення.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 28 виділ 19 площа 7,4 га. Граб звичайний порослевого походження уражений стовбуровими гнилями та **опеньком осіннім**, а також виявлені дуплистість, водяні пагони та мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони.

Черешня лісова уражена стовбуровим гнилями та вітроломом(наявні злами крон). На не поодиноких стовбурах дерев черешні наявні ракові утворення.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 28 виділ 21 площа 2,6 га. Граб звичайний порослевого походження уражений стовбуровими гнилями та **опеньком осіннім**, а також виявлені дуплистість, водяні пагони та мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони.

Черешня лісова уражена стовбуровим гнилями. На не поодиноких стовбурах дерев черешні наявні ракові утворення.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій.

Квартал 30 виділ 9 площа 13,5 га. Клен гостролистий уражений стовбуровими гнилями, а також виявлені дуплистість, мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони та злами крон..

Ільм(берест) уражений **графіозом (голландською хворобою)** на стовбурах виявлено соковиділення, а також пожовтіле листя, суховершинність основних скелетних гілок крони та сліди заселення шкідників, а також мертві дерева.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 32 виділ 2, площа 6,3 га. Граб звичайний перестійний. уражений стовбуровими гнилями та **опеньком осіннім**, а також виявлені дуплистість, водяні пагони та мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони.

Ільм(берест) уражений **графіозом (голландською хворобою)** на стовбурах виявлено соковиділення, а також пожовтіле листя, суховершинність основних скелетних гілок крони та сліди заселення шкідників, а також мертві дерева.

Клен гостролистий уражений стовбуровими гнилями, а також виявлені дуплистість, мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони та злами крон.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 36, виділ 4, площа 1,3 га.

Дерева вільхи чорної, клена та деяких інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями**.

Насадження ослаблене, окремі дерева сухостійні або всихаючі.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 36, виділ 7, площа 4,2 га.

Граб звичайний, черешня, деякі дерева дуба звичайного та інших порід уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**. Деякі дерева сухостійні, сильно ослаблені з наявними мертвими скелетними гілками в нижній і середній частині крони. В кроні деяких дерев присутні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 36, виділ 9, площа 5,0 га.

Дерева граба звичайного, клена та деяких інших порід з наявними стовбуровими гнилями в нижній та середній частині. В місцях гнилей, поодиноких дерев, наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Наявні дерева ясена звичайного уражені некрозом кореневої системи, всихає більша половина крони.

Ялина європейська сухостійна або всихає в наслідок ураження опеньком осіннім.

На стовбурах сухостійних дерев наявні ризоморфи опенька осіннього (під корою) та отвори стовбурових шкідників.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 37, виділ 13, площа 5,0 га.

Дерева граба звичайного, клена, деякі дуба звичайного та інших порід з наявними **гнилями** в різних частинах стовбура. На окремих деревах спостерігаються механічні пошкодження стовбура.

Присутні дерева з нахилом стовбура та дугоподібно вигнутими стовбурами.

Ступінь пошкодження - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 37, виділ 16, площа 6,2 га.

Граб звичайний, дуб червоний, деякі дерева дуба звичайного та інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями**. Деякі дерева сухостійні та з нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 38, виділ 20, площа 6,0 га.

Клен явір, береза повисла та деякі дерева інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями**. На стовбурах та у кроні дерев берези наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Поодинокі дерева сухостійні або всихаючі.

Присутній ясен звичайний уражений некрозом кореневої системи, крона дуже ажурна, більша половина крони сухостійна.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Конюхівське лісництво:

Квартал 21 виділ 7 площа 2,3 га. Виявлено поодинокі всихання дерев модрина європейської по всій площі виділу та дерева з підірваною кориневою системою і нахилів стовбурів більше 30 градусів від осі, а також злам крони 1/2, 2/3 висоти. На зламаних кронах, вітровальних та мертвих деревах спостерігається локальне відшарування кори і заселення **стовбуровими та технічними шкідниками** (короїдами, а також лубоїдом сосновим малим та вусачами) про, що свідчать численні отвори в корі та в стовбурі дерева.

Граб звичайний знаходиться в II ярусі насадження сильно пригнічений про, що свідчить значна частина водяних пагонів на деревах

Ступінь пошкодження — середня.

Відведення у ВСР проведено за рахунок дерев IV -VI категорій стану.

Квартал 32 виділ 3 площа 8,4 га. Граб звичайний перестійний. уражений стовбуровими гнилями та **опеньком осіннім**, а також виявлені дуплистість, водяні пагони та мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони.

Бук лісовий та дуб звичайний уражений стовбуровими гнилями, а також з наявними мертвими скелетними гілками в нижній і середній частині крони.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 35 виділ 4 площа 16,0 га. Граб звичайний уражений стовбуровими гнилями та **опеньком осіннім**, а також виявлені дуплистість, водяні пагони та мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони. Всихання граба поодинокі та групові.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 43 виділ 3 площа 5,1 га. Бук звичайний, модрина європейська та дуб звичайний уражені стовбуровими гнилями переважно в нижній прикореневій частині стовбура. На даних стовбурових гнилях в більшій їх частині спостерігаємо наявні ризоморфи **опенька осіннього**, а також життєдіяльність вторинних стовбурових шкідників.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Нараївське лісництво:

Квартал 6 виділ 2 площа 9,5 га. Граб звичайний перестійний переважно порослевого походження уражений стовбуровими гнилями та **опеньком осіннім**, а також виявлені дуплистість, водяні пагони та мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони.

Дуб звичайний уражений стовбуровими гнилями в нижній частині стовбурів. На деревах дуба сильно ослаблених наявні водяні пагони.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 7 виділ 7 площа 20,0 га. Граб звичайний порослевого походження уражений стовбуровими гнилями та **опеньком осіннім**, а також виявлені дуплистість, водяні пагони та мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони.

Черешня лісова уражена стовбуровим гнилями та вітроломом(наявні злами крон). На не поодиноких стовбурах дерев черешні наявні ракові утворення.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 15 виділ 10 площа 6,2 га. Граб звичайний знаходиться в II ярусі насадження сильно пригнічений про, що свідчить значна частина водяних пагонів на деревах . Всихання поодинокі на мертвих деревах граба наявні ризоморфи **опенька осіннього**.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними стовбуровими гнилями в різних частинах дерева.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 25 виділ 5, площа 37,5 га (рубку 19,0 га). Ясень звичайний у складі насадження уражений халаровим некрозом (наявні гнилі в нижній прикореневій частині стовбура та лап, ризоморфи **опенька осіннього** а також крона дуже ажурна, приріст відсутній, листя дуже дрібне, жовтіє, всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони.

Береза повисла, уражена стовбуровими гнилями, частина дерев мертвих з наявними плодовими тілами березової губки на стовбурах.

Вільха чорна порослевого походження уражена стовбуровими гнилями в нижній прикореневій частині стовбура на яких виявлені ризоморфи **опенька осіннього** та заселення технічних шкідників.

Граб звичайний перестійний значна частина дерев якого уражена стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбура. Гілки граба I та II порядку мертві або вмираючі.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 26 виділ 2 площа 5,7 га. Граб звичайний порослевого походження уражений стовбуровими гнилями та **опеньком осіннім**, а також виявлені дуплистість, водяні пагони та мертві скелетні гілки в нижній і середній частині крони.

Бук лісовий уражений стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбурів. Злам вершин бука виявлено в поодиноких деревах. Також наявні мертві скелетні гілки в нижній частині крон дерев.

Акація біла яка є в складі насадження уражена стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбура з наявними ознаками присутності стовбурових шкідників.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 27 виділ 18 площа 9,6 га. Граб звичайний переважно порослевого походження, знаходиться в II ярусі насадження сильно пригнічений про, що свідчить значна частина водяних пагонів на деревах .

Всихання поодинокі на мертвих деревах грабе наявні ризоморфи **опенька осіннього**.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 29 виділ 11 площа 3,7 га. Граб звичайний порослевого походження. В нижній прикореневій частині дерев граба виявлені гнилі з ознаками загнивання, як стовбура так і кореневої системи. Частина дерев граба знаходиться в II ярусі насадження і є пригнічена, що свідчить значна кількість водяних пагонів на стовбурах. На мертвих деревах граба під корою виявлені ризоморфи **опенька осіннього**.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними мертвими скелетними гілками в нижній і середній частині крони.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 29 виділ 12 площа 8,7 га. Граб звичайний порослевого походження. В нижній прикореневій частині дерев граба виявлені гнилі з ознаками загнивання, як стовбура так і кореневої системи. Частина дерев граба знаходиться в II ярусі насадження і є пригнічена, що свідчить значна кількість водяних пагонів на стовбурах. На мертвих деревах граба під корою виявлені ризоморфи **опенька осіннього**.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними мертвими скелетними гілками в нижній і середній частині крони.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 42 виділ 5 площа 12,7 га. Граб звичайний знаходиться в II ярусі насадження сильно пригнічений про, що свідчить значна частина водяних пагонів на деревах. Всихання поодинокі на мертвих деревах грабе наявні ризоморфи **опенька осіннього**.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними стовбуровим гнилями в різних частинах дерева. На окремих деревах бука наявні соковиділення на стовбурах.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 52 виділ 7 площа 8,2 га (в рубку 7,2 га). Граб звичайний порослевого походження. В нижній прикореневій частині дерев граба виявлені гнилі з ознаками загнивання, як стовбура так і кореневої системи. Частина дерев граба знаходиться в II ярусі насадження і є пригнічена, що свідчить

значна кількість водяних пагонів на стовбурах. На мертвих деревах граба під корою виявлені ризоморфи **опенька осіннього**.

Виявлено поодинокі всихання дерев модрина європейської по всій площі виділу та дерева з підірваною кориневою системою і нахилів стовбурів більше 30 градусів від осі, а також злам крони 1/2, 2/3 висоти. На зламаних кронах, вітровальних та мертвих деревах спостерігається локальне відшарування кори і заселення стовбуровими та технічними шкідниками (короїдами, а також лубоїдом сосновим малим та вусачами) про, що свідчать численні отвори в корі та в стовбурі дерева.

Ступінь пошкодження насадження- слабка.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 52 виділ 8 площа 5,1 га. Граб звичайний перестійний. В нижній прикореневій частині дерев граба виявлені гнилі з ознаками загнивання, як стовбура так і кореневої системи. Частина дерев граба знаходиться в II ярусі насадження і є пригнічена, що свідчить значна кількість водяних пагонів на стовбурах. На мертвих деревах граба під корою виявлені ризоморфи **опенька осіннього**.

Ступінь пошкодження насадження- слабка.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 59 виділ 1 площа 27,3 га. Граб звичайний порослевого походження. В нижній прикореневій частині дерев граба виявлені гнилі з ознаками загнивання, як стовбура так і кореневої системи. Частина дерев граба знаходиться в II ярусі насадження і є пригнічена, що свідчить значна кількість водяних пагонів на стовбурах. На мертвих деревах граба під корою виявлені ризоморфи **опенька осіннього**.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними мертвими скелетними гілками в нижній і середній частині крони.

Береза повисла присутня в складі насадження перестійна, уражена стовбуровими гнилями по всій висоті стовбура.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 59 виділ 4 площа 3,1 га. Граб звичайний порослевого походження. В нижній прикореневій частині дерев граба виявлені гнилі з ознаками загнивання, як стовбура так і кореневої системи. Частина дерев граба знаходиться в II ярусі насадження і є пригнічена, що свідчить значна кількість водяних пагонів на стовбурах. На мертвих деревах граба під корою виявлені ризоморфи **опенька осіннього**.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними мертвими скелетними гілками в нижній і середній частині крони.

Береза повисла присутня в складі насадження перестійна, уражена стовбуровими гнилями по всій висоті стовбура.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 59 виділ 6 площа 3,2 га. Граб звичайний порослевого походження. В нижній прикореневій частині дерев граба виявлені гnilі з ознаками загнивання, як стовбура так і кореневої системи. Частина дерев граба знаходиться в II ярусі насадження і є пригнічена, що свідчить значна кількість водяних пагонів на стовбурах. На мертвих деревах граба під корою виявлені ризоморфи **опенька осіннього**.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними мертвими скелетними гілками в нижній і середній частині крони.

Береза повисла присутня в складі насадження перестійна, уражена стовбуровими гнилями по всій висоті стовбура.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 63 виділ 10 площа 9,5 га. Граб звичайний порослевого походження. В нижній прикореневій частині дерев граба виявлені гnilі з ознаками загнивання, як стовбура так і кореневої системи. Частина дерев граба знаходиться в II ярусі насадження і є пригнічена, що свідчить значна кількість водяних пагонів на стовбурах. На мертвих деревах граба під корою виявлені ризоморфи **опенька осіннього**.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними мертвими скелетними гілками в нижній і середній частині крони.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 68 виділ 5, площа 6,0 га. Береза повисла, уражена стовбуровими гнилями, частина дерев мертвих з наявними плодовими тілами березової губки на стовбурах.

Вільха чорна порослевого походження уражена стовбуровими гнилями в нижній прикореневій частині стовбура на яких виявлені **ризоморфи опенька осіннього** та заселення технічних шкідників.

Граб звичайний перестійний значна частина дерев якого уражена стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбура. Гілки граба I та II порядку мертві або вмираючі.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 69 виділ 2 площа 15,5 га. Граб звичайний порослевого походження. В нижній прикореневій частині дерев граба виявлені гнилі з ознаками загнивання, як стовбура так і кореневої системи. Частина дерев граба знаходиться в II ярусі насадження і є пригнічена, що свідчить значна кількість водяних пагонів на стовбурах. На мертвих деревах граба під корою виявлені ризоморфи **опенька осіннього**.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними мертвими скелетними гілками в нижній і середній частині крони.

Ясень звичайний уражений халаровим некрозом(крона дуже ажурна, приріст відсутній, листя дуже дрібне, жовтіє, всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони), а також в нижній прикореневій частині стовбура наявні стовбурові гнилі.

Клени гостролисті та явір порослевого походження уражені стовбуровими гнилями в нижній частині стовбура.

Ступінь пошкодження насадження- середня.

Відведення у ВСР доцільно провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Підгаєцьке лісництво:

Квартал 2 виділ 2 площа 25,3 га(в рубку 15,3 га) - Граб звичайний, перестійний знаходиться в пригніченому стані: суховершинний, наявні стовбурові гнилі, водяні пагони, дуплистість та мертві скелетні гілки . На сухостійних та ослаблених деревах граба виявлено **ризоморфи опенька осіннього**, а також буро́ва мука від життєдіяльності технічних шкідників.

Дуб звичайний уражений стовбуровими гнилями та трутовиками з наявними механічними пошкодженнями в нижній частині стовбурів.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок III-V категорій стану дерев.

Квартал 17 виділ 1 площа 34,5 га(в рубку 26,5 га) - Граб звичайний, перестійний знаходиться в пригніченому стані: суховершинний, наявні стовбурові гнилі, водяні пагони, дуплистість та мертві скелетні гілки . На сухостійних та ослаблених деревах граба виявлено **ризоморфи опенька осіннього**, а також буро́ва мука від життєдіяльності технічних шкідників.

Дуб звичайний уражений стовбуровими гнилями та має механічні пошкодження в нижній частині стовбурів.

Липа дрібнолиста уражена стовбуровими гнилями та раковим утвореннями по всій висоті стовбурів.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок III-V категорій стану дерев.

Квартал 21 виділ 4, площа 27,5 га(в рубку 19,5 га) - Граб звичайний, знаходиться в пригніченому стані: суховершинний, наявні стовбурові гнилі, водяні пагони, дуплистість та мертві скелетні гілки . На сухостійних та ослаблених деревах граба виявлено **ризоморфи опенька осіннього**, а також

бурова мука від життєдіяльності технічних шкідників.

Дуб звичайний уражений стовбуровими гнилями та має механічні пошкодження в нижній частині стовбурів.

Липа дрібнолиста уражена стовбуровими гнилями та раковим утвореннями по всій висоті стовбурів.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок IV-V категорій стану дерев.

Литвинівське лісництво:

Квартал 4 виділ 9 площа 1,5 га. Крони дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтуватو-зелена, приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. На стовбурах сухостійних дерев сосни виявлено посиніння заболоні та деревини, що свідчить про присутність **офіостомових грибів**. На мертвих деревах сосни звичайної з локальним відшаруванням кори, виявлені **ходи та отвори від життєдіяльності технічних шкідників** (лубоїдів, вусачів). Значна кількість дерев сосни пошкоджених вітром і має нахил стовбурів більше 30 градусів від осі дерева.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 4 виділ 10 площа 2,3 га. Крони дерев сосни дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній також всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. На стовбурах сухостійних дерев сосни виявлено посиніння заболоні та деревини, що свідчить про присутність **офіостомових грибів**. На мертвих деревах сосни звичайної з локальним відшаруванням кори, виявлені **ходи та отвори від життєдіяльності технічних шкідників** (лубоїдів, вусачів). Значна кількість дерев сосни пошкоджених вітром і має нахил стовбурів більше 30 градусів від осі дерева.

На даному таксаційному виділі наявна значна кількість неліквідної деревини.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 4 виділ 11 площа 5,3 га Ясень звичайний уражений халаровим некрозом, більшість скелетних гілок мертві в прикореневій частині стовбури та вітровальних деревах наявні гнилі на яких виявлені ризоморфи **опенька осіннього**.

Також на стовбурах ясеня явні ознаки діяльності технічних шкідників (наявна бутова мука).

Берест пошкоджений судинним мікозом сильно ослаблений листя дрібне нижні скелетні гілки мертві.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 5 виділ 2 площа 22,4 га(в рубку 5,0 га) Ясень звичайний уражений халаровим некрозом, більшість скелетних гілок мертві в прикореневій частині стовбурі та вітровальних деревах наявні гнилі на яких виявлені ризоморфи **опенька осіннього**.

Також на стовбурах ясеня явні ознаки діяльності технічних шкідників (наявна бурова мука).

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Бучацьке лісництво:

Квартал 43, виділ 7, площа 2,7 га.

Граб звичайний, береза повисла, деякі дерева дуба звичайного та інших порід уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, поодинокі дерева сухостійні. Також наявні поодинокі буреломні та вітровальні дерева.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 57, виділ 3, площа 7,0 га.

Дерева граба звичайного, берези повислої, дуба звичайного та деяких інших порід з наявними **гнилями** в різних частинах стовбура, поодинокі сухостійні та буреломні.

Поодинокі дерева дуба уражені поперечним раком рана якого охоплює 100 відсотків периметра стовбура.

В нижній частині стовбура деяких дерев спостерігаються механічні пошкодження.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Дорогичівське лісництво:

Квартал 25, виділ 18, площа 8,8 га.

Насадження є осередком **опенька осіннього**.

Ялина європейська ослаблена, хвоя жовтуватозелена, всихає більше половини скелетних гілок по всій висоті крони. На стовбура сухостійних та ослаблених дерев наявні ризоморфи **опенька осіннього** та сліди діяльності стовбурових шкідників.

Ступінь пошкодження насадження - середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III -VI категорій стану.

Квартал 27, виділ 1, площа 9,2 га.

Спостерігається ослаблення та ураження дерев стовбуровими та прикореневими **гнилями**, граб звичайного, дуба звичайного та інших порід.

Деякі дерева сухостійні або всихає більше ніж 2/3 крони. Наявні дерева відсталі в рості та пригнічені.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 32, виділ 6, площа 24,1 га.

Дуб червоний та звичайний ослаблений, уражений **гнилями** в нижній та середній частині стовбура. На стовбурах сухостійних та ослаблених дерев наявні отвори та ходи стовбурових шкідників.

Дерева граба звичайного, берези повислої, осики та деяких інших порід з наявними стовбуровими гнилями та плодовими тілами дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 89, виділ 34, площа 10,2 га.

Клен явір, липа дрібнолиста та деякі дерева інших порід ослаблені, уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, поодинокі дерева пригнічені і сухостійні. Присутні дерева з дугоподібно вигнутими стовбурами та нахилом більше ніж 30 градусів від вертикальної осі.

Ясен звичайний уражений некрозом кореневої системи, всихає більше половини крони.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 92, виділ 2, площа 0,5 га.

Поодинокі дерева черешні, клена та деяких інших порід уражені стовбуровими **гнилями**. Також присутні дерева з нахилом стовбура більше ніж 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 92, виділ 5, площа 0,8 га.

Дерева граба звичайного, клена, окремі дерева дуба звичайного з наявними стовбуровими гнилями.

Ясен звичайний уражений халаровим **некрозом** (крона дуже ажурна, приріст відсутній, листя дуже дрібне, жовтіє, всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони).

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 92, виділ 8, площа 0,9 га.

Ясен звичайний уражений халаровим **некрозом** (крона дуже ажурна, приріст відсутній, листя дуже дрібне, жовтіє, всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони), а також в нижній прикореневій частині стовбура наявні стовбурові гнилі на яких виявлені отвори від життєдіяльності шкідників.

Деякі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 92, виділ 20, площа 6,0 га.

Граб звичайний, клен, деякі дерева дуба звичайного та інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями**, окремі дерева сухостійні або всихає більше ніж 2/3 крони. Присутні дерева з механічним пошкодженням стовбура.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Золотопотіцьке лісництво:

Квартал 2, виділ 12, площа 6,0 га.

Граб звичайний, дуб звичайний та окремі дерева інших порід уражені **гнилями** в нижній та середній частині стовбура.

На стовбурах пошкоджених дерев наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Деякі дерева пригнічені, відсталі в рості, сухостійні або всихають.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 5, виділ 1, площа 4,5 га.

Дерева граба звичайного, деякі дуба звичайного та інших порід з наявними **гнилями** в різних частинах стовбура. Окремі дерева дуба уражені поперечним раком рана якого охоплює 100 відсотків периметра стовбура.

На стовбурах дерев бука лісового спостерігається ураження **гнилями** та раковими утвореннями.

Наявні дерева ялини європейської сильно ослаблені, сухостійні, із слідами діяльності шкідників.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 39, виділ 4, площа 5,0 га.

Граб звичайний, деякі дерева дуба звичайного та інших порід ослаблені, уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**. Деякі дерева сухостійні або всихає більше ніж на 2/3 крони. Присутні дерева з механічним пошкодженням стовбура.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 45, виділ 1, площа 1,7 га.

Дерева граба звичайного, берези повислої, поодинокі дерева дуба звичайного та інших порід з наявними **гнилями** в нижній та середній частині стовбура, деякі дерева сухостійні або всихає більше ніж 2/3 крони. Також спостерігаються плодові тіла дереворуйнівних грибів у кроні та на стовбурах дерев.

Наявні дерева ясена звичайного уражені некрозом кореневої системи.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 45, виділ 4, площа 6,7 га.

Дерева граба звичайного, берези повислої, черешні уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, поодинокі дерева сухостійні та вітровальні. На стовбурах вітровальних та сухостійних дерев наявні сліди діяльності шкідників.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 44, виділ 10, площа 4,5 га.

Частина дерев граба звичайного, деякі дуба звичайного та інших порід уражені **гнилями** в різних частинах стовбура. Поодинокі дерева сухостійні та всихаючі. Присутні дерева з механічним пошкодженням стовбура, а також з дугоподібно зігнутими стовбурами.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 47, виділ 1, площа 2,4 га.

Граб звичайний, береза повисла, деякі дерева дуба звичайного ослаблені уражені стовбуровими **гнилями**, поодинокі дерева сухостійні.

Присутній ясен звичайний уражений некрозом кореневої системи, крона дуже ажурна, більша половина крони сухостійна.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 52, виділ 10, площа 6,5 га.

Дерева граба звичайного, осики деякі дерева дуба звичайного та інших порід уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, окремі дерева сухостійні.

На стовбурах сухостійних дерев та в місцях механічних пошкоджень спостерігаються сліди діяльності стовбурових шкідників.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 54, виділ 7, площа 11,5 га.

Граб звичайний, бук лісовий, деякі дерева дуба звичайного та інших порід ослаблені, уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, поодинокі дерева сухостійні. Дерева бука з численними раковими утвореннями.

Присутні дерева з дугоподібно вигнутими стовбурами та нахилом більше ніж 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 56, виділ 1, площа 4,9 га.

Дуб червоний з наявними **гнилями** в нижній та середній частині стовбура, деякі дерева сухостійні та з механічними пошкодженнями.

Присутні дерева ясена звичайного уражені некрозом кореневої системи.

Деякі дерева з підірваною кореневою системою та нахилом стовбура.

Поодинокі дерева вітровальні.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 56, виділ 13, площа 19,5 га.

Дерева граба звичайного, дуба звичайного, липи уражені **гнилями** в нижній та середній частині стовбура, на деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Присутні дерева ясена звичайного уражені некрозом кореневої системи. Також наявні дерева з дугоподібно вигнутими стовбурами та нахилом понад 30 градусів. Деякі дерева сухостійні, сильно ослаблені.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 62, виділ 1, площа 4,5 га.

Ясен звичайний уражений некрозом кореневої системи. На коренях та стовбурах вітровальних дерев наявні ризоморфи **опенька осіннього**.

Деякі дерева граба звичайного, дуба звичайного, берези повислої та інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими гнилями. Поодинокі дерева пригнічені, відсталі в рості, сухостійні або всихаючі.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 66, виділ 9, площа 7,3 га.

Дерева граба звичайного, дуба звичайного та інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями**.

Поодинокі дерева дуба уражені поперечним раком. рана якого охоплює 100 відсотків периметра стовбура.

Деякі дерева з механічним пошкодженням стовбура та сухостійні.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 66, виділ 11, площа 1,9 га.

Ясен звичайний уражений халаровим **некрозом**(крона дуже ажурна, приріст відсутній, листя дуже дрібне, жовтіє, всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони).

Граб звичайний, та деякі дерева інших порід ослаблені, уражені стовбуровими гнилями.

На стовбурах ослаблених дерев спостерігається діяльність шкідників.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 66, виділ 12, площа 1,1 га.

Дерева граба звичайного, черешні, окремі дуба звичайного та деяких інших порід з наявними **гнилями** в різних частинах стовбура. Поодинокі дерева сухостійні, відсталі в рості та пригнічені.

Наявні дерева з механічним пошкодженням стовбура.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 66, виділ 15, площа 2,5 га.

Граб звичайний ослаблений, в нижній та середній частині стовбура наявні **гнилі**. Деякі дерева дуба звичайного з наявними механічними пошкодженнями та гнилями в нижній частині стовбура.

По всій площі виділу спостерігаються відсталі в рості, пригнічені та сухостійні дерева.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Язловецьке лісництво:

Квартал 1, виділ 8, площа 1,0 га.

Деякі дерева граба звичайного, дуба звичайного та деяких інших порід з наявними **гнилями** в нижній та середній частині стовбура. Також спостерігається всихання нижніх скелетних гілок, окремі дерева сухостійні.

Присутні дерева з нахилом стовбура більше ніж 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 21, виділ 8, площа 3,0 га.

Дуб червоний, граб звичайний, деякі дерева дуба звичайного та інших порід ослаблені, на стовбурах дерев наявні **гнилі** та плодові тіла дереворуйнівних грибів. Поодинокі дерева сухостійні або всихає 2/3 крони.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 26, виділ 15, площа 3,3 га.

Граб звичайний, деякі дерева дуба звичайного та інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями**, окремі дерева сухостійні або всихає більше ніж 2/3 крони. Поодинокі дерева дуба звичайного уражені поперечним раком, рана якого охоплює 100 відсотків периметра стовбура.

Присутні дерева ясена звичайного уражені некрозом кореневої системи, всихає більша половина крони.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 29, виділ 7, площа 6,1 га.

Деякі дерева граба звичайного, берези повислої, дуба звичайного та інших порід з наявними стовбуровими **гнилями** (на окремих деревах рана довжиною до одного метра), поодинокі дерева сухостійні.

Також спостерігаються дерева вітровальні та із нахилом стовбура більше ніж 30 градусів до вертикальної осі.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 42, виділ 12, площа 2,6 га.

Береза повисла, граб звичайний та деякі дерева інших порід уражені стовбуровими **гнилями** переважно в нижній та прикореневій частині стовбура. На даних стовбурових гнилях, в більшій їх частині, спостерігаємо життєдіяльність вторинних стовбурових шкідників.

Присутні дерева з наявними мертвими скелетними гілками в нижній і середній частині крони. Деякі дерева із зломаними стовбурами та вітровальні.

Дерева берези пошкоджені в наслідок підсочки минулих років.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 46, виділ 8, площа 5,2 га.

Граб звичайний, осика деякі дерева інших порід ослаблені, уражені стовбуровими та прикореневими гнилями, поодинокі дерева сухостійні.

Дерева сосни звичайної ослаблені, хвоя жовто-зелена, а крона дуже ажурна, спостерігається поодиноке всихання. На стовбурах вітровальних дерев наявні ризоморфи **опенька осіннього** та сліди діяльності стовбурових шкідників.

Окремі дерева дуба звичайного уражені поперечним раком, рана охоплює 100 відсотків пре метра стовбура.

Ступінь пошкодження - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 46, виділ 15, площа 2,6 га.

Граб звичайний уражений стовбуровими гнилями переважно в нижній прикореневій частині стовбура. На даних стовбурових гнилях в більшій їх частині спостерігаємо наявність ризоморф **опенька осіннього**, а також життєдіяльність вторинних стовбурових шкідників.

Деякі дерева дуба звичайного всихаючі з численними водяними пагонами по всій висоті стовбура.

Ясен звичайний, який присутній у складі насадження, уражений халаровим некрозом (крона дуже ажурна, приріст відсутній, листя дуже дрібне, жовтіє, всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони), а також в нижній прикореневій частині стовбура наявні стовбурові гнилі.

Ступінь пошкодження насадження - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III - VI категорій стану.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі **647,7 га** при цьому виявлено:

Опеньок осінній – 431,3 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 93,1 га
- середня ступінь пошкодження – 338,2 га

Стовбурові та кореневі гнилі – 193,2 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 174,3 га
- середня ступінь пошкодження – 18,9 га

Некроз – 17,1 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 3,6 га
- середня ступінь пошкодження – 13,5 га

Стовбурові шкідники – 6,1 га, а саме:


- слабка ступінь пошкодження – 1,5 га
- середня ступінь пошкодження – 4,6 га

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог СПЛУ провести вибіркові санітарні рубки на площі 647,7 га.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

Заступник директора
ДСЛП "Львівлісозахист"



Василь СЕНИК

Інженер-лісопатолог
Тернопільського ОЛПП
ДСЛП «Львівлісозахист»



Марія МАКАРА

Помічник начальника
Бережанського надлісництва
філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Микола КОВАЛЬЧУК

Інженер лісового господарства I категорії
відділу лісового господарства
філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Оксана БРИЛІНСЬКА