

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркового санітарного рубок
в насадженнях Сокальського ДЛГП „Галсільліс”

19 грудня 2025 року

м. Сокаль

Мною, провідним інженером-лісопатологом ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист” Олегом МАСНИМ, в присутності головного лісничого Сокальського ДЛГП „Галсільліс” Андрія Микитюка, лісничої Реклинецького лісництва Мирослави РОМАНЧУК і лісничого Сокальського лісництва Олега БУРДИ за участю лісової охорони підприємства з **15 по 19 грудня 2025 року** проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркового санітарного рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарного рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог „Санітарних правил в лісах України” (далі – СПЛУ).

Лісопатологічний журнал додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2012 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок проведено на загальній площі **117,1 га**.

Реклинецьке лісництво

Квартал 1, виділ 11.3, площа 3,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірково санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 1, виділ 11.4, площа 2,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком

осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 1, виділ 16.1, площа 3,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 2, виділ 1.1, площа 3,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 3, виділ 11.3, площа 2,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

При обстеженні виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, бурова мука).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 3, виділ 15.3, площа 2,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 5, виділ 2.4, площа 2,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 7, виділ 6, площа 2,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 12, виділ 7.6, площа 2,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 14, виділ 24, площа 0,7 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 16, виділ 15, площа 1,8 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 16, виділ 23, площа 1,9 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 16, виділ 27, площа 0,9 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 28, виділ 8.3, площа 2,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 28, виділ 23, площа 3,4 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 29, виділ 6, площа 0,6 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 30, виділ 10.6, площа 2,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 31, виділ 45, площа 3,1 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 32, виділ 22.1, площа 4,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 32, виділ 31.1, площа 4,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 33, виділ 14, площа 2,6 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На

ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 34, виділ 2.1, площа 2,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 34, виділ 14, площа 0,9 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 35, виділ 34.2, площа 1,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 41, виділ 15, площа 0,8 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 46, виділ 2.5, площа 2,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової

групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 47, виділ 2, площа 1,3 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Сокальське лісництво

Квартал 1, виділ 11.1, площа 4,6 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони по характеру розміщення стоять як поодинокі так і цілими групами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 1, виділ 11.2, площа 2,2 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони по характеру розміщення стоять як поодинокі так і цілими групами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 1, виділ 13.1, площа 15,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони по характеру розміщення стоять як поодинокі так і цілими групами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 6, виділ 3 площа 2,9 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони по характеру розміщення стоять як поодинокі так і цілими групами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 6, виділ 16.1 площа 2,6 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони по характеру розміщення стоять як поодинокі так і цілими групами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 8, виділ 39 площа 1,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони по характеру розміщення стоять як поодинокі так і цілими групами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 9, виділ 23 площа 3,1 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони по характеру розміщення стоять як поодинокі так і цілими групами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 10, виділ 19 площа 1,5 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони по характеру розміщення стоять як поодинокі так і цілими групами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 18, виділ 53, площа 2,8 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 18, виділ 60, площа 0,7 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 24, виділ 18, площа 2,8 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 38, виділ 37, площа 5,6 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 38, виділ 39, площа 4,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 40, виділ 51, площа 1,4 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 40, виділ 55, площа 2,2 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 41, виділ 22.1, площа 2,9 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 41, виділ 23, площа 4,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На

ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 41, виділ 24, площа 1,8 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламани дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на 29 ділянці площею 117,1 га, при цьому виявлено:

Стовбурові шкідники – 117,1 га (слабка ступінь пошкодження).

2. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибірккові санітарні рубки на площі **90,9 га.**


3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень

Провідний інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист”
Головний лісничий Сокальського
ДЛГП „Галсільліс”
Лісничка Реклинецького лісництва
Сокальського
ДЛГП „Галсільліс”

Лісничий Сокальського лісництва
Сокальського
ДЛГП „Галсільліс”



Олег МАСНИЙ



Андрій МИКИТЮК



Мирослава РОМАНЧУК

Олег БУРДА

Сокальские ДЛТН, Галицкий

Постійний лісокористувач
Лісництво *Сокальське*

Dichloro:

Діагностичний журнал склав:

Tipul. imc. ricovaiolai-

Підпис: Вануш О.Мас

Лісопатологічний журнал

Постійний лісокористувач Сондальське ФЛГП "Галське"

Лісництво Рекланецьке

№ п/п	Квар-тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування				Лісопатологічна характеристика	Пошкод-жена площа (га)	Необ-хідні заходи	Примітка
				Склад насадження	Вік	Пов-нота	Запас (м³ га)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	11.3	34.5	10Сх+ВЛП+БП	54	0.55	220	Комплексний осередок корд. 6 і 0г	3.0	ВСП	Смбна ст.
	1	11.4	34.5	10Сх+ВЛП+БП	54	0.55	220	" "	2.0	ВСП	" "
	1	16.1	4.8	10Сх	48	0.60	280	" "	3.0	ВСП	" "
	2	1.1	5.1	10Сх	54	0.50	200	" "	3.0	" "	" "
	3	11.3	13.0	10Сх	55	0.50	220	" "	2.0	" "	" "
	3	15.3	27.5	10Сх+ВЛП	53	0.55	250	" "	2.0	" "	" "
	5	2.4	7.9	10Сх+ВЛП+ВЛП	42	0.55	200	" "	2.0	" "	" "
	7	6	2.0	10Сх	45	0.50	180	" "	2.0	" "	" "
	12	7.6	30.0	10Сх	49	0.60	250	" "	2.0	" "	" "
	14	24	0.7	10Сх+ВЛП	55	0.60	260	" "	0.7	" "	" "
	16	15	1.8	10Сх+ВЛП+ВЛП	55	0.65	320	" "	1.8	" "	" "
	16	23	1.9	7Сх+ВЛП+ВЛП+ВЛП	35	0.65	180	" "	1.9	" "	" "
	16	27	0.9	10Сх+ВЛП+ВЛП	28	0.75	190	" "	0.9	" "	" "
	28	8.3	18.8	10Сх+ВЛП	65	0.65	260	" "	2.0	" "	" "
	28	23	3.4	8Сх+ВЛП	49	0.75	310	" "	3.4	" "	" "
	29	6	0.6	10Сх	49	0.60	280	" "	0.6	" "	" "
	30	10.6	16.0	10Сх	40	0.70	230	" "	2.0	" "	" "
	31	45	3.1	10Сх	42	0.75	250	" "	3.1	" "	" "
	32	22.1	8.2	10Сх	52	0.65	280	" "	4.0	" "	" "
	32	31.1	7.0	10Сх+ВЛП	43	0.70	280	" "	4.0	" "	" "
	33	14	2.6	6Сх+ВЛП+ВЛП	37	0.70	190	" "	2.6	" "	" "
	34	2.1	9.0	8Сх+ВЛП+ВЛП	30	0.85	150	" "	2.0	" "	" "
	34	14	0.9	10Сх+ВЛП	46	0.70	250	" "	0.9	" "	" "

Лісопатологічний журнал склад:

Підпис:

Ліснаторологічний журнал

Постійний лісокористувач
Лісництво

№ п/п	Квар- тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування				Ліснаторологічна характеристика	Пошкод- жена площа (га)	Необ- хідні заходи	Примітка
				Склад насадження	Вік	Пов- нота	Запас (м³/га)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	34.2	8.1	106г - 12г + 6г - 8г	75	0.60	290	-	1.0	ВСП	слабка ст
	41	15	0.8	106г	35	0.65	170	-	0.8	-	-
	46	2.5	15.0	106г	48	0.55	220	-	2.2	-	-
	47	2	1.3	106г	40	0.65	190	-	1.3	-	-
								Всього	56.0		
								Всього облічено 29 ділянок площею 117.1 га. всього 117,1 га - сировинні чироків, слабка ступінь			

Ліснаторологічний журнал склад:

Підпис: