АКТ
ЛІСОПАТОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ
ПО СОСНІВСЬКОМУ НАДЛІСНИЦТВУ
ФІЛІЇ «ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»
ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ»

«30» 04 2026

с-ще Соснове Рівненського
району Рівненської області

На звернення Соснівського надлісництва, Філії «Поліський лісовий офіс», ДП «Ліси України» (далі – надлісництва), №5868/34.4.1-2026 від 21.04.2026 року, нами: провідним інженером-лісопатологом сектору моніторингу стану лісових насаджень філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" Русланом МАЦЕЛИКОМ, інженером-лісопатологом сектору нагляду, обліку і прогнозу філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" Павлом ВЕРЕМЕЙЧИКОМ, начальником відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Володимиром КАСЯНЧУКОМ, начальником Соснівського надлісництва Володимиром ЯНІЦЬКИМ, помічником начальника Соснівського надлісництва Олегом ЦИМБАЛЮКОМ, провідним інженером охорони та захисту лісу філії «Поліський лісовий офіс», ДП «Ліси України» Юрієм ВЛАСЮКОМ, провідним інженером лісового господарства філії «Поліський лісовий офіс», ДП «Ліси України» Васильом КОТОМ та посадових осіб лісництв Соснівського надлісництва: лісничого Стрийського лісництва Олега БАНАЦЬКОГО, лісничого Яцьковицького лісництва Івана КИРИКОВИЧА, лісничого Листвинського лісництва Василя ЮРЧИКА, лісничого Соснівського лісництва Ігоря ОСІПЧУКА, лісничого Щекичинського лісництва Андрія ПИВОВАРЧУКА, лісничого Бистрицького лісництва Ігоря ПЕТРУКА, проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень по Соснівському надлісництву, що потребують заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2026 рік, у відповідності до п. 3 , «Санітарних правилах в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555, (далі – СПЛУ).

Примітка:

- коротка таксаційна характеристика вказана згідно, матеріалів базового лісовпорядкування 2019 року, станом на 01.01.2020 року по ДП «Соснівський лісгосп»;
- у відповідності до п. 5 абзац 10 СПЛУ, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень представлено;
- лісопатологічне обстеження, проводилося спеціалістами філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" 22-30.04.2026 року;

Насадження обстежені на загальній площі – 355,2 гектара, що зазначені в лісопатологічному журналі:

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа осередку		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м³ на 1 га	Інтенсивність ураження, %	Ступінь ураження
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 га						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Бистрицьке	28	3	8.1		8.1	8.1	7С3З3БП+ВЧЛ	65	0.80	1	22	26	290	4	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом, сніголом	20	7	слабка
Бистрицьке	10	25	4.9		4.9	4.9	10С3	65	0.70	1	21	26	300	4	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	20	7	слабка
Бистрицьке	27	8	3.1		3.1	3.1	10С3	65	0.80	1	23	28	380	4	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом, сніголом	25	7	слабка
Бистрицьке	13	8	2.1		2.1	2.1	10С3	65	0.70	1	21	26	300	4	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом, сніголом	25	8	слабка
Бистрицьке	24	53	1.6		1.6	1.6	10С3	67	0.70	2	20	24	280	3	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	20	7	слабка
Бистрицьке	7	14	12.9		12.9	12.9	10С3	65	0.80	1	21	26	340	4	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом, сніголом	20	6	слабка
Бистрицьке	18	15	2.0		2.0	2.0	10С3	73	0.70	1	23	28	340	4	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	25	7	слабка
Бистрицьке	30	2	12.2		12.2	12.2	10С3+БП	65	0.70	1	22	26	320	4	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	20	6	слабка
Бистрицьке	41	56	2.8		2.8	2.8	10С3	63	0.80	1	22	28	340	4	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	20	6	слабка
Бистрицьке	41	37	4.8	(1)	4.6	4.6	10С3	70	0.80	1	22	24	350	4	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	25	7	слабка
Бистрицьке	41	5	5.0	(1)	4.4	4.4	10С3	69	0.70	1	23	28	340	4	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	20	6	слабка
Бистрицьке	30	35	2.2		2.2	2.2	10С3	65	0.70	1	22	26	320	4	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	20	6	слабка
Бистрицьке	64	7	3.5	(1)	2.5	2.5	10С3	75	0.70	1	22	26	380	4	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	25	7	слабка
Бистрицьке	57	1	11.8	(1)	5.3	5.3	10С3	67	0.80	1	22	26	360	3	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	20	6	слабка
Бистрицьке	65	22	5.8		5.8	5.8	10С3+БП	65	0.80	1	22	26	360	4	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	20	6	слабка
Бистрицьке	67	19	2.4		2.4	2.4	9С31БП	75	0.70	1	25	32	340	4	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	20	6	слабка
Бистрицьке	67	20	3.6		3.6	3.6	9С31БП+ДЗ	55	0.80	1А	22	26	330	4	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	20	6	слабка
Бистрицьке	51	10	2.4		2.4	2.4	10С3+БП	65	0.70	1	23	28	340	4	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	20	6	слабка
Бистрицьке	59	18	3.5		3.5	3.5	10С3+БП	65	0.80	1	23	28	380	4	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	20	5	слабка
Щекичинське	5	8	1.4		1.4	1.4	10С3+ДЗ	70	0.60	1А	26	32	340	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	45	13	середня
Щекичинське	15	10	14.0	(1)	6.0	6.0	8С31Д31БП	65	0.50	1	24	28	220	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	30	14	середня
Щекичинське	15	26	1.3		1.3	1.3	7С33Д3+БП	80	0.60	1А	28	36	330	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	30	9	слабка
Щекичинське	18	21	21.7	(1)	3.0	3.0	7Д33С3+ГЗ	65	0.50	1	24	28	220	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	40	18	середня
Щекичинське	19	3	11.0	(1)	1.5	1.5	9Д31С3+ОС	80	0.70	2	24	28	300	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	40	13	середня
Щекичинське	33	25	5.1	(1)	1.5	1.5	7Д33С3+ОС	80	0.70	2	23	28	300	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	40	13	середня
Щекичинське	35	25	1.1		1.1	1.1	9С31Д3+ЯЛЕ+ВЛЧ	75	0.70	1А	27	30	380	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	45	12	середня
Щекичинське	35	28	1.2		1.2	1.2	10С3	62	0.60	1А	25	28	320	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	45	14	середня
Щекичинське	36	16	1.7		1.7	1.7	10С3+Д3+БП	73	0.60	1	24	28	350	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	40	11	середня
Щекичинське	37	34	1.6		1.6	1.6	10С3	67	0.70	1А	25	28	380	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	40	11	середня
Щекичинське	47	48	4.9		4.9	4.9	9С31Д3	58	0.60	1А	25	28	330	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом, сніголом	40	12	середня
Щекичинське	52	5	15.0	(1)	3.0	3.0	9Д31С3	70	0.70	2	19	24	220	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	40	18	середня
Щекичинське	52	57	26.5	(1)	3.0	3.0	7Д33С3	70	0.70	2	21	26	270	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	40	15	середня
Щекичинське	53	33	0.7		0.7	0.7	10С3+Д3+ОС	75	0.60	1	26	32	330	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	45	14	середня
Щекичинське	33	1	18.5	(1)	4.0	4.0	8Д32С3+БП+ГЗ	74	0.60	1	24	28	270	4	ВСР	стовбурові шкідники, опеньок осінній, сніголом, вітровал бурелом	40	15	середня
Листвинське	11	4	6.2		6.2	6.2	7С3(62)2С3(82)1БП	62	0.70	1	21	24	290	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	35	12	середня
Листвинське	11	13	4.5		4.5	4.5	10С3	62	0.70	1	21	24	300	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	35	12	середня
Листвинське	19	2	3.4	(1)	2.4	2.4	6С3(70)2БП2С3(90)	70	0.70	1	24	28	300	4	ВСР	стовбурові шкідники, опеньок осінній, сніголом, вітровал бурелом	35	12	середня
Листвинське	19	8	8.4		8.4	8.4	6С3(54)2БП2С3(70)	54	0.80	2	16	16	210	4	ВСР	стовбурові шкідники, опеньок осінній, сніголом, вітровал бурелом	40	19	середня
Листвинське	42	19	15.5		15.5	15.5	4С34БП1ОС1ВЛЧ+ДЗ	70	0.70	1	24	32	270	4	ВСР	стовбурова гниль, несправжній трутовик, стовбурові шкідники, вітровал бурелом	40	15	середня

Лиственське	50	22	27.1	(2)	15.0	15.0	9СЗ1БП+ВЛЧ	75	0.70	1	24	28	330	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	35	11	середня
Лиственське	55	17	3.0		3.0	3.0	9СЗ1БП+ВЛЧ+ДЗ	75	0.60	1	26	32	310	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	35	11	середня
Лиственське	57	62	4.3		4.3	4.3	7СЗ2БП1ВЛЧ	70	0.70	1	25	28	290	3	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	45	16	середня
Лиственське	57	44	4.5		4.5	4.5	4СЗ6БП+ВЛЧ+ДЗ	70	0.70	1	23	28	230	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	45	20	середня
Лиственське	57	65	6.6	(1)	3.0	3.0	5СЗ(80)2БП2ВЛЧ1СЗ(100)	80	0.70	2	22	28	270	3	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	35	13	середня
Соснівське	25	11	2.8		2.8	2.8	7ВЛЧ3БП	50	0.70	1	21	24	200	4	ВСР	стовбурова гниль, справжній трутовик, стовбурові шкідники, вітровал бурелом	35	18	середня
Соснівське	24	49	0.9		0.9	0.9	8ВЛЧ1БП1СЗ	80	0.60	2	24	28	250	4	ВСР	стовбурова гниль, справжній трутовик, стовбурові шкідники, вітровал бурелом	40	16	середня
Соснівське	48	12	11.4		11.4	11.4	10СЗ	65	0.60	1	22	28	270	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	30	11	середня
Стрийське	24	40	8.9		8.9	8.9	6СЗ3БП1ВЛЧ	75	0.70	1	24	32	300	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	30	10	середня
Стрийське	24	41	16.9		16.9	16.9	8СЗ2БП	71	0.70	1	22	28	300	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	30	10	середня
Стрийське	25	24	6.8	(1)	3.0	3.0	8СЗ2БП	65	0.60	1	21	28	270	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	30	11	середня
Жовтневе	38	18	1.5		1.5	1.5	7СЗ3ДЗ+ВЛЧ+ОС	68	0.70	1	24	36	310	4	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	30	10	середня
Жовтневе	32	15	41.3	(1)	15.0	15.0	6ДЗ1БП2ВЛЧ1ГЗ+ЯЗ+ОС	70	0.70	1	22	28	250	4	СРВ	стовбурова гниль, несправжній трутовик, стовбурові шкідники, вітровал бурелом	20	8	слабка
Жовтневе	38	1	28.6	(2)	3.0	3.0	7СЗ3ДЗ+ВЛЧ	63	0.70	1	23	32	300	4	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	30	10	середня
Жовтневе	32	9	11.0		11.0	11.0	4ДЗ3Я3ІБП2ГЗ+ОС	70	0.70	1	22	24	210	4	СРВ	стовбурова гниль, несправжній трутовик, стовбурові шкідники, вітровал бурелом	25	12	середня
Жовтневе	30	7	2.6		2.6	2.6	4ДЗ3БП2ГЗ1СЗ+ВЛЧ+ОС	60	0.70	1	22	28	230	4	СРВ	стовбурова гниль, несправжній трутовик, стовбурові шкідники, вітровал бурелом	25	11	середня
Жовтневе	35	36	1.1		1.1	1.1	6ДЗ2СЗ2БП	60	0.70	2	19	24	220	4	СРВ	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	25	11	середня
Яцьковицьке	8	50	7.5	(1)	6.6	6.6	6СЗ(75)3СЗ(50)1БП	75	0.60	1	24	28	240	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	20	8	слабка
Яцьковицьке	9	19	3.4		3.4	3.4	9СЗ(75)1БП+СЗ	75	0.80	1	23	26	340	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	25	7	слабка
Яцьковицьке	15	5	7.6		7.6	7.6	10СЗ+БП	60	0.70	1	22	26	310	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	15	5	слабка
Яцьковицьке	15	12	3.0		3.0	3.0	9СЗ1БП+ВЛЧ+ОС	62	0.70	1	22	26	280	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	20	7	слабка
Яцьковицьке	27	1	6.5	(2)	6.5	6.5	10СЗ+БП	75	0.60	1	23	28	280	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	25	9	слабка
Яцьковицьке	27	6	5.1		5.1	5.1	9СЗ1БП+ВЛЧ	75	0.80	1	24	26	370	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	30	8	слабка
Яцьковицьке	34	32	8.5	(1)	3.0	3.0	3БП(60)2СЗ2ОС1БП(75)1ДЗ1ГЗ+ВЛЧ	60	0.60	2	23	26	230	4	ВСР	стовбурова гниль, несправжній трутовик, стовбурові шкідники, вітровал бурелом	15	7	слабка
Яцьковицьке	37	11	15.0	(1)	4.0	4.0	10СЗ+БП	80	0.60	1	24	28	300	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	30	10	середня
Яцьковицьке	42	14	2.4		2.4	2.4	9СЗ1БП	70	0.70	3	18	24	220	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	25	11	середня
Яцьковицьке	46	17	5.5		5.5	5.5	10СЗ+БП	70	0.60	1	24	28	300	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	25	8	слабка
Яцьковицьке	50	7	9.9		9.9	9.9	7СЗ2БП1ОС	65	0.60	2	20	28	190	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	15	8	слабка
Яцьковицьке	50	27	16.0	(2)	6.0	6.0	6СЗ(50)4СЗ(30)+ДЗ+БП	50	0.60	1	20	28	210	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	20	10	середня
Яцьковицьке	50	29	2.0		2.0	2.0	10СЗ	50	0.60	2	17	24	190	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	20	11	середня
Яцьковицьке	63	13	52.0	(2)	10.0	10.0	5БП3СЗ1ВЛЧ1ОС+ДЗ	40	0.60	2	17	18	140	4	ВСР	стовбурова гниль, несправжній трутовик, стовбурові шкідники, вітровал бурелом	15	11	середня
Яцьковицьке	63	23	14.1	(1)	3.0	3.0	4БП4ВЛЧ2ОС+СЗ	45	0.50	3	16	16	100	4	ВСР	стовбурова гниль, несправжній трутовик, стовбурові шкідники, вітровал бурелом	15	15	середня
Яцьковицьке	63	25	6.2	(1)	3.0	3.0	7СЗ1БП1ВЛЧ1ОС	60	0.50	2	19	24	150	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	15	10	середня
Яцьковицьке	63	27	20.0	(1)	5.0	5.0	5СЗ2БП1ВЛЧ1ОС1ГЗ	55	0.60	1	21	28	160	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	15	9	слабка
Яцьковицьке	64	1	9.2	(1)	2.0	2.0	5СЗ2ВЛЧ2БП1ОС	40	0.60	1	16	24	100	4	ВСР	стовбурові шкідники, вітровал бурелом	15	15	середня

Разом виявлено по підприємству:	355.2				
В тому числі:	0.0	відпад	слабка	середня	сильна
	355.2		158.3	196.9	
Шкідники	291.4	відпад	слабка	середня	сильна
			140.3	151.1	
стовбурові шкідники	291.4		140.3	151.1	
Хвороби	63.8	відпад	слабка	середня	сильна
			18.0	45.8	
березова губка					
Кореневa губка					
Оленьок осінній					
Серцевинна гниль					
соснова губка					
стовбурова гниль	63.8		18.0	45.8	
Інші причини		відпад	слабка	середня	сильна
вітровал, бурелом					
Захаращеність					

Лісопатологічна характеристика:

Основною причиною всихання хвойних насаджень є ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях, до складу яких входить сосна звичайна, наявні дерева: дуже ослаблені (III – категорія стану), всихаючі (IV – категорія стану) та сухостійних (VI – категорія стану), уражені та відпрацьовані стовбуровими шкідниками.

Заселеність дерев сосни звичайної, стовбуровими шкідниками, визначається за їх типовими ознаками. У зоні товстої кори (нижня частина стовбура) виявлені пошкодження (при відлущенні відмерлої кори, чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо), які наносить шкідник під час заселення імаго та живлення личинок шестизубчастого короїда-стенографа ips sexdentatus (поверхня стовбура в районі поселення зайнята ходами повністю).

На лісовій підстилці відмічено наявність опалих пагонів з ознаками заселення сосновими лубоїдами з родини Tomicus (представники – малий сосновий лубоїд Tomicus minor та великий сосновий лубоїд Tomicus piniperda). Опалі пагони світло зеленого або жовтуватого кольору; мають характерні місці занурення дорослих особин до гілок. У нижній частині стовбура деревостанівV та VI категорій санітарного стану відмічено типові пошкодження тканин стовбура, які наносять ксилофаги з групи деструкторів – Вусачі Gerambycidae та Златки Buprestidae.

В соснових насадженнях, які представлені сосною звичайною Pinus sylvestris, виявлено дерева III-VI категорії санітарного стану, які мають ознаки послаблення (крона ажурна, присутні сухі скелетні гілки в різних частинах крони) та загибелі внаслідок ураження кореневою губкою (збудник Heterobasidion annosum).

Додатково оцінюючі (окомірно у відсотках) стан крон та стовбурів, кількість сухих гілок та опалих пагонів, можна сказати про ймовірне заселення стовбуровими шкідниками дерев III – категорії санітарного стану.

У відповідності до п. 17 СПЛУ, під час відбору свіжозаселених стовбуровими шкідниками дерев для рубки, враховується загальний стан таких дерев. Свіжозаселені комахами-камбіофагами дерева підлягають першочерговому вилученню із деревостанів.

В ході лісопатологічного обстеження спостерігається, що насадження є частково пошкодженні в наслідок – стихійного лиха (сильних поривчастих вітрів, вітровалу та бурелому), що пройшли на території надлісництва, в 2025-2026 роках.

У насадженнях Соснівського надлісництва виявлено дерева, пошкоджені сніголомами – із зламаними вершинами та гілками, тріщенами на стовбурах та механічними ушкодженнями. Такі дерева втратили стійкість і підлягають ВСР.

Вітровалом та буреломом пошкодженні, як хвойні так і листяні породи.

В насадженнях, що обстежуються спостерігається значна частина дерев різних порід зі зламаними навпіл стовбурами і обламаними кронами (з відхиленням стовбура більш ніж на 30 градусів від вертикальної осі) та хмизу за рахунок чого створюється велика захаращеність.

У відповідності до п. 16 СПЛУ, у насадженнях, пошкоджених вітром і внаслідок аварій та стихійного лиха, в першу чергу для рубки призначаються дерева з поваленими чи зламаними стовбурами.

В обстежених насадженнях, спостерігається наявність дерев (осики, берези повислої та сосни звичайної) із плодовими тілами на висоті від 2,5 до 7 м. Частина дерев перестійна та вражена несправжнім трутовиком (Phellinus robustus), Inonotus dryophilus (Bekr.) Murr. сосновою губкою Phellinuspini, справжнім трутовиком

(березова губка) Fomes fomentarius. Хвороби викликають строкату гниль стовбура. Характер ураження – груповий.

Виявлено ураження листяних насаджень стовбуровими гнилями, до складу яких входять дерева: берези, вільхи та осики. Значна частина дерев, що відносяться до IV категорії санітарного стану (високий ступінь ажурності крони, незначний приріст, листя дуже дрібне та всихає, суховершинність, наявні сухі склетні гілки в різних частинах стовбура) з ознаками загнивання кореневої системи, наявні значні розстріскування в комлевій частині стовбура, що формує собою великі поздовжні язви з бурою та іржисто-бурою гнилью.

В лиистяних насадженнях вільхи та берези, відмічається що дерева IV-VI категорій санітарного стану мають ознаки заселення та відпрацювання ксилофагами з родин Вусачів Gerambycidae та Златок Buprestidae (під корою присутні типові личинкові ходи, на стовбурі - вилітні отвори імаго). Гниття деревини починається з периферії, поширюється в серцевинну частину.

Є ураження насаджень, опеньком осіннім, викликаючі кореневу гниль, яка поступово розширюється осередками, призводить до всихання дерев, їхньої загибелі та гниття деревини. Характерні ураження м'якої некротичної тканини біля коренів, білий міцелій під корою, темні ризоморфи (струноподібні утворення) в грунті та плодоношення на уражених місцях.

Під час обстеження було оглянуто кореневу систему дерев осики, берези та вільхи та встановлено, що дерева уражені комлевою гниллю, внаслідок чого камбій в зоні тонкої кори темно-бурого кольору, а заболонь частково вкрита плямами поперечної гнилі. В результаті дерева пускають водяні пагони та суховершинять.

Також відмічається, що наявні дерева, які не відноситься до жодної з категорій технічної придатності, тобто в насадженнях накопичується неліквідна деревина.

Насадження швидко втрачають свої лісогосподарські та захисні властивості. В насадженнях швидкими темпами проходить накопичення низькосортної деревини. Санітарний стан даних насаджень визнано незадовільним.

Висновки та пропозиції:

1. Лісопатологічне обстеження насаджень проведено по Соснівському надлісництву на загальній площі – 355,2 гектара, зокрема:
   - Жовтневе лісництво – 34,2 гектара;
   - Щекичинське лісництво – 35,9 гектара;
   - Стрийське лісництво – 28,8 гектара;
   - Листвинське лісництво – 66,8 гектара;
   - Яцьковицьке лісництво – 88,0 гектара;
   - Соснівське лісництво – 15,1 гектара;
   - Бистрицьке лісництво – 86,4 гектара;

Обстежені насадження створюють незадовільний санітарний стан, деревина втрачає свої технічні якості, проходить розповсюдження стовбурових шкідників.

2. Для наведення належного санітарного стану лісів, збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів, зменшення шкоди у лісах Соснівського надлісництва, що завдається шкідниками, хворобами та стихійними лихами, з метою оздоровлення насаджень у максимально стислі строки, за умови недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище, рекомендовано провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме: вибіркові санітарні рубки на площі – **355,2** гектара.

3. Заходи з поліпшення санітарного стану лісів провести в 2026 році дотримуючись максимально стислих термінів. При проведенні заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачити застосування методів та технологій, що передбачають запобіганню негативному впливу на стан навколишнього середовища.

4. Рубки провести згідно СПЛУ, термінів та норм передбачених цими правилами.

5. В осередках стовбурних шкідників, вітровалів та буреломів, заготовлену деревину вивозити в максимально стислі терміни, а за неможливості термінового вивезення корувати, лісосічні залишки утилізувати.

6. Осередки стовбурових шкідників та стовбурових гнилей, які зафіксовані під час лісопатологічного обстеження підлягають моніторингу санітарного стану насаджень державною лісовою охороною Соснівського надлісництва, та у разі не зафіксованого осередку вторинних шкідників на обліку підприємства вони підлягають обов'язковій фіксації.

7. Державній лісовій охороні Соснівського надлісництва вести постійний нагляд за суміжними насадженнями. При виявленні осередків шкідників та хвороб лісу, в найкоротші термін проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів. Осередки шкідників та хвороб лісу, виявлені лісопатологічним обстеженням, поставити на облік, згідно з лісопатологічним журналом.

8. Спеціалістам Соснівського надлісництва, при виявлені червонокнижних рослин та тварин, діяти згідно з чинним законодавством.

Акт складено в 4-х примірниках:

- 1-й: філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»;
- 2-й: Соснівському надлісництву;
- 3-й: Північно-Західному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства;
- 4-й: філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України";

Акт підписали:

Провідний інженер-лісопатолог
сектору моніторингу
стану лісових насаджень
філії «Рівнелісозахист»
ДСЛП «Київлісозахист» Руслан МАЦЕЛИК

Інженер-лісопатолог
сектору нагляду, обліку і
прогнозу стану лісових насаджень
філії "Рівнелісозахист"
ДСЛП "Київлісозахист" Павло ВЕРЕМЕЙЧИК

Начальник відділу мисливського господарства,
охорони та захисту лісів Північно-Західного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства Володимир КАСЯНЧУК

Начальник Соснівського надлісництва
філії «Поліський лісовий офіс» Володимир ЯНІЦЬКИЙ

Помічником начальника
Соснівського надлісництва
філії «Поліський лісовий офіс» Олег ЦИМБАЛЮК

Провідний інженер охорони
та захисту лісу філії «Поліський лісовий офіс» Юрій ВЛАСЮК

Провідний інженер лісового та
мисливського господарства
філії «Поліський лісовий офіс» Василь КОТ

Лісничий Листвинського лісництва Василь ЮРЧИК

Лісничого Яцьковицького лісництва Іван КИРИКОВИЧ

Лісничого Щекичинського лісництва Андрій ПИВОВАРЧУК

Лісничий Стрийського лісництва Олег БАНАЦЬКИЙ

Лісничий Соснівського лісництва Ігор ОСІПЧУК

Лісничий Жовтневого лісництва Олександр ДЖУС

Лісничого Бистрицького лісництва Ігор ПЕТРУК