

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

16 жовтня 2025 року

м. Конотоп

Нами, головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., інженером – лісопатологом I категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., головним лісничим ДП «Конотопський лісгосп» Безкровним С. А., разом лісовою охороною, проведено лісопатологічне обстеження насаджень ДП «Конотопський лісгосп» ОКАП «Сумиоблагроліс» Сумської області з метою визначення та оцінки санітарного стану.

Обстеження проведено на площі – **122,9 гектара**.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2016 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
50	2	1,6	10ДЗ	65	0.70	2	19	28	225
50	5	1,2	6ДЗЗЯЗ1ВРБ	60	0.70	2	18	28	195
50	7	2,1	10ДЗ	45	0.70	2	15	22	160
60	18	2,0	3ДЗЗБП2КЛГ1АКБ1ТП	40	0.70	1	15	22	150
75	1	4,7	8ДЗ2ЯЗ	64	0.70	2	19	28	230
75	2	2,1	4ДЗ6ЯЗ	64	0.60	2	18	32	170
88	4	2,3	10ДЗ+ЛПД+ОС+БП	85	0.60	2	22	32	220
88	6	5,9	7ДЗЗЛПД+БП+ОС	85	0.60	2	23	44	220
88	11	1,0	6ДЗ2ЛПД1ОС1БП	65	0.60	2	20	28	190
131	2	2,0	9ДЗ1ВРЛ	80	0.60	2	21	36	220

Лісопатологічним обстеженням даних насаджень встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, вертицильозне в'янення, халаровий некроз, печіночниця звичайна, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний та лускатий трутовик. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2016 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
32	33	3,6	6БП2ТБ2ВРЛ	50	0.60	1	20	28	180
77	1	13,1	8БП1ОС1ВЛЧ	50	0.70	1А	21	28	190
78	17	3,0	6БП4ВЛЧ	50	0.70	1	20	28	180
89	11	1,0	8БП2ВЛЧ+ОС	60	0.60	1	21	32	180
98	3	3,1	10БП	50	0.60	1А	22	32	170

В ході лісопатологічного обстеження встановлено, що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження насаджень – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: березовий трутовик, березова губка, бактеріальний рак - водянка, лускатий трутовик, несправжній осиковий трутовик, трутовик звичайний та сірчано – жовтий трутовик. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2016 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
73	25		24,0	8ВЛЧ1ОС1ВРБ	55	0.70	2	19	28	190
74	1	1	20,0	7ВЛЧ3ВРБ	50	0.60	2	18	28	150
86	3		2,6	10ВЛЧ	25	0.70	2	13	16	110
86	8		1,2	10ВЛЧ	65	0.60	2	21	32	200
86	25		1,7	6ВЛЧ(70)4ВЛЧ(50)	70/50	0.60	2	23/19	32/28	200

В результаті обстеження встановлено, що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження насаджень – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній вільховий трутовик, трутовик променистий, трутовик звичайний, несправжній осиковий трутовик, лускатий трутовик та сірчано – жовтий трутовик. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2016 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
77	12	6,0	5ЛПД2БП2Д31ВЛЧ	55	0.60	1	19	28	170
87	8	10,8	8ЛПД2Д3	85	0.60	2	24	32	250
151	9	1,7	8ЛПД1Я31Д3	70	0.70	2	22	36	250
151	10	1,2	6ЛПД3В3Д1Д3	70	0.60	3	20	36	190

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: вертицильозне в'янення, несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, халаровий некроз, печіночниця звичайна, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний та лускатий трутовик. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах,

всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2016 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
104	6	1,7	7КЛГЗЯЗ	60	0.70	1	20	32	210
105	2	3,3	6КЛГ2ДЗ1ТП1ЯЗ+ЛПД	60	0.70	1	20	30	215

При проведенні лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: вертицильозне в'янення, несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, халаровий некроз, печіночниця звичайна, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний та лускатий трутовик. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодови тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хворобами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2026 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **122,9 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибів. Адже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

1 – ДСЛП «Харківлісозахист».

2 – ДП «Конотопський лісгосп».

3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

Підписи:

 А. Д. Воробей
 І. В. Рідкокаша
 С. А. Безкровний