

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибірових санітарних рубок
в насадженнях Монастириського комунального лісогосподарського
підприємства (далі – Монастириського КЛГП)

21 листопада 2025 року

м. Монастириська

Нами, провідним інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства (далі – ВНДПВЛГ) державного спеціалізованого лісозахисного господарства (далі – ДСЛП) „Львівлісозахист” Олегом МАСНИМ, інженером-лісопатологом ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист” Ярославом ОСТАШУКОМ, в присутності директора Монастириського КЛГП Володимира СМОЛИШИНА, головного лісничого Монастириського КЛГП Тетяни КУЛІШ, за участю лісової охорони підприємства з **17 листопада по 21 листопада 2025 року** проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибірових санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибірових санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог „Санітарних правил в лісах України” (далі – СПЛУ).

Лісопатологічний журнал додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2016 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибірових санітарних рубок проведено на загальній площі **209,1 гектара** (далі – га).

Квартал 1, виділ 14, площа 2,2 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірову санітарну рубку.

Квартал 1, виділ 2, площа 1,8 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній та осиковий трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 1, виділ 6, площа 3,4 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 1, виділ 13, площа 2,3 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 1, виділ 16, площа 3,4 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 1, виділ 21, площа 7,8 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 2, виділ 3, площа 5,5 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній та осиковий трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 16, площа 1,3 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 21, площа 1,8 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 6, площа 4,7 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 7, площа 2,7 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 8, площа 0,9 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 13, площа 1,1 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 14, площа 1,4 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній та осиковий трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 33, площа 1,3 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 43, площа 1,4 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 12, виділ 2, площа 3,3 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів

(справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 12, виділ 5, площа 1,4 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 3, площа 3,2 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 23, площа 6,6 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній та осиковий трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 16, виділ 2, площа 2,1 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 16, виділ 9, площа 2,3 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 16, виділ 11, площа 4,5 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 17, площа 2,1 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 21, площа 1,7 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора

відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 22, площа 0,9 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній та осиковий трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 18, площа 1,0 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній та осиковий трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 41, площа 2,2 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній та осиковий трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 24, виділ 10, площа 15,0 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 24, виділ 18, площа 10,5 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 9, площа 2,2 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 10, площа 7,1 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 26, виділ 10, площа 1,3 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 26, виділ 14, площа 1,4 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній та осиковий трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 26, виділ 15, площа 1,4 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній та осиковий трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 26, виділ 16, площа 0,2 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній та осиковий трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 26, виділ 18, площа 0,8 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній та осиковий трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 27, виділ 1, площа 1,8 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 28, виділ 27, площа 3,1 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 29, виділ 23, площа 0,6 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 29, виділ 24, площа 5,8 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 7, площа 8,7 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 3, площа 26,5 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній та осиковий трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 32, виділ 2, площа 6,8 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів

(справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 32, виділ 10, площа 5,4 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній та осиковий трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 37, виділ 20, площа 3,5 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 37, виділ 21, площа 0,9 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 37, виділ 22, площа 4,5 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 39, виділ 9, площа 2,5 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 39, виділ 10, площа 1,7 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 39, виділ 14, площа 4,4 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 39, виділ 17, площа 7,2 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора

відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній та осиковий трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 40, виділ 52, площа 11,5 га.

Насадження уражене опеньком осіннім.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Насадження також уражене стовбуровими та кореневими гнилями. На пошкоджених деревах наявні дупла та плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній та осиковий трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі 209,1 га, при цьому виявлено:


Опеньок осінній – 209,1 га (слабка ступінь пошкодження).

2. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибіркові санітарні рубки на площі **209,1 га**.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень

Провідний інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист”

 Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП „Львівлісозахист”

 Ярослав ОСТАШУК

Директор Монастирського КЛГП

 Володимир СМОЛИШИН

Головний лісничий
Монастирського КЛГП

 Тетяна КУЛИШ