

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркового санітарного рубок
в насадженнях Сокальського ДЛГП „Галсільліс”

08 травня 2025 року

м. Сокаль

Нами, головним лісопатологом ДСЛП „Львівлісозахист” Богданом СОКОЛОВСЬКИМ, провідним інженером-лісопатологом ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист” Олегом МАСНИМ, інженером-лісопатологом ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист” Ярославом ОСТАШУКОМ, в присутності головного лісничого Сокальського ДЛГП „Галсільліс” Андрія МИКИТЮКА, за участю лісової охорони підприємства **07.05.2025 та 08.05.2025 року** проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркового санітарного рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарного рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог „Санітарних правил в лісах України” (далі – СПЛУ).

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2012 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок проведено на загальній площі **125,0 га**.

Реклинецьке лісництво

Квартал 3, виділ 14.3, площа 1,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 3, виділ 15.2, площа 1,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 12, виділ 7.3, площа 2,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 12, виділ 22.2, площа 1,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 4.2, площа 5,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 8, площа 2,4 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 19.1, площа 1,8 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 25.1, площа 2,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна

частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 26.1, площа 2,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 10.4, площа 2,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 36, виділ 35, площа 1,5 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 37, виділ 33, площа 1,5 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 46, виділ 2.2, площа 1,5 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 24, площа 2,9 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 28, виділ 19, площа 1,5 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 28, виділ 24, площа 1,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Сокальське лісництво

Квартал 6, виділ 23.1, площа 4,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 25.1, площа 3,7 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 4, площа 1,5 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. На окремих деревах наявні плодові тіла

дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 5, площа 0,8 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 6, площа 1,5 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики)

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 7, площа 4,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики)

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 8, площа 1,2 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики)

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 9, площа 2,4 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 35, площа 2,6 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики)

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 18, площа 4,6 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики)

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 22.1, площа 6,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики)

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 25,1, площа 3,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики)

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 4.1, площа 10,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. На окремих деревах наявні плодові тіла

дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 11, виділ 1, площа 6,8 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 11, виділ 7, площа 2,8 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики)

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 2, площа 1,9 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики)

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 4, площа 0,6 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики)

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 16, площа 0,1 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна

частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики)

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 17, площа 0,3 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 31, площа 4,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики)

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 28, виділ 9, площа 1,3 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики)

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 28, виділ 16, площа 3,1 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики)

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 28, виділ 17, площа 2,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також

великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики)

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 32, виділ 7, площа 2,6 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики)

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 8, площа 6,9 га.

Насадження уражене **стовбуровими та корневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38, виділ 13, площа 1,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики)

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 40, виділ 2, площа 0,3 га.

Насадження уражене **стовбуровими та корневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 40, виділ 6, площа 1,4 га.

Насадження уражене **стовбуровими та корневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 48, виділ 2, площа 1,4 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 48, виділ 5, площа 4,9 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 52, виділ 2.2, площа 4,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики)

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 52, виділ 3, площа 4,2 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики)

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі 125,0 га, при цьому виявлено:

Стовбурові шкідники – 88,3 га (слабка ступінь пошкодження).

Стовбурові гнилі – 36,7 га (слабка ступінь пошкодження).

2. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибіркові санітарні рубки на площі **125,0 га.**

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.


4. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень

Головний лісопатолог
ДСЛП „Львівлісозахист”



Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ

Провідний інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист”




Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист”



Ярослав ОСТАШУК

Головний лісничий
Сокальського ДЛГП „Галсілляліс”



Андрій МИКИТЮК



Лісонагологiчний журнал

Сосна вк. л. ДНП "Галицьке"

Решетняцьке

Котис
Лісництво

Р.

" " "

Квартал	Виді	Площа, га	Коротка таксаційна характеристика				Лісонагологічна характеристика	Необхідні СОЗ, га			Примітка
			Вис	Повнота	Запас на 1 га			ВСР	ВСР	ЛПЗ	
3	14.3	16.5	49	0.55	210		Смородові шовки, вітролом	1.0			Справа ст.
3	15.2	27.5	53	0.55	250		"	1.0			"
12	7.3	30.0	49	0.60	250		"	2.0			"
12	22.2	6.0	48	0.50	210		"	1.0			"
23	4.2	6.0	46	0.55	220		"	5.0			"
23	8	2.4	50	0.45	180		"	2.4			"
30	19.1	2.6	35	0.40	220		"	1.8			"
30	25.1	8.6	52	0.65	310		"	2.0			"
30	26.1	2.4	55	0.60	240		"	2.0			"
30	10.4	26.0	40	0.40	230		"	2.0			"
36	35	4.0	43	0.65	240		"	1.5			"
37	33	10.5	65	0.40	290		"	1.5			"
46	2.2	25.0	48	0.55	220		"	2.5			"
25	2.1	2.8	55	0.40	260		"	2.8			"
28	19	1.5	49	0.55	80		"	1.5			"
28	24	1.0	65	0.65	290		"	1.0			"
								30.1			

08.05.25 r

Решетняцьке О. Мачин

Лісонатологічний журнал

Постійний лісокористувач Сокальське ДЛГП „Галицькис
Лісництво Сокальське

№ п/п	Квар-тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування			Лісопатологічна характеристика		Пошкод-жена площа (га)	Необ-хідні заходи	Примітка
				Склад насадження	Вік	Пов-нота	Запас (м³/га)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	23.1	4,3	10Cз + Dзр	35	0,80	200	ст. шкідлики, вітер.	4,0	Вср	смерть
	6	25.1	4,0	10Cз + Dзр + Bлз	35	0,75	200	ст. шкідлики, вітер	3,7	-/-	-/-
	7	4	1,5	9Dзр IMge + Cз	32	0,80	150	ст. зміш. трут., вітер.	1,5	-/-	-/-
	7	5	0,8	9Dзр IMge + Dз + Cз	31	0,75	140	ст. зміш. трутовика, вітер.	0,8	-/-	-/-
	7	6	1,5	8Dзр ICз IMge + Bп	28	0,75	130	ст. шкідлики, трутовика, вітер	1,5	-/-	-/-
	7	7	4,0	8Dз IMge + Dз + Cз + Bп + Oc	29	0,70	110	ст. шкідлики, трутовика, вітер	4,0	-/-	-/-
	7	8	1,2	3Dз IMge + Dз + Cз + Bп + Oc	30	0,70	120	ст. шкідлики, трутовика, вітер	1,2	-/-	-/-
	7	9	2,4	8Dз IMge + Dз + Cз + Bп + Oc	30	0,85	110	ст. зміш. трутовика, вітер	2,4	-/-	-/-
	6	35	2,6	3Dз IMge + Dз + Cз + Bп + Oc	70	0,60	180	ст. зміш. трутовика, вітер.	2,6	-/-	-/-
	9	18	4,6	9Cз IMge + Dз + Bп	71	0,50	200	ст. шкідлики, трутовика, вітер.	4,6	-/-	-/-
	9	22.1	12,0	6Dз IMge + Dз + Cз + Bп + Oc	75	0,60	210	ст. шкідлики, трутовика, вітер.	6,0	-/-	-/-
	9	25.1	5,1	8Dз IMge + Dз + Cз + Bп + Oc	75	0,60	200	ст. шкідлики, трутовика, вітер	3,0	-/-	-/-
	10	4.1	25,0	10Dз IMge + Dз + Cз + Bп + Oc	60	0,60	200	ст. зміш. трутовика, вітер.	10,0	-/-	-/-
	11	1	6,8	9Cз IMge + Dз	49	0,65	250	ст. зміш. шкідлики, трутовика, вітер	6,8	-/-	-/-
	11	7	2,8	10Cз IMge + Dз + Cз + Bп + Oc	61	0,55	270	ст. шкідлики, трутовика, вітер	2,8	-/-	-/-
	15	2	1,9	10Cз IMge + Dз + Cз + Bп + Oc	61	0,55	240	ст. шкідлики, трутовика, вітер.	1,9	-/-	-/-
	15	4	0,6	10Cз IMge + Dз + Cз + Bп + Oc	59	0,60	220	ст. шкідлики, трутовика, вітер.	0,6	-/-	-/-
	17	16	0,1	9Cз IMge + Dз	38	0,60	200	ст. шкідлики, трутовика, вітер.	0,1	-/-	-/-
	17	17	0,3	9Dз IMge + Dз + Cз + Bп + Oc	41	0,70	180	ст. зміш. трутовика, вітер.	0,3	-/-	-/-
	23	31	4,0	9Cз IMge + Dз + Cз + Bп + Oc	46	0,60	200	ст. шкідлики, трутовика, вітер.	4,0	-/-	-/-
	28	9	1,3	8Cз IMge + Dз + Cз + Bп + Oc	60	0,55	220	ст. шкідлики, трутовика, вітер	1,3	-/-	-/-
	28	16	3,1	9Cз IMge + Dз + Cз + Bп + Oc	70	0,55	210	ст. шкідлики, трутовика, вітер.	3,1	-/-	-/-

Лісонатологічний журнал склад.

Підпис

Лісонатологічний журнал

Постійний лісокористувач
Лісництво

№ п/п	Квар-тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування року				Лісопатологічна характеристика	Пошкод-жена площа (га)	Необ-хідні заходи	Примітка	
				Склад насадження	Вік	Пов-нота	Запас (м³/га)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	17		2,0	5D ₃ 2C ₃ 2I ₃ 10C ₃ +4ш	70	0,55	210	ст. шкідливі, трусовики, в'тер	2,0	ВСР	ска ска	
32	7		2,6	6D ₃ 4C ₃ +9 ₃ +11D ₃ +D ₁₂ +B ₁₂ +O ₃	75	0,55	200	ст. шкідливі, трусовики, в'тер	2,6	-11-	-11-	
34	8		6,9	7B ₁₂ (30)3B ₁₂ (70)	50	0,60	180	ст. шкідливі, трусовики, в'тер	6,9	-11-	-11-	
38	13		1,0	8C ₃ 1D ₃ 1B ₁₂	17	0,65	30	ст. шкідливі, трусовики, в'тер	1,0	-11-	-11-	
40	2		0,3	10B ₁₂ +I ₃	45	0,70	200	ст. шкідливі, трусовики, в'тер	0,3	-11-	-11-	
40	6		1,4	10B ₁₂ +9 ₃	30	0,70	110	ст. шкідливі, трусовики, в'тер	1,4	-11-	-11-	
48	2		1,4	5B ₁₂ 4I ₃ 1D ₃ +11D ₃ +O ₃	60	0,60	150	ст. шкідливі, трусовики, в'тер	1,4	-11-	-11-	
48	5		4,9	5B ₁₂ 3I ₃ 2O ₃ +D ₃ +C ₃ +B ₁₂ +4ш	60	0,70	210	ст. шкідливі, трусовики, в'тер	4,9	-11-	-11-	
52	2,1		7,0	10C ₃ +D ₃ +4ш+5п	61	0,55	250	ст. шкідливі, трусовики, в'тер	7,0	-11-	-11-	
52	3		4,2	10C ₃ +D ₃ +4ш+5п	65	0,55	270	ст. шкідливі, трусовики, в'тер	4,2	-11-	-11-	
				Всього обстежено: 94,9 га								

Лісонатологічний журнал склад: інженер-лісонатолог

Груш

Підпис: *Григорів Олександр*